

Corthylus papulans: *Oblongo-ovalis*, thorace semielyptico, latitudine vix longiore, margine apicali rotundato, carinula subgranulata transversim ornata, supra antice asperato postice laevi, elytris thorace quarta parte longioribus, subtilissime vage punctatis, postice subintegris, declivitate postica convexa tuberculis (2—3) vix conspicuis a sutura aequa remotis ornata, margine apicali suturaque (subtilissime granulata) elevatoriis. — Long. $1\frac{1}{2}$ Lin. — Patria: Brasilia.

Mas (?): fronte excavata, antennarum capitulo pilis falcatis longe pennicillato.

Fem. (?): fronte convexa, capitulo antennarum simplici.

Neue exotische Xyleborus-Arten.

Xyleborus declivis (Chapuis in coll.): *Ferrugineus nitidissimus*, thorace cylindrico postice subtilissime vage punctato, elytris subtilissime lineato-punctatis, interstitiis laevigatis planis postice oblique truncatis, truncaturae spatio subcirculari plano, denticulis duabus majoribus utrinque a sutura aequa remotis subarmata, ambitu granulis dispersis ornato. — Long. 2 Lin. — Patria: Teapa.

Xyleborus amplicollis (Chap. i. coll.): *Elongatus, cylindricus, ferrugineus, nitidus*, thorace cylindrico subampliato, lateribus vix rotundatis, postice subtiliter vage punctulato; elytris lineato-punctatis, interstitiis laevibus; declivitate postica planiuscula punctulata, papillis utrinque tribus ornata, una scilicet supra ad suturam, duabus alteris (superua et mediana) interstitio tertio sitis, interstitio secundo inermi. — Long. 1 Lin. — Patria: Porto Rico.

Xyleborus alternans (Chap. i. coll.): *Brunneo-ferrugineus, thorace cylindrico postice rarius subtilissime punctato; elytris subtiliter lineato-punctatis, interstitiis subaeque crebriusque seriato-punctatis; declivitate postica convexa, subruguloso-punctata nitida, interstutiis utrinque primo et tertio denticulis distantibus subaequalibus ornata; interstitio secundo inermi.* — Long. $1\frac{1}{2}$ Lin. — St. Domingo.

Xyleborus badius Dupont (?): *Ferrugineus, thorace cylindrico, postice rarius subtiliter punctulato, elytris stricte punctato-striatis, interstutiis punctorum serie ornatis, pone medium granulatis; depressione postica convexa subruguloso-punctata, nitida, interstutiis primo et tertio utrinque granulis distantibus subaequalibus ornata, interstitio secundo inermi, subimpresso.* — Long. 1 Lin. — Patria: Madagascar. St. Mauritius.

Xyleborus propinquus: *Piceo-ferrugineus*, thorace antice *infuscato*, *cylindrico*, postice *distincte punctato*; *elytris subtilissime lineato-punctatis*, *interstitiis subrugulosis subtilissime punctorum serie subornatis*; *declivitate postica convexa ruguloso-punctata nitida*, *interstitiis primo et tertio granulis minutis ornata*, *interstitio secundo integrum*. — Long. $1\frac{1}{4}$ Lin. — Patria: Amer. bor.

Xyleborus posticus (Chap. i. coll.): *Subelongatus*, *cylindricus*, *piceus*, *antennis pedibusque ferrugineis*, *thorace subquadrangulari* postice *subtilissime punctato*; *elytris striato-punctatis interstitiis punctorum serie ornatis*; *declivitate postica leviter striata*, *interstitiis omnibus ante medium tuberculis seriatis ornata*. — Long. $1\frac{1}{5}$ Lin. — Patria: Carracas.

Xyleborus grandis (Chap. i. coll.): *Subelongatus*, *thorace subquadrangulari gibbo disco subnodoso*, *postice confertim punctato*, *elytris punctato-striatis*, *interstitiis rarius subtiliter lineato-punctatis*, *declivitate convexa*, *interstitiis omnibus tuberculis acutis serialim adpersa*. — Long. $2\frac{1}{2}$ Lin. — Patria: Columbia.

Xyleborus subcostatus (Chap. i. coll.): *Oblongo-elongatus*, *brunneus*, *thorace subquadrangulo unice in medio granulis submucronato*, *disco subnodoso postice rugulis transversis rarius ulispero*, *elytris rugulosis*, *fortiter crenulato-striatis*, *interstitiis subcostatis serialim fulvo-pilosellis*; *declivitate postica serialim granulata*, *interstitio secundo utrinque spinula mediana armata*. — Long. 2 Lin. — Patria: Siam.

Xyleborus curtulus (Chap. i. coll.): *Breviter-cylindricus*, *thorace semicirculari postice subtilissime rarius punctato*, *lineola ante scutellum dense hirta*; *elytris striato-punctatis*, *interstitiis rarius serialim punctulatis*, *postice oblique subtruncatis*, *declivitate convexa serialim punctata setosaque*, *margine laterali subtilissime granulata*. — Long. vix $\frac{2}{3}$ Lin. — Patria: Brasilia.

Xyleborus capucinus (Chap. i. coll.): *Oblongus*, *thorace semielyptico gibbo antice in medio granulis prominentibus ornato* postice *confertim punctato*; *elytris longitudinaliter aequae convexis (subpulvinatis) confertim subtiliter punctatis*, *postice longius pilosellis subtilissime striatis*, *interstitiis subintegratis*. — Long. $1\frac{1}{4}$ Lin. — Patria: Guadeloupe.

Xyleborus rufithorax (Chapuis i. coll.): *Oblongus*, *obovatus*, *rufus*, *oculis elytrisque piceis*, *thorace subquadrato lateribus ante medium rotundato*, *postice profundius confertimque punctato*; *elytris subtiliter vage punctatis*, *declivitate postica convexa hirtella*, *granulis subconfertim adpersu*. — Long. $1\frac{1}{2}$ Lin. — Patria: Brasilia.

Xyleborus retusus (Chap. i. coll.): *Perbrevis, ater, ore, antennis pedibusque ferrugineis, thorace ample suborbiculari, gibbo, postice confertim subtiliter punctato; elytris thorace brevioribus subtiliter sparsim punctatis postice abrupte truncatis; declivitatis ambitu circulari acute elevato-marginato, spatio sparsim punctato.* — Long. $1\frac{1}{3}$ Lin. — Patria: N. Fribourg. (Mus. Chap.)

Xyleborus insignis: *Oblongus, subcylindricus, piceus, antennis pedibusque ferrugineis, thorace subquadrato, lateribus ante medium rotundato, margine antico medio crenulato, postice rarius subtilissime punctato; elytris subtilissime lineato-punctatis, interstitiis latis rarius subtilissimeque seriatim punctatis; declivitate postica oblique excavata, excavatione ante medium elytrorum incipiente, spatio ruguloso-punctato, supra utrinque dente valido a sutura remoto armato, margine laterali subserrato lineaque abbreviata acute serrata inter ambitum et dentem subornato.* — Long. $1\frac{2}{3}$ Lin. — Patria: Cayenne. (Mus. Chap.)

Xyleborus squamulatus (Chap. i. c.): *Oblongo-ovalis, piceus antennis pedibusque ferrugineis, thorace postice subtiliter rarius punctato; elytris striato-punctatis, interstitiis rarius seriatim punctulatis, postice oblique impressis, impressionis spatio squamulis fulvis dense obtecto, margine laterali granulis acutiusculis subserrato.* — Long. 1 Lin. — Patria: Brasilia.

Xyleborus abnormis: *Oblongus, piceus, antennis femoribusque ferrugineis, thorace suborbiculari gibbo, postice sublaevi, elytris confertim punctatis, oblique truncatis, truncatura pone scutellum incipiente, spatio ruguloso-punctato, margine laterali utrinque fortiter trispinoso suturaque elevatis; spina prima valida in medio elytrorum sita.* — Long. $1\frac{1}{4}$ Lin. — Patria: Ceylon.

Xyleborus horridus (Chap. i. c.): *Oblongus, subcylindricus, rufoserrugineus, elytris infuscatis flavo-hirtis; thorace subtransverso, antice rotundato, postice profundius confertim punctato; elytris subtiliter striato-punctatis interstitiis vage punctatis; declivitate postica ad suturam impressa spatio confertim ruguloso-punctata, spinulis utrinque subsuturalibus acutis, alteris minutis ab ambitu granulato remotis ornata.* — Long. 2 Lin. — Patria: Mexico.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift
\(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche
Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1868

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Eichhoff Wilhelm Josef

Artikel/Article: [Neue exotische Xyleborus-Arten. 280-282](#)