

A n h a n g.

Synonymische Bemerkungen über *Blaps*-Arten.

Da ich vorläufig noch nicht an eine gröfsere Arbeit über die Gattung *Blaps* denken kann, will ich hier einige synonymische Bemerkungen anreihen, um wenigstens in die Cataloge bessere Uebersichtlichkeit über die Zahl der wirklich vorhandenen Arten zu bringen.

1. *Blaps Krynickii* (Kar.) Kryn. Bull. d. Mosc. 1829 p. 195 ist nach einer im Bull. d. Mosc. ebenda mitgetheilten Note mit *B. parvicollis* Zoubk identisch; durch einen Druckfehler steht dort *brevicollis*, das näher angeführte Citat weist aber auf *parvicollis*.

2. *Blaps Fischeri* (Kryn.) Fisch. (Bull. d. Mosc. 1844) ist eine Abänderung der *Bl. pruinosa* (Eversm.) Fald. (Bull. d. Mosc. 1833) mit schwächer gestreiften Flügeldecken. Schaum erhielt von Eversmann selbst die Stammart und die Varietät als *pruinosa*.

3. *Blaps lusitanica* Herbst wird von Mulsant irriger Weise mit *Bl. Gages* verbunden; in Schaum's Cat. Col. Eur. ist ebenfalls irriger Weise *Bl. hispanica* Sol. als Synonym der *lusitanica* Hb. aufgeführt; die Solier'sche Art stimmt mit *lusitanica* Hb. in der Form zwar außerordentlich überein, hat aber im männlichen Geschlechte einen Haarpinsel am 1sten Hinterleibsringe, welcher dem Männchen der *Bl. lusitanica* (das im Berl. Museum noch vorhandene Original-Exemplar der letztern ist ein Männchen) abgeht. Beide Arten werden ihrer großen Aehnlichkeit halber oft verwechselt; Dejean und Rambur haben bald Männchen von *hispanica*, bald Männchen von *lusitanica* als *B. hispanica* Dej. versandt.

4. *Bl. sulcata* Küst. ist nicht, wie Küster annimmt, die egyptische *Blaps sulcata* Ol. Sol., sondern die ebenfalls egyptische *Bl. lineata* Dej. Sol. Küster giebt an, die Art selbst in Sardinien gefangen zu haben; im Berliner Museum befindet sich ein Exemplar mit der Angabe Sicilien. Das europäische Indigenat scheint also begründet zu sein.

5. *Blaps aegyptiaca* Sol. ist = *taeniolata* Ménétr. (Cat. d. obj. d. Cauc.)

6. *Blaps convexa* Fisch. p. 92 aus Podolien, welche etwas kürzere Spitze, weniger breiten Körper und schwächer gewölbten Thorax als *cuspidata* Mén. haben soll, ist jedenfalls nur nach schmalen Stücken der *abbreviata* Mén. beschrieben. Weshalb *Bl. abbreviata* Mén. in den Cat. Col. Eur. von Schaum und Stein mit einem Kreuz versehen ist, obwohl die ungarische *ovata* Sol. als synonym dazu citirt ist, bleibt mir unersichtlich.

7. *Blaps intrusa* Fisch. (Bull. d. Moscou 1844 I. p. 95) aus der großen Tartarei und Songarei, ist in den genannten beiden Catalogen wohl nur aus Versehen als europäische Art aufgeführt.

8. Dagegen scheint *Blaps pterostichus* Fisch. (Bull. d. Mosc. a. a. O. p. 93) aus Podolien und der Songarei irrtümlich fortgelassen.

9. Das typische Exemplar von *Blaps rectangularis* Sol. (Stud. ent. p. 316), welches ich bei Deyrolle sah, schien mir sicher zu *Blaps gibba* Cast. (*australis* Sol.) zu gehören.

10. *Blaps angulata* Reiche (Ann. soc. ent. de France 1857 p. 247) von den Ufern des todtten Meeres, ist nach Exemplaren der *Blaps cribrosa* Sol. beschrieben, bei denen die Seiten des Halschildes in der von Reiche beschriebenen Weise gebildet sind; eine Bildung, welche nicht als spezifisches Merkmal zu betrachten ist.

11. *Blaps striolata* Küst. (Käf. Eur. VII. 96) aus Sardinien, von welcher sich typische Exemplare in H. v. Heyden's Sammlung befinden, ist nicht spezifisch von *Bl. mucronata* zu trennen. Zu dieser Art gehört auch:

12. *Blaps sublineata* Brullé, nach griechischen Exemplaren mit deutlich gestreiften Flügeldecken beschrieben.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1869

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Kraatz Gustav

Artikel/Article: [Anhang. Synonymische Bemerkungen über Blaps- Arten. 281-282](#)

