

Coleopterorum messis in insula Cypro et Asia
minore ab Eugenio Truqui congregatae
recensitio:

de Europaeis notis quibusdam additis.

Auctore

Flaminio Baudi a Selve.

Pars quarta.

(Augustae Taurinorum: mense Aprili anni 1870.)

ELATERIDAE.

Agrypnus judaicus Reiche, 1. Syria.¹⁾

Adelocera carbonaria Schrauk, sat freq. Cypro.

Lacon pygmaeus m. (an *ovalis* Germ. var. *minor*?): *Ob-*
longo-ovatus, rufo-testaceus, subnitidus, pilis squamiformibus flavis
inaequaliter tectus; thorace transversim subquadrato, anterieus con-
vexo, postice deplanato lateribusque subangustato, angulis posticis
rectis, parum crebre fortiter punctato; elytris brevibus, convexiuscu-
lis, punctato-substriatis, squamulis basi densioribus, sutura plagaque
transversa pone medium nudis. — Long. $1\frac{1}{3}$ lin.

L. ovalis Germ. D. Candèze descriptioni pluribus conveniens.
hisce differre videtur: statura minor. squamulae piliformes flave-
scentes in capite thoraceque anterieus minus densae. hujus dimidio
postico densiores, spatio discoidali pone medium denudato parcius-
que punctato: thorax anterieus fortiter convexus. postice deplanatus.
lateribus ante medium rotundatis, a medio basin usque subrectis.
margine laterali arguto, haud explanato. angulis posticis rectis, ex
baseos interiore utrinque emarginatura subacutis: elytra basi thora-

¹⁾ *Agrypnus Notodonta* Latr. nuperrime prope Cairo in
Aegypto a Prof. Bellardi lectus fuit.

cis latitudine. lateribus leviter, apice simul magis rotundata. earum latitudine medio thoracis anticae subaequali, vix striata, punctis vero sat profundis seriatim impressa, interstitiis fere planis, uniseriatim subtiliter punctatis; basi densius squamulata, sutura, plaga indeterminata ante medium in singulo fasciaque transversa pone medium communi denudatis. Thoracis inferne latera fossula suturae prosternali parallela tarsis recipiendis exculpta, alia insuper retrorsum obliqua, obovali, marginibus utrinque argutis, a limbo basali sat discreta pro coxis recipiendis profunde excavata; fossulae etiam minores pro tarsis mediis in metasterno incisae. Unum spec. Cypro.

Alaus Parreyssii Stev. Cypro et Syria haud frequens.

Tetrigus cyprius m.: *Niger, subnitidus, subtilissime fusco-pubescent, elongato-ellipticus; thorace latitudine longiore, apicem versus convexiore et angustiore, crebre punctato, angulis posticis retrorsum productis, carinatis; elytris thoracis latitudine, subtiliter punctato-striatis, interstitiis crebre punctulatis, tertio basi latiore; antennis flabellatis pedibusque brunneis.* — Long. ♂ 12. ♀ 15 lin.

T. paralleli et *atri* Cand. descriptionibus sat prope congruens, singularae speciei sat distinctis notis discretus. Corpus atrum, sub pube tenuissima. depressa, fusca sat nitidum, prorsus in foemina elongato-subparallelum. in mare leviter posterius attenuatum. Caput sat declive, crebre, apicem versus fortius punctatum, fronte planato-subimpressa, antice late subrecte, oblique utrinque truncata. margine carinaeformi, laevi, epistomate verticali. utpote labrum, transverso apiceque subrecte truncato, ambohus grosse punctatis; os inferum, mandibulis sat conspicuis, prope basin utrinque subangulatim curvatis et supra obtuse dentatis, apice simplicibus; palpis. maxillaribus praesertim, modice elongatis, articulis elongato-obconicis, ultimo praecedente sesqui fere longiore, apice in mare subrecte, in foemina subrotundatim truncato. Antennae breves, thoracis angulos posticos haud attingentes, in utroque sexu (in mare longius), flabellatae, articulo primo valido elongatoque, secundo et tertio brevibus, annuliformibus, quarto-decimo flabello sensim paullulum decrescente instructis. undecimo elongato. inferne emarginato. *) Thorax latitudine paulo longior. apicem versus sensim leviter attenuatus fortiusque convexus, lateribus anterie subverticalibus, postice

*) Inconsulto forlasse auctore antennarum articulus ultimus superne emarginatus in Cand. Mon. El. tomi 1. tab. 5. icone 5^a. aere figuratus.

sensim subdepressus, basin secus utrinque transversim impressus, medio longitudinaliter subelevatus, angulis posticis retrorsum productis, acutis, fortiter carinatis, foeminae paullulum longioribus magisque divergentibus, margine laterali argute cariniformi, integro, ante basin leviter emarginato; crebre dorso punctatus, punctis anterieus disco minus densis, lineae laevioris longitudinalis medio vestigio conspicuo. Scutellum declive, apice rotundato-attenuatum. Elytra basi thoracis latitudine, eodem duplo cum dimidio prope longiora, transversim modice convexa, apicem versus, in foemina praesertim, depressa, apice conjunctim rotundata, basi circa scutellum late profundeque foveaque orbiculari in singuli medio impressa, tenuiter punctis validiusculis substriata, interstitiis subtiliter dense punctatis, in mare deplanatis, in foemina convexiusculis, tertio basi latiore: carina marginali ad coxarum posticarum limbum anticum abbreviata. Lateralia thoracis inferne late longitudinaliter concava, crebre prosternum parcius fortiter punctata; hoc antice mediocriter productum, ante apicem transverse bifariam plicatulum, spina postice longe acute producta, subrecta, suturis utrinque parum latis, laevibus, antice latius breviter impressis. Mesosternum declive, fossulae labiis subparallelis, sutura profunda a metasterno distinctum. Pedum posticorum coxae uti in memoratis speciebus descriptae, at earundem trochanteres (ex icone) validiores, margine interno magis rotundati, crassiusculi. Abdomen et metasternum aequaliter subtiliter punctata: pedes nigro-brunnei vel rufo-brunnei, trochanteribus tarsisque rufo-ferrugineis. Quatuor spec. Cypro.

Heteroderes crucifer Rossi, haud rarus.

Heteroderes grisescens Germ., 2 spec.

Drasterius bimaculatus Fabr. vulgaris; praesertim varietates c. et d. sec. Candèze, vivide depictae: variat interdum niger, macula thoracis postica magna utrinque, plagaque lata postice obliqua in singuli elytri basi rufis: rarius omnino niger, vel elytris summa tantum basi anguste rufescentibus.

Drasterius figuratus Germ., vulgaris Cypro et Beryto, variabili etiam pictura, totus interdum rufescens, capite fasciaque postica elytrorum indeterminate fuscis.

Elatér pulcher m.: *Ater*, nitidus, flavo-pubescentis, capite thoraceque confertim punctatis, hoc obsolete cunaticulato; elytris ultra medium parallelis, coccineis, quadrante postico nigris; antennis pedibusque piceis, tarsis dilutioribus. — Long. $3\frac{1}{2}$ lin.

Elatere balteato Linn. forma simillimus ejusque minoribus speciminibus statura subaequalis; antennis paulisper longioribus, arti-

culo secundo tertio dimidio fere brevior, thorace in utroque sexu regulariter anterieus rotundatim angustato, crebrius quam in illo, disco praesertim, punctato, evidentius canaliculato, elytris laete coccineis, quadrante apicali determinate nigris praecipue distinctus. Niger, supra infraque pube flava vel fulvescente parum dense tectus. corpore subparallelo, modice convexo. Caput crebre punctatum. antennis tenuibus nigro-piceis, articulis secundo tertioque rufo-piceis. Thorax a medio apicem versus rotundatim angustatus, disco confertim, sat profunde, fortius crebriusque latera versus subrugose punctatus, medio subtiliter longitudinaliter canaliculatus, canalicula antrorsum obsoleta; angulis posticis fortiter carinatis. Elytra uti in citata specie extructa, striata atque punctata, coccinea, macula magna communi, ut plurimum anterieus rotundata, determinata, apicis quadrantem occupante, atra signata. Infra thorax relative etiam crebrius punctatus, metasterno abdomineque subtilius, illo spatio longitudinali medio laevi. Pedes picei vel rufo-picei, trochanteribus tarsisque dilutioribus. 12 spec. Cypro.

Elater Megerlei Lacord. haud freq. Cypro: a nostratibus variat antennarum articulo tertio triangulariter dilatato, quarto parum minore; capite thoraceque interdum rufo-piceis: rarius statura sesqui fere minor, brunneus, thorace lateribus magis parallelo, a quadrante antico tantum apicem versus angustato, multo subtilius punctato.

Cryptohypnus alysidotus Kiesw. sat frequens Cypro: a nostratibus statura minore discedens, thorace nigro hirsuto, notisque aliis a D. Candèze (Mon. El. tom. 3. p. 83) de turcicis speciminibus allatis distinctus.

Cardiophorus syriacus Lin. 1 spec. Syria.

Cardiophorus cyanipennis Muls. 2 spec. Syria.

Cardiophorus aeratus Er. = *nigricornis* Baudi. Cypro frequens. ²⁾

Cardiophorus vestigialis Er. minus freq. Cypro.

Cardiophorus tenellus Reiche. 1 spec. id.

Cardiophorus dilutus Er. spec. duo Cypro, elytris thorace dilutioribus, macula fusiformi communi ad suturam indeterminata

²⁾ *Cardiophori Argioli* nec non *ulcerosi* Gené centena specimina in Sardinia legi, praeter memoratas ab auctoribus varietates, *Argiolus* rarius thorace toto rufo occurrit, necdum vero penitus nigrum, uti *ulcerosus* interdum obviis, vidi.

fusca. *C. decori* Fald. faciem quasi referens. at alia thoracis structura unguiculisque simplicibus huc referendus. ³⁾

Cardiophorus crassicollis Er. sat frequens Cypri videtur, varians plerumque capite thoraceque nigro-piceis, elytris obscure castaneis, his rarius testaceis; hand raro plus minusve dilute castaneus, antennis pedibusque rufo-testaceis; abdomine saepius rufo-limbato; omni corpore infra pube cinereo-sericante sat densa induto prae caeteris in thorace pubescentiae dispositionis causa allatae speciei referendum censeo.

Cardiophorus decorus Fald. 1 spec. Cypri.

Melanotus cuneiformis m.: *Niger, nitidus, griseo-pubescentis. thorace latitudine longiore, a medio apicem versus arcuatim angustato, disco parce, lateribus crebre fortiterque punctato, basi obsolete canaliculato; elytris apicem versus sensim attenuatis, profunde. apice subtilius punctato-striatis, interstitiis vage punctatis; pedibus obscure rufis.* — Long 8 lin.

M. sulcicollis statura eique corporis nitore, thorace latitudine longiore elytrisque regulariter apicem versus attenuatis valde affinis videtur; thorace attamen obsolete subtiliter canaliculato praecipue distinctus. Corpus ut in *castanipede* elongato-attenuatum, verumtamen acutius, thorace longiore, regulariter arenato, atrum, pubescentia minus subtili, grisea parum dense obtectum. Caput minus crebre fortiter punctatum, fronte medio foveolata; antennae graciliusculae, articulo tertio secundo sesqui longiore, quarto paulo brevior, obconico, serratae, nigrae, basi nigro-piceae. Thorax longitudinaliter parum convexus, latitudine tantisper longior, lateribus basi vix, arcuatim a triente apicem versus modice rotundatis, dorso parcius, antice lateribusque sensim crebrius fortiusque punctatus, punctis margines secus umbilicatis, angulis posticis carinatis; disco medio lineola tenui longitudinali, utrinque abbreviata impressus, obsolete postice canaliculatus. Scutellum latitudine parum longius, apice rotundatum, nitidum, obsolete parce punctatum. Elytra basi thoracis latitudine, eodem triplo fere longiora, apicem versus sensim, arcuatim postice attenuata, basi profunde punctato-striata,

³⁾ *Cardiophorus incanus* Er., cujus exemplar a D. Friwaldsky ex Hungaria accepi, descriptioni speciminibusque tribus e Sardinia in collectione R. Musei Taurinensis nomine *inflatus* a Prof. Gené inscriptis apprime consonum, methodice inter *asperulum* e *rubripedem* meo iudicio collocandus.

striis apicem versus sensim subtilioribus, uti et interstitiis a basi sensim minus convexis, vage punctulatis. Thorax inferne cum prosterno sat crebre punctatus, hoc spatio latiore longitudinali medio laevissimo: dispersa etiam et subtilissima metasterni abdominisque medio longitudinaliter punctura. Pedes obscure rufescentes. Octo specimina Cypro, antennis omnibus pubescentibus, haud villosis.

Melanotus rufipes ?Herbst. 1 spec. Corpore foemineis *rufipedis* speciminibus statura minore, posterius minus attenuato abdomineque evidenter subtilius punctulato: fronte subaequali, margine antico fortius elevata, thorace lateribus medio multo magis rotundato, ante angulos posticos magis emarginato, elytris ultra medium parallelis; dubium mihi, an unicum foemineum specimen ad *M. bajulum* Er. potius forte sit referendum.

Melanotus dichrous Er. sat frequens; variat ut plurimum thorace anterieus latius quam in sicutis et sardois speciminibus truncato, in mare subtilius, fortius in foemina punctato.

Melanotus fusciceps Er., minus freq.

Athous cyprius m.: *Rufo-ferrugineus, fulvo-pubescent, fronte anterieus bifoveolata, apice subarcuatim truncata, antennarum articulo tertio obconico quarto longiore; thorace latitudine paulo longiore, lateribus anterieus rotundato, angulis posticis subdivaricatis, carinatis; elytris thoracis latitudine, postice subdilatis, convexis, punctato-striatis, interstitiis subcarinatis: tarsorum articulis longitudine sensim descrescentibus.* — Long. 7 lin.

Unum spec., foemina Cypro; tarsorum posticorum structura ad 2^m. (Candèzei systematis) generis sectionem pertinet. antennarum forma ad subdivisionem secundam, congenerorum in hac maximus, rufo-ferrugineus, specimine tantisper detrito, parce fulvo-pubescent, oculis, frontis thoracisque margine antico nigris. Caput fortiter parum crebre punctatum. fronte ante apicem foveis duabus impressa. margine antico laevi, subelevato; antennae thoracis angulos posticos vix attingentes, articulis 2—3—elongato-obconicis, hoc illo sesqui, parum quarto longiore et tenuiore, quarto - decimo sensim minus serratis, pallide flavae. Thorax modice supra convexus, latitudine paulisper longior, lateribus rotundatis, ante basin utrinque emarginatis, angulis posticis mediocribus, divaricatis, argute sat longe carinatis, margine laterali etiam basi infero; dorso subtiliter parum crebre et parum profunde punctatus, punctis utrinque uti et marginis inflexi paulo densioribus. distinctis tamen et umbilicatis, prosterni simplicibus tenuioribusque. Scutellum oblongo-subquadratum, subtiliter punctulatum, longitudinaliter leviter elevatum. Elytra

thoracis latitudine, pone medium usque lateribus parallela, trientem apicalem versus subdilata indeque apice sensim attenuata; modice convexa, posterius subdepressa, subtiliter, basi parum, apice profunde punctato-striata, interstitiis subtiliter punctulatis, longitudinaliter, basi praesertim, medio subelevatis. Metasternum et abdomen subtiliter punctata.

Ludius Guillebelli Muls., haud rarus mas Cypro videtur, multo minus frequens foemina, statura longe major, crassiuscula, thorace lateribus subparallelo, antice crasso, subtruncato, subinaequaliter punctato.

Agriotes corsicus Cand., 1 mas Cypro ⁴⁾, penitus rufo-testaceus.

Agriotes meticulosus Cand., haud freq. Cypro. ⁵⁾

⁴⁾ *Agriotes corsicus* et in Pedemontio, Alpibus maritimis Apenninisque Etruriae passim obvius, modo omnino niger, antennis apice femoribusque fuscis, illis basi, tibiis tarsisque testaceis, modo elytris obscure castaneis; saepius uti ab auctore depictus.

Ad *A. Grandinii* Cand., ni fallor, quatuor referenda specimina a me ipso in Sardinia reperta, quae, etsi statura minora (long. vix 3 lin.), coxarum posticarum structura, thorace oblongo, subparallelo, fere cylindrico, antennis pro statura brevibus, articulis mediis crassiusculis etc., auctoris descriptioni sat apte respondent: hoc in his notatu dignum observavi palporum maxillarium articulum ultimum eis non obtrigonum, sed oblongo-truncatum esse.

⁵⁾ *Agriotes italicus* m.^{*)}: *Oblongus, subcylindricus, modice convexus, niger, subopacus, cinereo-pubescens, thorace subquadrato, antice crassulo, lateribus subparallelo, creberrime fortiter punctato; elytris modice convexis, pone medium usque parallelis, punctato-striatis, interstitiis granulatis; pedibus brunneis, antennis tarsisque ferrugineis.* — Long. 4 lin.

A. sordidi majoribus individuis statura et facie similis, lateribus equidem parallelus; at praecipue thorace anterieus convexiore, subdilato, crebrius, fere itidem ac in *obsuro*, punctato, sulcis basalibus longis, rectis, elytris longitudinaliter haud depressis discedit: *obsuro* etiam valde affinis, coxis posticis extus magis angustatis, thoracis structura elytrisque pone medium haud crassioribus distinctus. Corpus nigro-fusum, pube densa grisescente oblectum,

^{*)} v. Kiesenwetter glaubt, daß der Käfer noch zum *sordidus* gehören könnte, welcher enorm variiert. G. Kraatz.

Ectinus Theseus Germ., haud rarus Cypro.

Silesis terminatus Er., sat freq. Cypro et Beryto.

subopacum, parallelo-subcylindricum. Caput et thorax ut in *obsuro* creberrime profunde punctata, mandibulis compressis; palpis antennisque ferrugineis. Thorax latitudine in mare vix, in foemina haud longior, in hac praesertim anterieus crassiusculus et latior, lateribus antice citius rotundato-attenuatus, a triente antico basin usque parallelus, basi obsolete longitudinaliter medio impressus, angulis posticis haud divergentibus, carinatis, sulculis basalibus profundis, longiusculis, rectis. Scutellum densius pubescens. Elytra thoracis latitudine, ultra medium usque parallela, regulariter transversim convexa, itidem fere ac in *sordido* sat profunde punctato-striata, interstitiis planis, subtilius densiusque granulosis. Corpus infra dense pubescens, thoracis laterum punctura densa, substrigosa, prosterni minus crebra, fortiore, metasterni abdominisque subtilissima: coxae posticae ejusdem ac in *sordido* structurae. pedibus plus minusve obscure ferrugineis, tarsis, tum etiam tibiis interdum rufo-ferrugineis.

Ab *Agriote Laichartingi* Gredl. antennis, itidem pro genere tenuibus, articulo primo crassiore, elongato, sequentium duorum conjunctim longitudine subaequali, tertio tamen secundo paulisper brevior, quarto minore eique longitudine subaequali; thoracis sulculis basalibus longis, valde conspicuis, carinula marginali ejusdem prorsus integra praecipue discedere videtur.

Passim in Pedemontanis collibus; Ravennae etiam cum *Cardiophoris rufipede* et *Equiseti* in floribus Mespili pyracanthae legi.

Agriotes sordidus Ill. in australi Sardinia communis, sicut speciminibus plerumque minor (*rufipalpis* ? Brullé), nigro-piceus, thoracis margine antico saepius angulisque posticis, elytris etiam interdum, plus minusve dilute castaneis.

Sericosomus brunneus Lin. var. *sulcipeunis*. In M. Rosa et Apenninis rarius mascula specimina occurrunt, statura minora et praecipue angustiora, thorace paulisper adpressius punctato, basi utrinque intra angulos posticos fortius emarginato, unde anguli ipsi acute angustiores fiunt; elytris apicem versus subaequaliter sensim attenuatis, eorundem lateribus pone medium multo minus arenatis, profunde striato-punctatis, interstitiis plus minusve crebre fortius granulatis dilutiusque testaceis.

DASCYLLIDAE.

Cyphon variabilis Thunberg. Cypro et Syria haud freq., variat plerumque (velut in sardois et siculis speciminibus) corpore paulisper angustiore atque elongatulo, capite plerumque rufescente; elytris saepius immaculatis, crebrius, subtilius punctatis densiusque pubescentibus.

Hydrocyphon australis Linder. Cypro haud rarus videtur.

MALACODERMATA.

Lampyris Raymondi Muls. = *lusitanica* Motsch. Duv. Syria.

Lampyris berytensis ?Fairm. Quodam quamvis cum dubio, ex paneis attamen, quoad hanc, ab auctore notis allatis, syriaca quaedam specimina ei referenda censeo. Corporis habitum atque picturam *L. Reichei* valde accedit, at paullo latior, thorace concolore, abdominis segmenti ventralis ultimi forma distincta. Antennae, pro genere, longiusculae, graciles atque parum compressae, rufo-testaceae, articulis mediis superne infuscatis, tertio quarto evidenter brevior, hoc crassitie sua plus quam duplo longiore, sequentibus sensim minoribus brevioribusque, ultimo praecedente sesqui fere longiore, extus apice emarginato, acuminato. Thorax structura similis, apice paulo latius rotundatus, angulis posticis quandoque etiam, ut in illa, extrorsum leviter prominulis, rufo-testaceis, plaga discoidali postica rosea vel pallescente, ibidem minus inaequaliter, plus minusve obsolete punctulatus. Elytra itidem fere exculpta atque depicta, lateribus postice magis adhuc dilatata, costulis saepius magis elevatis. Abdomen segmentis dorsalibus medio subelevato-carinatis, apice late emarginatis, angulis posticis longius productis, ultimo sat convexo obsoleteque late utrinque impresso, lateribus modice rotundato, ante apicem utrinque obsolete emarginato, medio apice perquam late rotundato; segmento ventrali ultimo dorsali exacte latitudine aequali, medio longitudinaliter obsolete canaliculato, apice modo late parum profunde emarginato, modo utrinque subsinuato medioque parum profunde exciso. Mares solummodo vidi.

Lampyris libani Lap. Cyprum specimen *L. Reichei* quoque nec non *berytensi* facie affine, ab utroque corpore paulisper angustiore thoraceque basi subtrisinuato primo intuitu distinctum. Antennae pariter ac in praecedente longiusculae, at paulo minus tenues, articulo tertio quarto evidenter longiore, ultimo praecedente vix longiore, apice obsoletius emarginato, minus acuminato. Tho-

rax ejusdem fere structuræ, paulisper angustior, crebrius subtiliusque. etiam in plaga postica leviter infusca, punctatus, lateribus usque medium subrectis, antè medio obsoletissime longitudinaliter carinatus posticeque canaliculatus. margine basali medio late magisque emarginato, angustius utrinque ante humeros; angulis posticis vix productis, subrectis. Elytra lateribus pone humeros apicemque versus modice dilatata, medio leviter angustiora, angustius apice attenuata, paulisper scabrosius quam in *Reichei* punctulata. costulis sat elevatis, uti in ea depicta. Abdomen segmentis dorsalibus lateribus paulo magis rotundatis, fortius apice emarginatis, angulis posticis magis prominulis, apice muticis, ultimo fere ut in illa constructo, equidem dorso apicem versus medio subcarinato, sat profunde minusque late utrinque impresso, apice vero longe obsoletius utrinque emarginato, lobo medio parum producto, late rotundato; ventrali ultimo longitudinaliter medio canaliculato, dorsali angustiore, lateribus modice rotundato, apice utrinque oblique emarginato, lobo medio triangulariter producto, latiusculo, apice mutico, simplici, pygidium vix excedente. Unienm; mas.

Lampyris syriaca m.: Elongata, angustula, flavescens, elytris basi fuscis: thorace semielyptico, postice canaliculato fusco-que-maculato; elytris crebre punctatis, leviter tricostatis; pygidio apice rotundato. Mas segmento ventrali ultimo medio acuminato-producto: foemina elytrorum rudimentis sat explicatis, margine laterali bisinuatis, apice acuminatis. — Long. 7 lin.

Haud frequens in Syria.

Mas corpore fere uti in *noctiluca* et *Lareynii* elongato, magis fere angustato, subparallelo, elytris crebre distinctius punctatis in primis ab affinibus distinctus; tenuiter fulvo-pubescent, flavo-testaceus, thoracis disci carinulis elytrisque basi infuscatis. Antennae paulisper, quam in praecedente, breviores et crassiusculae, structura caeterum atque pictura conformes. Thorax relative apice angustior, apice angustius rotundatus, fere attenuatus, basi longe obsoletius, quam in affinibus, emarginatus, fere recte truncatus, angulis posticis rectis; distincte crebreque punctatus, carinula apicali media usque pone medium producta, inde basin usque sat profunde canaliculatus, canaliculae marginibus elevatis, nitidulis. Elytra pone humeros vix thorace latiora, lateribus subparallela, vix pone medium angustata, apice acuminato-attenuata, distincte, minus subtiliter, sat crebre punctata, costis tribus parum elevatis marginibusque, laterali postice crassiusculo, laevibus. Abdominis segmenta dorsalia distinctius et minus subtiliter punctulata, fere ut in praecedente con-

structa, lateribus minus rotundata, ultimo fere semicirculari, equidem ac in illa dorso subcarinato atque impresso, apice medio subtruncato, utrinque vix sinuato, potius margine subelevato; ventrali ultimo praecedentibus nitidiore, vix canaliculato, apice utrinque fortiter emarginato, lobo medio triangulariter sat producto, apice angustato, pygidium excedente atque superne conspicabili.

Foemina (meo visu et qua ratione in Truquii capsellis collocata descripto mari tribuenda) statura longior, rufo-testacea, thorace flavescente, macula magna in disco postico transversim subquadrata rufescente, elytrorum rudimentis fuscis, margine laterali suturalique basi anguste pallidis. Antennae fere ut in mare constructae, compressae, articulis paulisper magis adpressis, tertio quarto paullulum longiore. Caput veluti in *L. Reichei* infuscens, fronte convexiore obsolete longitudinaliter canaliculata, antice vix transversim impressum, eo, quod antennae ab oculis remotius insertae, paullo magis porrectum; palpis maxillaribus validiusculis. Thorax latitudine fere longior, magis quam in mare summo apice quasi angulatus, basi quinquies sinuatus, fere ut in eo punctatus, apice breviter carinatus, latius disco postico longitudinaliter foveolatus, foveolae marginibus elevatis. Scutellum paulisper latius, oblongo-subquadratum, apice latum, rotundatum. Elytrorum rudimenta aequae ac in citata specie explicata, margine attamen interiore pone scutellum paullo magis rotundata, angustius ante apicem emarginata, laterali sat fortiter ad humeros rotundato, medium circa leviter emarginato, apicem versus denuo leviter rotundato, apice auctiuscula, intra marginem lateralem basi profundius, apicem versus obsolete canaliculata, confuse punctulata. Abdominis segmenta supra infraque parum distincte roseo-varia, segmento dorsali ultimo elongatulo, utrinque rotundato, atque ante apicem obsolete emarginato, apice subrotundatim truncato; ventrali ultimo nitidulo, longiusculo, apicem versus sensim rotundatim attenuato, apice emarginato.

Thorace praesertim longitudine haud latiore, basi haud arcuato, angulis posticis retrorsum haud prominulis aliterque exculpto, nec non abdominis segmentorum apicalium structura a *maculicollis* Fairm. praecipue, tum etiam et statura insuper minore angustioreque ab *insigni* Ancy (Abeille t. 7. 1870. p. 86) distincta videtur.

Luciola maculithorax Gemminger = *maculicollis* Muls. Una et Syria.

Luc. lucifera Reiche. Unum spec.

Luc. suturalis Ménétr. Haud freq. Cypro.

Telephorus dimidiatipes Reiche. Syria.

Tel. marginiventris Reiche. Syria.

Tel. cyprius Mars. Cypro haud rarus.

Tel. lividus Lin. var. *melaspis* Chev. Haud freq. Cypro.

Tel. tarsalis Reiche. Cypro rarus.

Rhagonycha (*Armidia*) *Kiesenwetteri* Mars. Haud rara Cypro: ob capitis thoracisque structuram *fossulatae* et *sulcicolli* proxime in systemate collocanda; pulcherrima species *Lepturae* faciem quandam exhibens, capite ante ocnlos sat porrecto, genis magnis, sutura profundiore ab epistomate distinctis, hoc magno, dorso aequaliter convexo, apice utrinque haud impresso, atque fortius rotundato: mas statura paulisper graciliore, capite pone oculos angustiore, his valde prominulis; unguiculis in utroque sexu edentatis, apice fissis, spinulis longitudine inaequalibus.

Rhagon. nigritarsis Br. Cypro et Syr. haud freq.

Rhagon. Chevrolati Mars. Cypro haud rara videtur: statura quamvis majore elytris apice nigro-maculatis, cum praecedente, ob thoracis praecipue structuram, majorem, quam cum *melanura* Ol., affinitatem in ea invenio.

Rhagon. straminea Kiesw. Unum in Syria specimen.

Rhagon. tripunctata Reiche. 1 ♂ thoracis macula media obsoleta, lateribus conspicuis.

Malthinus rubricollis Baudi. Quaedam specimina Cypro. Galliae meridionalis italicisque identica. Mas: abdominis segmento ventrali penultimo praecedentibus obscuriore atque crassiusculo, procul a basi (sat exserto) minus profunde rotundatim exciso, limbo posteriore omni crassulo, dense flavo-ciliato, ultimo flavo, apicem versus sat curvato convexoque, basi medio longitudinaliter canaliculato, a medio longitudinis suae fisso, vel a basi apicem prope usque membrana tenuissima solummodo juncto.

Variat interdum capite anterieus rufescente pedibusque posticis multo minus infuscatis. Ex descriptione *M. syriacus* Mars. (Abeille 1868. p. 178) a *rubricolli* haud discedere videtur.

Malth. axillaris Kiesenv. Praecedente parum frequentior Cypro. Mas: thorace anterieus minus ampliato, plerumque flavo, macula magna media integra, ramulum utrinque pone medium porrigente, atra notato, corpore infra flavo, metasterni triangulari plaga postica media, abdominis segmentis basi, femoribus tibiisque posticis basi late nigris: abdomine segmentis ventralibus fere uti in *M. flaveolo* Payk. constructis, penultimo medio breviter exserto, ultimo magno, cupuliformi, apice medio breviter fisso. Foemina ple-

rumque thoracis macula flava ad angulos anticos obsoleta, capite latius nigro.

Multhodes berytensis Reiche. Cypro etiam obvius. Mas: segmentis dorsalibus duobus ultimis parum elongatis, ultimo apicem versus leviter angustato, angulis apicalibus rotundatis. apice subrecte truncato, atris; ab iisdem inferne membrana valida, flava, apice fusca, declivis, apicem versus sensim attenuata forcipisque instar apice fissa leviterque incurva exoritur: ventrali penultimo subrotundatim profunde emarginato, lobis utrinque rotundatis. ultimo stylum validum, parum arcuatum, longitudine sua parallelum atque convexum, apice triangulariter excisum exhibente: setulae duo validiusculae, recurve ex ano interiore interdum conspicuae.

Variat foemina (*flavicollis* ipse in litt.) statura sesqui maiore, thorace penitus flavo, dorso aequali, lateribus et basi utrinque fortius marginato, basi magis. fere biangulatim, rotundato.

Pone *prodigiosum*, ante *siculum* species systematice collocanda videtur.

DRILINI.

Malacogaster Truquii m.: *Niger, parce fusco-pubescentis, parum nitidus, antennis articulo primo rufo; pulpis, pedibus anoque rufo-testuceis; capite profunde anterieus impresso thoraceque transversim subquadrato crebre fortiterque punctatis; elytris crebre rugosis, subcostatis; oculis sat prominulis.* — Long. $3\frac{1}{2}$ lin.

Caput vertice convexo, fronte verticali, late excavata, ad antennarum insertionem utrinque subcarinato-elevata, apice rotundatim utrinque, emarginatim medio truncata; crebre sat fortiter subaequaliter punctatum; oculis modice prominulis, subovatis; labro transversim conico, lateribus basi subrotundato, apice subtruncato, medio late impresso, pariter ac mandibulae medio, rufo; palpis maxillaribus flavis, longiusculis, filiformibus at validis, articulo tertio secundo dimidio, quarto paulo brevior, hoc apicem versus leviter attenuato, fusco, apice oblique truncato pallidoque: antennae validae, capite cum thorace sesqui longiores, serratae, nigrae, articulo primo rufo. Thorax transversim subquadratus, latitudine dimidio fere brevior, subrecte antice, subrotundatim basi truncatus, margine basali elevatulo, intra angulos posticos utrinque leviter sinuato-depresso, medio anguste emarginato; lateribus subrectus, margine laterali argute basin versus sensim elevatulo atque ad angulos posticos incrassato, antice fortiter declivi; basi parum, antice sat transversim convexus, dorso inaequalis, marginem basalem secus ob-

solete, ad angulos posticos et foveola longitudinali ante scutellum profundius impressus, crebre sat profunde. basin prope crebrius subrugose punctatus, niger, subnitidus. Scutellum triangulare, apice rotundatum, convexum, confertim punctatum, nigrum. Elytra summa basi thorace paulo latiora, ab humeris per longitudinis quadrantem sensim leviter ampliata, inde apicem versus modice attenuata, aliquantulum ad suturam dehiscencia, singulo apice anguste rotundato; thorace ultra quadruplum fere longiora, abdomine paullulum breviora, crebre rugosula, transverse quasi substrigosa, costula longitudinali obsoleta, medio magis conspicua instructa, basin versus eam inter et suturam obsoletissime costulata, parum nitida, nigra, tenuiter fusco-pubescentia. Corpus infra nigrum, nitidulum, sterno parce, abdomine crebrius punctulatis, sparsim pubescentibus; stigmata prothoracica tubuliformia, exserta; pedes validi, femoribus magis fere quam in *M. Passerinii* compressis et dilatatis, cum coxis laete rufo-testacei. tarsorum articulo ultimo fusco. Abdomen nigrum, segmento septimo anoque rufo-testaceis, illo margine apicali integro, medio leviter angulato, in denticulum quasi producto. Unico cyprio specimini, a citata specie plane distincto, atque relative angustiore longioreque, palpi labiales mortis angore inter mandibulas prehensi conspici nequeunt; hae valide medio intus dentatae.

Malacogaster rufipes m.: Niger, griseo-pubescent, subnitidus, palpis, pedibus anoque rufo-testaceis; capite profunde anteriorius impresso confertim, thorace transversim subquadrato crebre punctatis; elytris rugulosis, obsoletissime subcostatis; oculis valde prominulis. — Long. $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ lin.

Praecedenti facie simillimus, eo multo minor. oculis magis prominentibus, thorace nitidiore paulo minus profunde, minus crebre punctato palporumque maxillarium structura prae caeteris distinctus. Caput ut in illo constructum, fronte minus crebre punctata, margine antico recte truncata; labro brevi, transverso; oculis magis convexis, fortius prominulis. eorundem latere postico magis recto distinctius ovatis: palpis maxillaribus medioeribus, articulis secundo tertioque obconicis, hoc illo ultimoque sesqui brevior, ultimo obovato, apice acuminato, fuscis, tertio basi, quarto apice flavis; labialibus fuscis, parvulis, articulis duobus primis minutis, ultimo majore, ovato, acuminato: antennarum articulis duobus primis plus minusve piceis, sexto-decimo minus serratis, eorundem angulo apicali minus producto. Thorax structura illi pariter consimilis, relative attamen brevior, basi subaequaliter et latius rotundatus. angulis posticis obtusis, subrotundatis; dorso inaequalis, obsoletius basi impressus,

punctura minus profunda. disco praesertim. nitidior. Scutellum triangulare. apice acutiusculum. leviter convexum. obsoletius punctulatum. Elytra structura aeque conformia, apice tantisper minus attenuata, crebre subtiliter rugulosa, obsoletissime costulata. parum nitida. Corpus superne griseo-fusco-pubescent. inferne nitidulum. parcius fusco-villosum; stigmatibus prothoracis plerumque conspicuis. minus exsertis: hisce pedibusque cum coxis laete rufo-testaceis. tarsis relative angustioribus, pro genere tenuiusculis. articulis tribus saltem ultimis fuscis: abdominis segmentum ventrale septimum cum ano rufo-testaceum. margine apicali leviter undulato. mucico. Sat frequens Cypro videtur.

Duobus hisce speciebus mandibulae quamvis. ab apice longe. fortiter intus dentatae adpareant. *Malacogastro* generi ob capitis fronte verticali. structuram. oculos plus minusve ovatos. elytra ad suturam dehiscencia. apicem versus attenuata abdomineque breviora tribuere non haerui: iisdem capite plerumque reclinato instrumenta interiora cibaria accurate perlustrare impar fui.

Drilus posticus Schaaf. Cypro quaedam specimina.

Drilus rectus Schaaf. Cypro rarus. Veluti *M. Truquii* et *rufipes* ab europaeo. cypriae hae duo species a nostratibus *Drilus* corpore magis elongato posticeque magis attenuato discedunt, in his vero elytra haud dehiscencia. abdomen totum tegentia. Palpi maxillares in *D. postico* et *recto* subcylindrici. in illo sat. in hoc valde elongati. articulo ultimo. latere interno excepto, circumcirca intersecto. ex duobus quasi conflato: labiales filiformes. in *recto* praesertim. tenuiusculi atque elongati.

Omnibus tarsorum articulus quartus superne cordiformis atque bilobus videtur, at inferne pellicula apice integra simplex. productus.

MELYRINI.

Apalochrus flavo-limbatus Muls. Duo spec. Cypro. ⁶⁾

Malachius erythropterus Er. quaedam in Syria specimina.

Mal. coccineus Er. Cypro haud rarus.

Mal. carnifex Er. Minus freq. Variat mas elytris, macula scutellari excepta, flavo-testaceis: foemina iisdem. praeter scutellarem, marginali vitta minus angusta ab illa pone humeros proficiente, aequaliter apicem fere usque producta.

⁶⁾ *Apalochrus flavo-limbatus* Muls. Sardiniae etiam et Siciliae incola.

Malachius ornatus Fald. Unicum specimen syriacum cum eo quod in Dejeaniana collectione extat, capitis praesertim structura congruit; variat attamen statura paulisper minore, elytrorum macula communi basi utrinque angusta, emarginatim citius suturam versus attenuata, inde tridentem usque posticum subparallela, ad quadrantem ab apice triangulariter terminata; capite caeterum itidem ut in eo antennarumque articulis duobus primis constructis, secundo praesertim fortiter introrsum dilatato, tertio quartoque triangularibus, sequentibus sat fortiter serratis, longioribus, nigris, primis quatuor infra flavis.

Malachius flabellatus Friv. Cypro sat frequens.

Malachius fullaciosus m. Septem specimina Cypria, omnes foeminae, *M. bipustulato* statura et forma valde affinia, hisce discedunt: capite inter oculos lineola transversim impresso, fronte inter antennis sat profunde excavata (multo attamen minus quam in *ornato* Fald.), nigro-virescente colore angulatim antice producto atque oculos circa, ad eorundem etiam marginem anticum diffuso, labro haud maculato: antennis veluti in *australis* Muls. foemina ab auctore delineatis, articulis primis subtilius vix maculatis: thorace pro sexu admodum nitido, macula utrinque magna transversa ad angulos anticos ornato: elytris apice latius rufo-maculatis, macula non totum solummodo apicem occupante, interdum etiam breviter marginem lateralem secus adscendente. Genis praecipue ante oculos prorsus nigris a *lusitanico* dignoscitur atque *graeco* Kr. accedere videtur, a quo antennarum articulis dilatatis discrepat: ab *australi* quocum canalicula anteriore frontis transversim recte, non uti in *bipustulato* arcuata, congruit, capitis reliqui forma thoracisque maculis magnis discedit. Quatuor, pariter foeminas, e Turcia olim D. Frivaldszky misit, unam Romae in viciniis lectam, in R. Musei collectione, cypriis adamussim conformes observavi.

Malachius faustus Er. Cypro haud freq.

Malachius cyprius m.: *Aeneo-virescens, nitidus, capite antice, ore antennisque basi subtilius flavis, elytris parum nitidis, apice flavo-maculatis, integris.* — Long. $1\frac{3}{4}$ lin.

Mas antennarum articulo primo incrassato, subquadrato, secundo-quarto triangularibus, paullulum sensim longioribus, quinto-septimo elongatis, angulo apicali interiore producto serratis; fronte inter antennis corniculo armata.

Statura parva, atque parallela, parum nitente *M. labiato* Br. quodammodo facie affinis. nigro-aenens, virescens, capite thoraceque nitidulis, elytris subopacis, pilis longioribus atris, praesertim in mare,

superne sparsis, pube densiore sericante inferne tectus. Caput vertice obsolete longitudinaliter canaliculato, fronte inter oculos, in mare profundius, bifoveolata, ob antennis in eadem approximate insertas eas inter angustata, leviter in corniculum producta, ibidem in foemina latiuscula, subconvexa, longitudinaliter utrinque foveolata; antice usque ad antennarum insertionem (inter eas quoque et oculos in mare), flavum, clypeo inaequali medioque longitudinaliter sinuatim biplicato in mare, in foemina aequali; mandibulis apice palpisque plus minusve infuscatis. Antennae corporis dimidium in mare paulo superantes, illud in foemina vix attingentes, in hac simplices, nigrae, articulo primo maris supra aeneo, infra articulis quatuor primis flavis. Thorax transversim subquadratus, lateribus praesertim in foemina reclinatis, basin versus nonnihil in mare angustatus, transversim modice convexus, ad angulos posticos obsolete reflexus. Elytra in utroque sexu parallela, summo apice tantisper in mare attenuata, leviter in foemina rotundatim ampliata, in hac subnitida, in illo opaca evidentiusque rugulosa, macula apicali flava parva notata. Corpus infra cum pedibus nigro-virescens, epimeris concoloribus, prosterni margine antico, vesiculis abdominisque marginibus anguste rufo-flavescentibus.

Malachius assimilis Er.: *Viridis, vel caeruleus, epistomate, genis antennisque subtus flavis, thoracis macula ad angulos anticos elytrorumque apice rufis.* — Long. $2\frac{1}{3}$ — $2\frac{1}{2}$ lin.

Mas: antennarum articulo primo incrassato, oblongo-quadrato.

Ineditam verisimiliter, atque hoc nomine signatam in R. Musaei collectione Caucasicam speciem, in Syria et Cypro etiam sat obviam, examinavi.

M. sardoo Er. corporis, capitis praesertim, structura valde affinis, eodem paulo major, antennis relative longioribus thoraceque solo margine antico rufo distinctus. Caput ad antennarum insertionem usque utrinque, eas praeter medio late virescens, antice cum ore et genis ad oculorum usque marginem internum pone antennis utrinque flavum, epistomatis et mandibularum apice, labro basi palpisque totis atris. Antennae corporis dimidium in mare superantes, in foemina attingentes, simplices, huic articulis quarto-sexto praesertim validiusculis, primo in mare magno, inferne dilatato, oblongo-subquadrato, secundo subtriangulati, brevi, tertio hoc duplo longiore, obconico, quarto praecedente paulo brevior, eodem reliquis fere longioribus, apicem versus sensim gracilioribus, quarto-sexto inferne obsolete emarginatis atque cum duobus sequentibus apice, sensim minus, dentatis, omnibus inferne flavo-testaceis, ultimis tribus filiformibus fuscis; tribus primis tantummodo in foemina

flavescentibus. Orbitis antennariis in mare magis elevatis, fronte inter eas evidentius utrinque canaliculata, medio sat late deplanata, subrugosa; eadem in foemina inter oculos transversim sulcatula, late inter antennas deplanata, nitidula, subtiliter punctulata. Thorax ejusdem fere ac in *sardoo* structurae, ad angulos tantum anticocos rufo-limbatus; elytris itidem apice rufo-maculatis, in utroque sexu integris. Pedes concolores, coxarum summo apice flavo.

In *sardoo* caput antice flavum, saepius rufum, immaculatum, spatio inter antennas et oculos atque genis ante horum marginem anticum nigro-aeneis; palpi plerumque flavi articulo ultimo atro; antennarum articulus primus in utroque sexu concolor.

Malachius maculiventris Chevrolat. Cypro rarus.

Mal. humeralis Reiche. Unicum e Syria.

Malachius iridicollis Mars.: *Viridis, ore, thoracis margine laterali, elytrisque apice flavis; fronte antice emarginatim truncata.* — Long. $2\frac{1}{4}$ lin.

Cypro et Syria haud frequens.

Mas fronte anterieus late rotundatim sat profunde emarginata, epistomate magno, subrugoso; antennarum articulis quatuor primis modice dilatatis; elytris apice retusis intrusisque, ad angulum interiorem late nigris, biplicatis.

Mal. marginello facie similis eodemque multo minor, virens, capite antice cum genis, ore toto palpisque flavis, his articulo ultimo mandibulisque apice nigris: fronte in utroque sexu ultra antennas brevi, rotundatim in mare emarginata, unde epistoma valde detectum longitudinaliter rugulosum, in foemina lineola transversa, leviter arcuata terminata: antennae longiusculae, corporis dimidium in mare longe, in foemina tantisper superantes, articulis primo, tertio quartoque in illo obconicis (secundo brevi, subtriangulari), inferne parum incrassatis, sequentibus subcylindricis, simplicibus in foemina; nigro-virescentes in utroque sexu atque concolores. Thorax structura *marginello* consimilis, relative attamen paulisper brevior, limbo marginali, pone medium praecipue, angustiore. Elytra quoque breviora, maris apice retusa, latius flavescentia, intrusa, setulis destituta, sed ad angulum interiorem appendice atra, foliacea, biplicata munita; foeminae apice rotundata; in utroque sexu parallela. Corpus infra viridi-caerulescens, prosterno, abdomine longitudinaliter medio, ejus segmentorum marginibus anguste, tibiis anticis apice tarsisque anterioribus rufescentibus.

Speciem hanc nomine: *M. excisus* descripseram, at postinde

ab *iridicollis* Mars. haud vel vix differre mihi compertum: pro sexus distinctione nuper allata valeant.

Anthocomus sanguinolentus Fabr., rarus.

Anth. equestris Fabr., sat frequens Cypro; variat in omnibus antennis, foeminae praesertim, paulisper longioribus, elytris rufo-, saepius flavo-testaceis, macula communi infra medium plus minusve parva, interdum oblitterata, solummodo notatis; pedibus e contra obscurioribus, tibiis mediis apice parum, femoribus auticis tibiisque iisdem dimidio apicali cum tarsis testaceis.

Anth. fasciatus Lin., rarus.

Anthocomus crassicornis m.: *Niger, subnitidus, fulvo-pubescent, elytris rufis, basi late sinuatim fasciaque transversa postica undulata nigris.* — Long $1\frac{1}{2}$ lin.

Mas antennarum articulis tertio-sexto leviter incrassatis, serratis, septimo magno, pariter ac duo sequentes subcylindrico, crassiusculo, superne ante apicem foveolato.

Anth. equestris statura, niger vel nigro-aeneus, fronte subdepressa lateque foveolata, epistomate labroque apice plus minusve obscure rufescentibus; antennae nigrae, maris articulis primo apice, secundo tertioque penitus, quarto basi infra flavescentibus, primo obconico, apice rotundato, secundo minore, obovato, tertio-sexto triangularibus, serratis, tertio quartoque crassioribus, septimo magno, subcylindrico, octavo-nono eo sensim minoribus, cylindricis, tribus hisce subcompressis, superne foveola excavatis, penultimo ultimoque filiformibus, hoc illo duplo longiore: foeminae in unica deficient. Thorax veluti in *equestri* constructus, paullulum longior. Elytra paulisper relative angustiora, maris parallela, foeminae apicem versus paullulum ampliata, rufa, basi omnino atque sinuatim, fascia pone medium lata, undulata nigra, apice rufa conjunctimque, in utroque sexu rotundata; pube brevi tenuique fulva obsita. Corpus infra nigro-subaeneum, griseo-villosum, mesosterni epimeris flavis, tibiis apice tarsisque piceis. Abdominis in mare segmentum dorsale ultimum apicem versus parum attenuatum, apice late rotundato-subtruncatum, foeminae apicem versus angustatum apiceque rotundatum.

Duo specimina e Syria.

Mas elytris apice integris, foemina thorace longiore, lateribus magis rectis a *fasciato* praeter picturam distinguitur.

Ebaeus flavobullatus Mars. Cypro et Beryto frequens, verisimiliter in tota Syria.

Hypebaeus scitulus Er. Cypro sat frequens.

Hypebaeus? cyanipennis m.: Nigro-cyaneus, ore, antennis basi, pedibus pro parte thoraceque transversim subelliptico-rufo-testaceis, elytris subglobosis, cyaneis, subtiliter sat profunde crebreque punctatis. — Long. $\frac{4}{5}$ lin. Syria.

Quodam cum dubio unicum foemineum specimen *Hypebaeo* referam, cui palporum maxillarium articulo ultimo attenuato-subtruncato, thoracis margine ad angulos posticos haud reflexo, corpore alato accedit, *H. flavicollis* potius quam *Ebaei* minoribus speciebus structura affinis, elytris veluti in *Charopo* postice ampliatis, valde convexis. Caput nigro-cyaneum, ore obscure rufescente, palporum articulo ultimo fusco: antennae moniliformes, fuscae, articulis quinque primis rufescentibus. Thorax transversim subellipticus, forma fere uti in *flavicollis*, evidenter vero brevior, basi cum angulis posticis aequalius rotundatus tenuissimeque marginatus, subtilissime punctulatus, flavo-rufescens, nitidus. Elytra basi thoracis prope latitudine, humeris leviter prominulis, a basi ipsa apicem versus sensim sat ampliata dorsoque convexa, subtiliter, sat crebre modiceque profunde punctata, laete nigro-cyanea. Pedes fusci, quatuor anteriorum genibus tibiisque rufo-testaceis; abdomen apice nigrum. Corporis pubescentia, specimine fortasse delrito, vix perspicua.

A *scitulo* et *flavicollis* elytris convexioribus minus dense et minus subtiliter punctatis prae caeteris discedit, quemadmodum elytrorum quoque minus subtili punctura ab *affini* Lucas distinctus videtur.

Hyp. (Anthonomus) vesiculiger Mars. Ex descriptione vix est quod de specie dubitem; descripto mare foemina paulo plerumque major, antennis aliquantulum gracilioribus, pedibus cum coxis anterioribus rufo-testaceis, posticorum femoribus basi tarsisque omnibus apice infuscatis; elytris apicem versus leniter ampliatis, intensius cyaneis, angulo apicali late rufo (in *tripartiti* foemina ea late flavo-marginata Auctor tradit). Illatione, ni fallor, speciem *Anthocomo* referendam a plaecleari Auctoris sententia dissentire liceat, corporis enimvero totius affinitatibus. palporum maxillarium articulo ultimo in mare latiusculo, subcompresso, apice truncato, foeminae haud acuminato, elytris in illo apice haud intrusis, callo apicali appendiceque parum dissimiliter ac in *flavicollis*, *scitulo* et *mylabrino* conformatis, thorace demum *flavicollis* forma consono *Hypebaeo* generi tribuendam potius dicerem. Mas segmento dorsali ultimo flavo, apice bifido.

Variat fronte anterieus plus minusve rufescente. Cypro et Beryto haud raris.

Hypebaeus mylabrinus m.: Niger, vel nigro-virescens, pube subtili indutus, antennis basi pedibusque rufo-testaceis, elytris subtilissime punctatis, nigris, fascia undulata transversa apiceque flavis. — Long. 1 lin. Cypro et Beryto sat frequens.

Mas subparallelus, antennis validiusculis, articulo primo nigro; palpis maxillaribus articulo apicali oblongo-ovato, subcompresso, apice truncato; elytris macula apicali pallida, oblongo-ovata ad trientem usque in singulo adscendente ornatis, ante apicem attenuatis, apice intra callum appendiculatis, appendice cochleariformi, reflexa; coxis femoribusque basi plus minusve infuscat.

Foemina antennis dilutioribus; palpis maxillaribus articulo ultimo subovali, haud compresso, subtruncato; elytris apicem versus sensim modice ampliatis, angulo apicali in singulo rotundato, flavo; femoribus posticis basi leviter, anterioribus vix infuscat. *H. flavicollis* statura eique structura summa affinitate proximus, subtilissime flavo-pubescens, niger, capite thoraceque leviter virescentibus, illo fronte deplanato, hoc disco subaequali leviterque convexo, nitidis, vix perspicue punctulatis. Os cum palpis fuscum. Thorax latitudine parum brevior, lateribus ante medium fortiter, apice minus rotundatus, basi media subrecte truncatus, utrinque cum angulis posticis in mare minus, in foemina latius rotundatus, basi lateribusque marginatus, margine elevatulo, ante scutellum plus minusve foveolatus. Elytra basi thorace paulisper latiora, humeris prominulis, suturam secus dorso longitudinaliter, evidentius in mare, subimpressa, subtiliter, sat dense, aequae fere ac in *flavicollis* punctata, nigra, fascia lata communi ante medium, anteriore oblique, postice subrecte undulata, ad suturam interdum etiam interrupta, flava ornata, apice, uti dictum, plus minusve pallido-vel flavo-maculata. Corpus infra nigrum, pedibus testaceis, tarsis anticis in utroque sexu simplicibus, quinque-articulatis.

Charopus formicarius Reiche. Una e Syria foemina thoracis elytrorumque singulari forma insignis, capitis palporumque maxillarium structura, his articulo ultimo acuminato ad hoc reapse genus propius conferre videtur; prosternum ei quam in affinis magis explicatum.

Homoeodipnis obsoletus Er. Cypro frequens: variat capite thoraceque rufo-testaceis, illo vertice infuscat.

Troglops marginatus Walfl. Quaedam specimina Cypro.

Colotes (*Antidipnis* Mars.) *palpator* Mars. Tria specimina Cypro, ex quibus foemina, capite, thorace, antennis, apice excepto pedibusque rufo-testaceis, uti ab auctore species designata:

normalis porro in utroque sexu pictura videtur capitis vertice, thoracis vitta longitudinali lata antennarumque dimidio apicali nigris; femoribus medio, tibiis posticis basi tarsisque posterioribus apice fuscis. Mas palporum maxillarium articulo ultimo maximo, trigono fusco-que maculato insignis, at penultimo brevi, inferne retrorsum fortiter dilatato, dilatationis apice rotundato: foemina antennis paululum brevioribus, palporum maxillarium articulo ultimo compresso, obovato, apicem versus leviter dilatato apiceque late truncato; elytris nigris, margine laterali tenui, apicali latiore, longe tamen brevius quam in mare, rufo-testaceis; abdominis segmento ultimo dorsali et ventrali oblongo-attenuatis, apice truncatis, flavis; tarsis anticis quinque-articulatis; iisdem in mare quadriarticulatis, articulis tribus primis longitudine sensim descrescentibus.

Colotes flavocinctus Mars. Cypro et Syria vulgaris videtur, plurimis, quae observavi, ab auctoris descriptione dilutiore pictura variat: flavo-testaceus, nempe, capite usque ad oculorum medium in mare. antennis usque in foemina atro, antennis vix apice infuscatis, thorace laete rufo-testaceo, litura lata media, distincta, atra; elytris macula magna basali communi, subtriangulari, aliaque pone medium subtransversa vel obovali majore minoreve in singulo ornatis, sutura, saltem anguste, margine laterali apiceque late maculam posticam circa in omnibus flavis. Corpus infra nigrum, thorace subtus, mesosterno pedibusque cum coxis anticis rufo-testaceis, femoribus posticis varius leviter infuscatis.

Colotes anthicinus m.: Flavo-pubescent, niger. ore, antennarum basi, pedibus pro parte elytrorumque fascia media flavo-testaceis; elytris subtiliter, minus dense punctatis. — Long. $\frac{2}{3}$ lin. Cypro et Beryto haud rarus.

Mas capite utrinque sub antennis ante oculos valde excavato, oculis, inferne praesertim, fortiter prominulis, fronte anterieus angustata, subquadrata, convexiuscula, cum epistomate oreque toto flava; palporum maxillarium articulo secundo conico (tarsorum anticorum articuli primi longitudine), tertio magno, sphaerico, quarto ejusdem margini basali anteriori inserto, aeque magno, at sesqui longiore, basi crassulo recteque truncato, ab inde compresso, inferne plano, leviter supra excavato, apicem versus tenuiter attenuato, apice late rotundato: foemina capite ab oculis apicem versus sensim attenuato, atro, epistomate labroque fusco-testaceis; palporum maxillarium articulo ultimo elongato, subcompresso, apicem versus hand dilatato apiceque subtruncato, fusco. *C. maculato* minor, ei forma parum dissimilis; corpore in utroque sexu paulisper minus ampliato,

tamen haud recte parallelo, thoracis margine antico leviter producto, elytris longe subtilius minusque profunde punctatis, callo marginali tenuiore, palporum maxillarium structura praeter picturam distinctus. Caput uti in illo fere constructum, angustius in mare ultra oculos flavum, profundius utrinque ante eos excavatum, oculis inferne super genas angulatim prominulis; antennae articulo primo elongato, evidentius in mare subelaviformi, sequentibus tribus (quam in *maculato* relative brevioribus) conjunctim longitudine subaequali, eis pariter flavo-testaceo, reliquis fuscis. Thorax, uti caput, omnium subtilissime alutaceus, haud perspicue punctatus, transversim fere ellipticus, lateribus fortiter et late cum basi rotundatus, apice leviter utrinque, oblique medio, producto-subrotundatus, modice transversim convexus, lateribus posticeque tenuissime marginatus, concolor. Elytra humeris leviter prominulis, apicem versus tantisper ampliata, margine laterali tenuiter breviterque costulata, dorso longitudinaliter parum convexa, apice singulo late rotundato; subtiliter parum profunde et minus crebre, fere uti in *Antidipno galbula* punctata, punctis basi apiceque obsoletis, parum dense fulvo-pubescentia, nigra, fascia communi transversa in eorundem quadrante ante medium flava, integra, quandoque ad suturam interdum interrupta atque in triangulum transversum ab ea in singulo elytro recedente ornata. Corpus infra nigrum, coxis anterioribus pedibusque rufo- vel flavo-testaceis, femoribus anterioribus parum, posticis magis infuscatis: abdominis segmentis anguste testaceo-marginatis, dorsali ultimo in mare longiusculo, subparallelo, apice rotundatim truncato, in foemina brevior, apice medio leviter exciso.

A praecedente thoracis praecipue forma elytrisque subtilius et minus profunde punctatis praeter picturam nec non capitis in mare structuram distinctus.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1871

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Selve Flaminio Baudi a

Artikel/Article: [Coleopterorum messis in insula Cypro et Asia minore ab Eugenio Truqui congregatae recensitio: de Europaeis notis quibusdam additis. 49-71](#)