Eine neue deutsche Criocerinen-Art

beschrieben von

Dr. G. Kraatz.

Zengophora rufo-testacea.

Oblonga, convexa, nitida, tenuiter pubescens, antennis, capite, thorace, elytris pedibusque rufo-testaceis, pectore abdomineque nigris seu piceo-nigris, thorace supra crebre minus fortiter punctato, tuberculo laterali magno, obtuso, angulis anticis subproductis, fere acutis, elytris minus crebre punctatis. — Long. $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{2}{3}$ lin.

Mit Ausnahme von Brust und Hinterleib ganz röthlich gelbbraun, daher sehr leicht von den bisher bekannten Arten zu unterscheiden, durch den Bau des Halsschildes der *subspinosa* zunächst stehend, der seitliche Höcker noch stärker, die Vorderecken weniger herabgebogen, scharf rechtwinklig vortretend, die Oberseite weniger grob und dichter als bei den übrigen Arten punktiert, so dass eine glatte Mittellinie nur theilweise deutlich hervortritt (namentlich beim ♂, dessen Punktirung überhaupt dichter ist). Die Behaarung auf den ebenfalls etwas dichter punktierten Flügeldecken ist etwas kräftiger als bei *subspinosa*; die Flügeldecken sind deutlich länger als bei dieser Art, der ganze Käfer ist schlanker. Fühler und Beine sind einfarbig röthlich gelb. Die schwarze Unterseite zeigt bisweilen einen Stich ins Pechbraune.

Die angegebenen Merkmale lassen in dem Käfer unzweifelhaft eine neue Art, nicht etwa unausgefärbte Exemplare von einer der 4 bisher aufgestellten deutschen Arten erkennen.

H. Rittergutsbesitzer Kramer fand die *Z. rufo-testacea* im Walde von Ludwigsdorf (bei Gilgenburg in Ostpreußen) Anfangs Mai 1870 unter trockenem Laube auf einem kleinen Terrain von etwa 20 Quadratfuss; bei mehrtägigem fleißigen Sammeln wurden im Ganzen 14 Stück erbeutet, von denen ich einige zur Beschreibung in unserer Zeitschrift erhielt.

Die Mittheilung von deutschen Stücken der:

Zeng. frontalis Suffr. (Stett. Ent. Ztg. 1840. S. 101) würde mir angenehm sein, um entscheiden zu können, ob der Käfer eigene Art oder Var. der *scutellaris* ist, bei welcher die Stirn bis zur Ausrandung der Augen und der ganze Oberkopf schwarz sind. Nach Thomson ist in Schweden bis jetzt nur *frontalis* aufgefunden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1871

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Kraatz Gustav

Artikel/Article: [Eine neue deutsche Criocerinen-Art 162](#)