

*Luperus nigripes* p. 152. 32.

Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. 1861. p. 392. not. ♂. — Joannis Mon. Ab. p. 152. 32. — Marseul eod. p. 161.

*Luperus geniculatus* Joannis eod. p. 151. 31.

Marseul vermuthet a. a. O. eine bei Mittheilung meiner Exemplare des *Lup. nigripes* an Joannis vorgekommene Verwechslung, indess mit Unrecht. *Luperus nigripes* variirt eben ein wenig in der Färbung der Beine, und während die von mir zuerst gefangenen und meiner Beschreibung zu Grunde gelegten Exemplare sie ganz schwarz zeigen, haben andere deutlich hellgefärbte Kniee. *Luperus geniculatus* ist, wie schon aus der Beschreibung folgt, übrigens aber auch durch das von mir verglichene Original-Exemplar nachgewiesen wird, mit *L. nigripes* identisch.

## Zwei neue *Aphyctus*-Arten

von

*H. v. Kiesenwetter.*

Von der Dasytiden-Gattung *Aphyctus* war bisher eine einzige Art, der *megacephalus* (*Amauronia megacephala* Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. 1859. p. 182) bekannt. Neuerdings sind mir durch die Sammlungen Raymond's in der Türkei und in Griechenland zwei weitere Species bekannt geworden, deren Beschreibungen ich hiermit als eine recht interessante Bereicherung der europäischen Fauna veröffentliche:

*Aphyctus saginatus*: *Brevinsculus, cylindricus, nigro-aeneus, subnitidus, punctatissimus, pube grisea sericans, antennis apicem versus incrassatis et infuscatis pedibusque testaceis, femoribus basin versus nigricantibus.* — Long.  $1\frac{3}{4}$  — 2 Mill.

Dem *A. megacephalus* sehr ähnlich, aber verschieden durch kürzere Gestalt, verhältnißmässig breiteren Kopf, kürzere Fühler, deren Glieder mit Ausnahme der ersten eben so dick als lang, oder doch nur unmerklich länger, die vorletzten aber breiter als lang sind. Dieselben bilden eine merklich verdickte Keule und das letzte Glied ist deutlich grösser und dicker als die vorhergehenden. Die

Fühler sind an der Basis röthlich-gelb, nach der Spitze hin allmählig dunkler. pechbraun oder schwärzlich. Das Halsschild ist kürzer als bei *A. megacephalus*, etwas stärker und einzelner punktirt. Die Flügeldecken sind etwa  $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$  mal so lang als zusammen breit, mit greisschimmernden anliegenden Härchen und dazwischen einzelnen kurzen und ziemlich dünnen abstehenden Börstchen, die weniger bemerkbar sind als bei *A. megacephalus*. Die Schenkel und bisweilen ein Theil der Schienen sind in gröfserer oder geringerer Ausdehnung angedunkelt, die Beine im Uebrigen röthlich-, oder trübgelb.

Um Salonik von Raymond gesammelt.

*Aphycus Muelleri*: *Breviusculus*, *convexusculus*. *nigroaeneus*, *pube brevi*, *grisea adpressa cinereus*, *ore*, *antennis piceis*, *basi pedibusque ex parte testaceis*. — Long. 2 Mill.

Kopf breit, dicht punktirt, die Stirn leicht gewölbt. Oberlippe mit dem Munde gelb, Taster braun. Fühler heller oder dunkler pechbraun, mit röthlicher Wurzel, so lang als Kopf und Halsschild, nach der Spitze hin kaum verdickt, 1stes Glied mäfsig lang, etwas verdickt, 2tes rundlich, 3tes länger als dick, verkehrt-kegelförmig, 4tes länger als das 3te, so lang als das 5te, die folgenden klein, perlschnurförmig, sämmtlich etwa so lang als dick, 7tes und 9tes ein wenig gröfser als das 6te und 8te Glied. Halsschild viereckig, nach vorn und nach hinten ein wenig verengt, vor der Spitze unendlich eingeschnürt, die Seiten in der Mitte etwas erweitert. Die Oberfläche der Quere nach gewölbt, etwas uneben. Schildchen quer-viereckig. Flügeldecken wenig breiter als das Halsschild, flach gewölbt, mit parallelen Seiten.  $2\frac{1}{2}$  mal so lang als zusammen breit, ziemlich dicht punktirt, schwach gerunzelt. Die ganze Oberseite des Käfers erscheint bleigrau, durch eine gleichmäfsige anliegende zwar kurze, aber ziemlich starke Behaarung, zwischen welcher sich abstehende Börstchen nicht bemerken lassen. Die Unterseite ist sparsamer und feiner behaart, die Beine sind röthlich-gelb, die Oberseite der Vorderschenkel zeigt einen schwärzlichen Strich, die heiden hintern Schenkelpaare sind mehr oder weniger angedunkelt.

Aus Griechenland von Cl. Müller mitgetheilt

# ZOBODAT - **www.zobodat.at**

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift](#)  
([Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung](#))

Jahr/Year: 1873

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Kiesenwetter Ernst August Helmuth  
[Hellmuth] von

Artikel/Article: [Zwei neue Aphyctus-Arten 31-32](#)

