

[Berliner entomologische Zeitschrift 1873.]

## Diptera nova,

in Pannoniâ inferiori et in confinibus Daciae regionibus  
a *Ferd. Kowarzio* capta.

Descriptis *H. Loew*.

### 1. *Culex leucacanthus* nov. sp. ♂.

Nigricans, thoracis dorso orichalceo-tomentoso, pleuris, segmentorumque abdominalium singulorum fasciâ basali candido-tomentosis. Pedes nigri; femora adversus apicem albida; genua, extremus tibiarum apex, ultimus tarsorum articulus articulorumque reliquorum basis et apex candida. tarsorum tamen anticorum articuli paenultimus totus et antepaenultimus praeter imam basim nigri; tibiarum setulae omnes candidae. — Long. corp.  $1\frac{3}{4}$  lin., long. al.  $1\frac{1}{2}$  lin.

### 2. *Tipula pannonia* nov. sp. ♂ et ♀.

Ex *Tip. ochraceae* Meig. affinibus, luteo-testacea, fronte, thoracis dorso plenisque cinerascentibus, vittâ mediâ thoracis didymâ dilute subfuscâ, lateralibus subnullis, abdomine fusco-trivittato; antennae nigro-fuscae. scapo et imâ flagelli basi luteis.

♂. abdominis vittae angustae, intermedia in segmentis primis plerumque obsoleta; alae colore fusco-cinereo modice tintae, stigmate fusco, lunulâ albâ in imam usque cellulae posterioris quartae basim perlinente; hypopygium fuscum, apice lamellae inferae pilorum fulvorum fasciculum gerente.

♀. abdominis vittae laterales dilatatae, intermedia adversus abdominis basim interdum subobsoleta; alae colore luteo-cinereo saturati tintae, stigmate fusco, lunulâ albâ usque in cellulae posterioris quartae basim ductâ et hinc in cellulae posterioris quintae basim dilatata; terebra rufo-picea, lamellis superis rectis et acutis.

Long. corp. ♂  $6\frac{1}{2}$ , ♀  $7\frac{1}{2}$  lin., long. al. ♂  $9-9\frac{1}{4}$ , ♀  $10\frac{1}{4}-10\frac{1}{2}$  lin.

3. *Tipula truncata* nov. sp. ♂ et ♀.

Ex *Tip. ochraceae* Meig. affinibus, lutea, fronte thoracisque dorso leviter in cinereum vergentibus, vittis hujus dilute subfuscis, lateralibus angustis, intermediâ didymâ, interjectâ lineâ subfuscâ, abdomine fusco-trivittato; antennae luteae, articulis singulis flagelli inde a secundo in imâ basi nigris; alae colore luteo-cinereo modice tinctae, stigmate fuscum, lunulâ albidiâ usque in basim cellulae posterioris quartae pertinente.

♂. vittae abdominis adversus basim plerumque obsoletae; lunula albida alarum in imâ cellulæ posterioris quartæ basi deliquescentes; hypopygium ingens. fuscum, lamellâ inferâ permagnâ, latissimâ, truncatâ, apophysibus duabus permagnis apicem versus compressis et conniventibus instructâ.

♀. vittae abdominis laterales saepe, intermedia fere semper obsoletae: alarum lunula albida trientem basalem cellulæ posterioris quartæ explens; duo ultima abdominis segmenta fuscâ; terebra lutea, eximie abbreviata, lamellis superis acutis, adversus basim subhorizontaliter dilatatis, lamellis inferis obtusiusculis.

Long. corp. ♂  $6\frac{1}{3}$ —7, ♀  $7\frac{1}{3}$ — $7\frac{2}{3}$  lin., long. al. ♂  $8\frac{1}{2}$ — $9\frac{1}{4}$ , ♀  $9\frac{1}{3}$ — $9\frac{1}{2}$  lin.

4. *Tipula bispina* nov. sp. ♂.

*Tipulae truncatae* mire similis, vix nisi hypopygio minus crasso, apophysibus lamellæ inferæ brevioribus, adversus apicem non compressis et in apice ipso setas binas validissimas gerentibus, alarum denique lunulâ albidiâ paulo breviore distincta. — Long. corp.  $6\frac{1}{3}$  lin., long. al.  $8\frac{1}{2}$  lin.

5. *Tipula helvola* nov. sp. ♂ et ♀.

Ex *Tip. ochraceae* Meig. affinibus, corporis figurâ et magnitudine *Tip. humili* Staeg. propinquâ; dilute luteola, antennis concoloribus, imâ tamen basi articulorum singulorum flagelli omnium atrâ, thoracis dorso non vittato, abdominis vittâ subfuscâ vel adversus basim. vel totâ obsoletâ; alae subhyalinae, colore dilute fusco-cinereo leviter tinctae, stigmate subfusco, lunulâ albidiâ modice conspicuâ.

♂. lunula exalbida alarum usque ad cellulæ discoidalis marginem posticum pertinens; hypopygium mediocre, non incrassatum, luteum, lamellis adversus basim plerumque fuscis, inferâ subelongatâ, apice truncato exalbido et pilorum fulvescentium fasciculum gerente.

♀. lunula exalbida alarum usque in cellulæ posterioris quartæ basim ducta; terebra luteola, breviusecula sed non abbreviata, lamellis superis rectis acutiusculis.

Long. corp. ♂  $4 - 5\frac{1}{3}$ , ♀  $5 - 5\frac{1}{4}$  lin., long. al.  $5\frac{2}{3} - 6\frac{1}{2}$  lin.

6. *Limnobia decemmaculata* nov. sp. ♂ et ♀.

Fusca, nuper tamen exclusa rufescens; alae colore dilute vel dilutissime subfuscō aequaliter tinctae et maculis quinque rotundatis fusco-nigris ornatae, quarum tres costales in venae auxiliaris venarumque longitudinalium primæ et secundæ apice, reliquæ duæ subcostales in venarum longitudinalium secundæ et tertiae basi locum habent; praeterea venulae transversales colore fusco-nigro limbatae; venae alarum similiter atque *Limnobiae xanthopterae* Meig. ductæ et combinatae. — Long. corp.  $2\frac{3}{4} - 3$  lin., long. al.  $3\frac{1}{2} - 4\frac{1}{6}$  lin.

7. *Rhypolophus pentagonalis* nov. sp. ♂ et ♀.

Fuscus, thorace non vittato, in immaturis rufescente; alae colore subfuscō dilute tinctæ. stigmate saturatius fusco, cellulā marginali primā usque ad submarginalis primæ basim pertinente. cellulæ discoidalis basi non cuneatā sed truncatā, cellulā basali secundā quam prima satis breviore, venā longitudinali ultimā non elongatā. — Long. corp. ♂  $2 - 2\frac{1}{6}$ , ♀  $2\frac{5}{12} - 2\frac{7}{12}$  lin., long. al.  $2\frac{3}{4} - 3\frac{1}{4}$  lin.

8. *Cladura fuscula* nov. sp. ♂ et ♀.

Alae adversus apicem et prope marginem posticum pilosæ; cellula posterior secunda perbrevis. — Long. corp. ♂  $1\frac{2}{3}$ , ♀  $2\frac{1}{4}$  lin., long. al.  $2\frac{7}{12} - 2\frac{3}{4}$  lin.

9. *Dynatosoma nobilis* nov. sp. ♂ et ♀.

Exemplis *Dynatosomae fuscicornis* Meig. dilutius pictis similima, sed major, picturā venisque alarum nigroribus, pedunculo cellulæ posterioris quartæ breviore, hypopygio maris minus tumido et terebrā foeminae modice longiore. — Long. corp. ♂  $2\frac{3}{4}$ , ♀  $3\frac{1}{4}$  lin., long. al. ♂  $2\frac{3}{4}$ , ♀  $3\frac{1}{12}$  lin.

10. *Sciophila pallens* nov. sp. ♀.

Dilute lutea, pleuris totis concoloribus, antennis praeter basim, capite superne, thoracis vittis tribus segmentorumque abdominalium singulorum dimidio priore, segmenti tamen primi dilutius fuscis; tibiae anticae metatarsis modice sed distincte breviores; basis cellulæ posterioris quartæ pone primæ basim sita; cellula submarginalis interior majuscula, venā obliquā ab exteriore distincta, colore obscuriore nullo tincta. — Long. corp.  $2\frac{2}{3}$  lin., long. al.  $2\frac{1}{2}$  lin.

11. *Sciophila nigriceps* nov. sp. ♀.

Lutea, antennis praeter basim. capite toto, palpis, thoracis vittis integris, pleurarum maculis magnis, metanoli dimidio inferiore abdomeque nigris, hujus tamen segmentis secundo, tertio et quarto singulis fasciâ basali subinterrupta luteâ ornatis; tibiae anticae quam metatarsi longiores; basis cellulae posterioris quartae ante primae basim sita. — Long. corp.  $2\frac{1}{2}$  lin., long. al.  $2\frac{3}{4}$  lin.

12. *Bibio macer* nov. sp. ♂.

Corporis formâ pedumque posticorum fabricâ *Bib. clavipedi* Fabr. similis, similior *Bib. lerido* Lw.; ater, nitidus, pedum posteriorum tibiis praeter apicem et metatarsis adversus apicem rufis; tibiae posticæ calcaribus curvis et acutis instructæ; alae nigro-cinereæ adversus apicale costæ dimidium nigricantes, stigmate oblongo nigro, venis validis, anticis nigris, posticis fuscis, auxiliari et longitudinalium ultimâ dilutioribus; pili totius corporis nigri. — Long. corp.  $2\frac{1}{4} - 2\frac{1}{3}$  lin., long. al.  $2\frac{1}{4} - 2\frac{1}{3}$  lin.

13. *Odontomyia periscelis* nov. sp. ♀.

Cellulam submarginalem unicam gerens, corporis magnitudine et figurâ *Odontomyiae flavissimæ* Ross. proxima, sed similiter atque *Odontomyia felina* Pnz. picta, a quâ corpore majore, antennis proportione longioribus, maculis lateralibus abdominis non aequalibus, sed adversus marginem abdominis latioribus, tibiis denique flavis annulo medio nigro ornatis aperle differt. — Long. corp.  $4\frac{1}{2}$  lin., long. al.  $4\frac{5}{8} - 4\frac{1}{2}$  lin.

14. *Carysopila maerens* nov. sp. ♀.

*Chrosopilae auratue* Fbr. proxima, sed paulo minor et alis limpidioribus stigmateque longiore instructis diversa; abdomen maris praeter basim nigro-pilosum; in feminae abdome segmentum primum toluum segmentorumque secundi tertii et quarti singulorum fascia basalis latissime interrupta tomento dilutissime flavicante, fere exalbido teguntur. — Long. corp. ♂  $2\frac{1}{2} - 3$ , ♀  $3\frac{1}{3} - 3\frac{1}{2}$  lin., long. al.  $3 - 3\frac{1}{2}$ , ♀  $3\frac{1}{6} - 3\frac{1}{3}$  lin.

15. *Xylota rusipes* nov. sp. ♂ et ♀.

Inter *Xylotas femoratum* L. et *curvipedem* Lw. intermedia, ab illâ stigmate alarum nigro, femoribus posticis paulo crassioribus eorumque apice latius nigro, ab hac pedibus brevius pilosis, posticorum femoribus minus crassis tibiisque minus incurvis distincta. — Long. corp.  $4\frac{5}{6} - 6$  lin., long. al.  $4\frac{1}{2} - 5\frac{5}{6}$  lin.

16. *Brachypalpus eunotus* nov. sp. ♀.

Niger, facie totà, antennis pedibusque concoloribus; caput et thoracis dorsum polline albido-cinereo opaca, vittis tamen ordinariis hujus nigris et distinctissimis; abdomen fasciis tribus anguste interrumpitis glauco-cinereis ornatum, ultimâ plerumque polline detrito nitidâ. — Long. corp.  $4\frac{1}{2}$  lin., long. al.  $4\frac{1}{2}$  lin.

17. *Ceria tridens* nov. sp. ♀.

*Ceriae euprosopae* Lw. simillima; vitta atra faciei superne tridentata, maculam flavam nullam includens; scutellum praeter fasciam basalem angustam et femora postica praeter basim et apicem nigra. — Long. corp. 5 lin., long. al.  $4\frac{2}{3}$  lin.

18. *Empis procera* nov. sp. ♂ et ♀.

Nigra, antennis palpisque concoloribus, capite thoraceque polline exalbido cinereis et opacis, vittarum dorsaliom interstitiis infuscum vergentibus; labrum pedum anticorum tibiis et metatarso simul sumtis longius, labella longissima linearia; halteres pallidi; pili in mento et pleuris, in abdominis lateribus et in ventre pallidissimi, reliqui corporis pili nigri.

♂. tibiae praeter basim fuscae, tarsi toti fusco-nigri; femora intermedia infra pilis longis et validis nigris, adversus basim conformatioribus instructa; alae subfuscæ; hypopygium parvum, nigrum, lamellis lateralibus brevibus et simplicibus; segmentum ventrale ultimum dilatatum et filamentum longum, lauelliis unguiformibus suffultum emittens.

♀. tibiarum apex et tarsi fusi, femora posteriora infra breviter pennato-ciliata; alae nigro-fuscae; lamellæ anales lineares.

Long. corp.  $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{7}{12}$  lin., long. al.  $2\frac{3}{4}$ — $2\frac{5}{6}$  lin.

19. *Empis alampra* nov. sp. ♂.

Tota nigra, thorace cinereo-pollinoso, abdomine superne atro et opaco, pilis setisque totius corporis nigris, halteribus pallidis; proboscis elongata labellis linearibus mire longis instructa; alae nigro-cinereae, basi lutescente, venis omnibus perfectis; pedes longi, intermediorum femoribus infra tibiisque utrinque setas longas confertas, anticorum posticorumque tibiis superne minus confertas gerentibus, metarsis non incrassatis; hypopygium parvum, lamellis lateralibus brevissimis obtusis, filamento centrali brevi et crassisimo. — Long. corp.  $2\frac{1}{3}$ — $2\frac{5}{12}$  lin., long. al.  $2\frac{2}{3}$  lin.

**20. *Empis nitidiventris* nov. sp. ♀.**

Tota nigra, thorace cinereo-pollinoso, abdomine atro et nitido, pilorum fasciculo ante halteres, pilis abdominalis et plerisque coxarum pallidis, reliquis pilis setisque omnibus nigris, halteribus pallidis; proboscis elongata labellis linearibus mire elongatis instructa; alae subhyalinae, cinerascentes, basi lutescente, venis omnibus perfectis et stigmate fusco-nigris, illis tamen in basi alarum dilute lutescens; pedes longiusculi, femoribus posterioribus utrinque squamato-pennatis, tibiis anticus superne subsquamato-ciliatis, intermediis posticisque superne totis squamato-pennatis, illis infra in imâ basi, his praeter basim et apice in squamato-pennatis. — Long. corp.  $2\frac{7}{12}$  —  $2\frac{2}{3}$  lin., long. al.  $2\frac{3}{12}$  lin.

**21. *Empis tanysphyra* nov. sp. ♂.**

Tota nigra, polline albido - cinereo aspersa, in thorace modice confertiore quam in abdomine, ita ut ille opacus, hoc vero subopacum sit; pili totius corporis nigri; halteres pallidi; proboscis medio-cris, labro quam tibiae anticae vix longiore, labellis linearibus modice longis; setae scutelli duae; alae hyalinae, leviter cinerascentes, stigmate nigro-cinereo, venis omnibus perfectis, costali longitudinalemque tribus primis nigro-fuscis, reliquis dilutius fuscis vel ex luteo fuscis; pedes longi et tenues, intermediorum femoribus infra setas paucas, tibiis superne tres gerentibus, metatarsis omnibus non incrassatis; lamellae laterales hypopygii breves et obtusae, filamentum centrale longiusculum, recurvum. — Long. corp.  $1\frac{3}{4}$  lin., long. al.  $1\frac{4}{6}$  lin.

**22. *Empis plebeja* nov. sp. ♂ et ♀.**

Tota nigra, thorace cinereo - pollinoso; pili totius corporis nigri; halteres pallidi; proboscis medio-cris, labro quam tibiae anticae vix longiore, labellis linearibus modice longis; setae scutelli quatuor; alae nigro-cinereae, basi obsolete et sordide lutescente, venis omnibus perfectis et stigmate nigro-fuscis.

♂. pedes longi et tenues, intermediorum femoribus infra setas paucas, tibiis superne setas quatuor gerentibus, metatarsis omnibus non incrassatis; lamellae laterales hypopygii breves et obtusae, filamentum centrale longiusculum et recurvum.

♀. alae subdilatatae; femora posteriora utrinque squamato-pennata, tibiae intermediae superne subsquamato-ciliatae, tibiae posteriores superne aequaliter subsquamato-pennatae, infra adversus basim subsquamato-ciliatae.

Long. corp. ♂  $1\frac{2}{3}$ , ♀  $1\frac{3}{4}$  lin., long. al. ♂  $1\frac{11}{12}$ , ♀ 2 lin.

23. *Empis melanotricha* nov. sp. ♂ et ♀.

Tota nigra, thorace leviter cinereo-pollinoso, abdomine subopaco, apicem versus magis nitente; pili totius corporis nigri; halteres pallidi; proboscis medioeris, labro quam tibiae anticae vix longiore, labellis linearibus modice longis; setae scutelli quatuor; venae alarum omnes perfectae.

♂. alae cinereae, venis auxiliari, longitudinalium tribus primis praeter basim sordide sublutescentem et stigmate fusco-nigris, venis reliquis modice dilutioribus; pedes longi et tenues, intermediorum femoribus infra setas minus raras, tibiis superne setas quatuor gerentibus, metatarsis omnibus non incrassalis; lamellae laterales hypopygii breves et obtusac, filamentum centrale longiusculum et recurvum.

♀. alae quam maris latiores, nigro-cinereae, venis et stigmate fusco-nigris, illis in imâ alarum basi paulo dilutioribus; femora posteriore superne tota, infra praeter basim breviter subsquamato-ciliata.

Long. corp. ♂  $1\frac{2}{3}$ , ♀  $1\frac{3}{4}$  lin., long. al.  $1\frac{1}{2}$ —2 lin.

24. *Empis filata* nov. sp. ♂ et ♀.

Ex *Emp. chiopterae* Mg. affinibus; tota nigra, capite, thorace abdomineque polline exalbido subopacis et cinereis; caput fere totum nigro-pilosum; thoracis dorsum pilis nigris rarioribus, sed longis instructum; pilorum fasciculus, qui ante halteres locum habet, albidus, pilis tamen validioribus plerumque nigricantibus vel nigris; abdomen albo-pilosum, segmentis paenultimo et ultimo in mare superne nigro-pilosis; hypopygium oblique ascendens, infra productum et filamentum centrale arcuatulum, prope basim leviter anfractuosum emittens; pili hypopygii longiusculi, in inferâ ejus parte albidi, in reliquo hypopygio omnes nigri; lamellae anales foeminae tenues, longiusculae; pedes maris pilosi, metatarsis omnibus simplicibus, apice intermediorum pilum longum gerente; femora posteriora foeminae ulrinque pennata, tibiae anticae superne ciliato-pennatae, posteriores superne totae et infra adversus basim pennatae; balteres nigri; alae maris hyalinae, stigmate nigricante, venis costali longitudinaliumque tribus primis praeter basim nigris, reliquis pallidis; alae foeminae saturate cinereae; fere nigro-cinereae, adversus basim et costam etiam saturationes, stigmate nigricante, venis costali longitudinaliumque tribus primis praeter basim nigris, reliquis fuscis vel subfuscis; venae longitudinales quarta et sexta in utroque sexu non abbreviatae. — Long. corp.  $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$  lin., long. al.  $1\frac{3}{4}$ —2 lin.

25. *Empis levis* nov. sp. ♂.

**Ex** *Emp. chiopterae* Mg. affinibus; atra, tota nitida et tota nigro-pilosa; hypopygium parvum, breviter pilosum, lamellis lateralibus parvis, breviter ovatis, porrectis, filamento centrali praeter imam basim valde incrassatam operto; pedes modice pilosi, metatarsis omnibus simplicibus pilosque longiores nullos gerentibus; halteres nigri; alae totae aequaliter cinereo-hyalinae, stigmate subobsoleto saturati cinereo, venis omnibus nigris, longitudinali sextâ ante marginem alae abbreviatâ. — Long. corp.  $1\frac{1}{4}$  lin., long. al.  $1\frac{1}{2}$  lin.

26. *Empis leucopeza* nov. sp. ♂ et ♀.

Corporis formâ ac figurâ *Empidi griseae* Fall. (= *pilipedi* Meig.) proxima, ita ut cum hac aut *Pachymeriis* aut *Empidibus* adnumeraenda sit; albo-cinerea, vittarum dorsalium interstitiis paululo obscurioribus; antennae totae nigrae; caput et thoracis dorsum fere totum nigro-pilosa, fasciculus pilorum ante halteres, pili breves abdominis et halteres albi; hypopygium similiter atque *Empidis griseae* Fall. constructum, fere totum nigro-fuscum, nigro-pilosum; pedes nigri vel fusco-nigri, femorum posticorum apice plerumque tibiisque posticis adversus apicem semper badiis; femora postica modice incrassata, maris infra nigro-setosa, foeminae utrinque nigro-pennata; tibiae maris simplices, intermediae et posticae foeminae basim versus, illae infra, hae utrinque nigro-pennatae; tarsi postici in utroque sexu albi, articulo ultimo praeter basim nigro; tarsi anteriores fusco-nigri, articulis singulis praeter apicem plerumque sordidissime albicantibus, praesertim in mare; alae hyalinae, maris totae albidae, foeminae adversus basim albicantes, stigmate in utroque sexu nullo. — Long. corp.  $1\frac{3}{4}$  —  $2\frac{1}{2}$  lin., long. al.  $2$  —  $2\frac{1}{2}$  lin.

27. *Rhamphomyia sphenoptera* nov. sp. ♂ et ♀.

Macra, nudiuscula, nitida, atra, antennis palpisque concoloribus; proboscis quam caput paulo longior, labro luteo; pedes cum coxis lutei, apice femorum anteriorum superne nigro-fusco, posticorum unidue nigro, tibiis anticis et posticis adversus apicem tarsisque omnibus totis nigris, tarsis posticis incrassatis; alae adversus basim longe cuneatae, cinereae, stigmate venisque nigro-fuscis, venâ longitudinali ultima prope marginem alae abbreviatâ et cellulâ discoidalis latiusculâ sed brevi. — Long. corp.  $1\frac{5}{6}$  — 2 lin., long. al.  $1\frac{7}{2}$  —  $1\frac{3}{4}$  lin.

28. *Rhamphomyia eupterota* nov. sp. ♂ et ♀.

Tota nigra, polline exalbido, in abdome maris conferiore aspersa; vertex, superius occipitis dimidium thoracisque dorsum nigro-pilosa; pili in dimidio inferiore occipitis, fasciculus pilorum ante halteres abdominisque pili albi; proboscis nigra; labro femoribus anticis modice longiore, labellis linearibus modice longis, sed interdum valde elongatis; halteres exalbidi; venae alarum omnes perfectae.

♂. pili pedum nigri, adversus femorum basim exalbidi; femora posteriora infra et tibiae posteriores superne pilis longis nigris instructa; metatarsus posticus levissime subincrassatus; alae hyalinae, venis dilute subfuscis, costali longitudinaliumque tribus primis saturati fuscis et apicem versus fusco-nigris, stigmate obsoletissimo, vix levissime cinerascente; hypopygium parvum, ultimo ventris segmento dilatato suffultum, lamellis lateralibus oblique ascendentibus in margine postico pallide pilosis, filamento centrali recurvo sed inoperto.

♀. femora posteriora utrinque, tibiae posteriores superne totae, infra ad versus basim squamato-pennata; alae latiusculae, nigro-cinereae, cellulâ marginali praeter basim hyalinam et cellulae submarginalis margine antico nigrioribus; lamellae anales lincares, longiusculae.

Long. corp.  $1\frac{1}{2}$  lin., long. al.  $1\frac{3}{4}$  lin.

29. *Rhamphomyia leptopus* nov. sp. ♂.

Tota nigra, thorace cinereo-pollinoso et opaco, abdome leviter tantum pollinoso et subnitido; pili totius corporis nigri; proboscis medioeris, labro tibiis anticis sublongiore, labellis linearibus modice longis; hypopygium parvum, filamento centrali breviusculo, recurvo, praeter basim et apicem lamellis lateralibus opero; pedes elongati, tenues, modice pilosi, intermediorum femoribus infra tibiisque superne setas aliquot longiores gerentibus, tarsis omnibus simplicibus; halteres intei; alae cinereae, stigmate saturati cinereo, venâ longitudinali quartâ ante marginem alae abbreviatâ. — Long. corp.  $1\frac{7}{12}$  lin., long. al.  $1\frac{3}{4}$  lin.

30. *Hilara scrobiculata* nov. sp. ♂ et ♀.

Tota nigra, polline cinereo leviter aspersa, subnitida, nigro-pilosa, alis cinereo-hyalinis, stigmate fusco-nigro, venis nigris; frons aterrima, velutina; vittae ordinariae thoracis subobsoletae, laterales singulæ ab intermediâ interstitio saturate nigro distinctæ, vittæ

intermediae partes angustissimae, interstitio interjecto latissimo paulo obscuriore et antice pilis in tres, postice in quatuor series dispositis instructo; halteres nigri.

♂. pili in thoracis dorso mediocres; tibiae anticae posticaeque superne setis aliquot mediocribus instructae, intermediae setis destitutae; metatarsus anticus oblongo-ovatus, superne brevissime tantum pubescens; hypopygium majusculem, clausum vel subclausum.

♀. pili in thoracis dorso breviusculi; tibiae posticae validiusculae sed non incrassatae, adversus apicem paulo distinctius attenuatae, superne setis perpaucis instructae; tibiae reliquae superne setas nullas gerentes.

Long. corp.  $1\frac{3}{4}$  lin., long. al. 2 lin.

### 31. *Hilara cornicula* nov. sp. ♂.

Tota atra, nitida, polline cinereo leviter aspersa, pilis longiusculis nigris vestita; alae subnigrae, basi modice dilutiore, stigmate saturatius nigro; vittae ordinariae thoracis cum interstitiis unicolores; pili interstitionum rariores, lateralium in seriem subsimplicem, intermedii breviores et in series subquatuor dispositi; tibiae anticae et posticae superne pilis inaequalibus hirtae; metatarsus anticus ovatus, superne praeter pubem brevem pilis aliquot mediocribus instructus; hypopygium majusculem, nitidum, clausum, lamellis apicalibus pilos recurvos nigros gerentibus; halteres nigri. — Long. corp.  $1\frac{5}{8}$  lin., long. al.  $1\frac{1}{2}$  lin.

### 32. *Hilara platyura* nov. sp. ♂ et ♀.

Nigra et nigro-pilosa, capite thoraceque totis polline conferto cinereo opacis, ab domine non pollinoso, nitido; alae hyalinae, levissime cinerascentes, venis adversus marginem antiem at basim sordide luteis, adversus marginem posticem et apicem nigris, stigmate cinerascente subobsoleto; palpi testacei vel ex testaceo fusi; thoracis dorsum non vittatum, pilis interstitionum subbrevis, lateralium in seriem unicam, intermedii in series quatuor dispositis, setis vero prope margines laterales et posticum longis; pedes proportione tenues, genibus luteo-testaceis; halteres sordide lutei, capitulo saepe subfusco.

♂. tibiae anticae superne pilis brevibus setisque aliquot longioribus vestitae, postice pilis longioribus inaequalibus hirtae; metatarsus anticus ovato-oblongus, superne pilis brevibus instructus; hypopygium magnum, valde compressum, clausum, superne brevissime nigro-pilosulum.

♀. tibiae anticae et posticae setas aliquot gerentes.

Long. corp.  $1\frac{7}{12}$  lin., long. al.  $1\frac{3}{4}$  lin.

**33. *Hilara eumera* nov. sp. ♂.**

Tota nigra exceptis genibus luteo-testaceis, modice nitens, pube brevissimâ vestita; frons atra holosericea; thoracis dorsum obsoletissime cinereo-pollinosum, vittis et interstitiis concoloribus, horum pilis minutissimis, in intermedio in series duas dispositis; pleurae confertim cinereo-pollinosae; hypopygium parvum, modice compressum, clausum; tibiae anticae superne breviter pilosae et ante apicem pilo longiore munitae; metatarsus anticus valde incrassatus, oblongus, superne breviter pubescens; femora postica valde incrassata, apice infra exciso; halteres nigri; alae nigro-cinereae, venis validis et stigmata nigris. — Long. corp.  $1\frac{2}{3} - 1\frac{3}{4}$  lin., long. al.  $1\frac{1}{2}$  lin.

**34. *Hilara tetragramma* nov. sp. ♂ et ♀.**

Caput, thorax et abdomen tota dilute cinerea et opaca; thoracis dorsum brevissime nigro-pilosulum et vittis quatuor distinctissimis fusco-nigris et opacis pictum; abdomen pallide pilosulum; coxae cinereae, pallide pilosae; pedes nigri, leviter cinereo-pollinosi; halteres pallidi; alae cinereo-hyalinae, venis nigris, in imâ alarum basi testaceis, stigmate fusco-nigro.

♂. pedes breviter pilosi, metatarso antico ovato-oblongo, superne brevissime pilosulo; hypopygium cinereum, lamellis superis nigris.

♀. pedes simplices, breviter pilosuli.

Long. corp.  $1\frac{5}{6} - 2$  lin., long. al.  $2 - 2\frac{1}{2}$  lin.

**35. *Hilara pubipes* nov. sp. ♂ et ♀.**

Praecedenti simillima; mas tamen pedum intermediorum femoribus tibiisque in latere antico, metatarsis superne pilos confertiores et multo longiores gerentibus differit, foemina pilis totius corporis paulo longioribus aegre distinguitur. — Long. corp. 2 lin., long. al.  $2 - 2\frac{1}{2}$  lin.

**36. *Hilara cuneata* nov. sp. ♀.**

Corporis formâ ac figurâ *Hilarae flavepedi* Meig. similis, sed fronte aterrimâ, femorum posticorum apice tibiisque posticis praeter basim nigris, cellulâ denique discoidali longius cuneatâ distincta; ab *Hilarâ canescente* Zett. fronte aterrimâ holosericeâ, thorace ab-

domineque minus opacis, ventre pallido et femorum posticorum apice nigro differt. — Long. corp.  $1\frac{5}{8}$  —  $1\frac{1}{2}$  lin., long. al.  $1\frac{7}{8}$  lin.

**37. *Clinocera fallaciosa* nov. sp. ♂ et ♀.**

Notis omnibus *Clinocerae lotae* Wlk. proxima, corpore majore, genis paululo latioribus, alarum cellulâ submarginali secundâ modice longiore et stigmate oblongo anulissime subfuscō, tantum in speci minibus minus maturis subobsoleto, diversa; mas hypopygii parte, ex quâ penis nascitur, validiore et parte, cui lamellæ terminales insident, multo majore et multo crassiore facilis a mare *Clinocerae lotae* dignoscitur. — Long. corp. 2 —  $2\frac{1}{2}$  lin., long. al.  $2\frac{1}{2}$  —  $2\frac{1}{2}$  lin.

**38. *Psilopus bellus* nov. sp. ♂ et ♀.**

Corporis colore alarumque figurâ *Psil. platyptero* Fbr. simillimus, a quo mas articulis tarsorum intermediorum tertio breviore, quarto toto atro, compresso et valde dilatato differt, foemina vero antennis praeter imam basim nigris et alarum cellulâ posteriore secundâ breviore facile distinguitur. — Long. corp.  $2\frac{1}{2}$  lin., long. al.  $2\frac{1}{3}$  —  $2\frac{5}{8}$  lin.

**39. *Psilopus ludens* nov. sp. ♂.**

Figurâ et colore corporis *Psil. lobipedi* Mg. similis, sed tarsorum antenorū articulo paenultimo non lobato, sed simpliciter compresso alarumque venâ transversâ posteriore magis obliquâ distinctus; a *Psil. valido* Lw., cui tarsorum antenorū fabricâ proximus est, magnitudine minore, pilis totius corporis brevioribus et venâ transversâ posteriore etiam obliquiore differt; appendices hypopygii luteae, adversus apicem nigrae. — Long. corp.  $2\frac{1}{3}$  —  $2\frac{1}{2}$  lin., long.  $2\frac{1}{6}$  —  $2\frac{1}{4}$  lin.

**40. *Oncopygus magnificus* nov. sp. ♂.**

Quam *Oncop. distans* Lw. major; alae cinereae, dimidi costalis parte terminali nigrâ, venae tamen longitudinalis tertiae dimidio apicali postice vittâ tenui et aequali albo-hyalinâ limbato. — Long. corp.  $2\frac{3}{4}$  lin., long. al.  $2\frac{1}{3}$  —  $2\frac{5}{8}$  lin.

**41. *Sybistroma maerens* nov. sp. ♂ et ♀.**

Nigro-viridis, pedibus in utroque sexu simplicibus et totis atris, alis nigricantibus.

♂. antennarum articuli duo primi nigri, tertius brevissimus, luteus, aristâ elongatâ binodotâ instructus.

♀. antennae totae nigrae, aristâ non elongatâ simplice.

Long. corp.  $1\frac{2}{4}$  —  $1\frac{5}{8}$ , long. al.  $1\frac{2}{3}$  lin.

42. *Phorostoma adelpha* nov. sp. ♂ et ♀.

*Phorostomae trianguliferae* Zett. (non Rond.) proxima, sed facie minus carinatâ, antennis totis nigris et articulo terminali longiore instructis, abdomine denique similiter quidem, magis tamen tessellatim picto diversa. — Long. corp.  $5 - 5\frac{1}{2}$  lin., long. al.  $4\frac{5}{12} - 4\frac{7}{12}$  lin.

43. *Phorostoma macrophtalma* nov. sp. ♀.

Colore et picturâ *Phorostomae pectinatae* Meig. similis, sed carinâ faciei minus altâ, antennis longioribus, segmento abdominalis secundo macrochaetis desituto tibiisque posticis longius et aequalius ciliatis facile dignota; a *Phorostoma subrotundata* Rond., ad quam proxime accedit, vertice minns confertim piloso, fronte ipsâ et vittâ frontali adversus verticem magis angustatis, sed orbitis albidis proportione latioribus differt; praeterea genae angustiores sunt, quam *Phorostomae subrotundatae*. — Long. corp.  $4\frac{7}{12} - 4\frac{3}{4}$  lin., long. al.  $4\frac{1}{6}$  lin.

44. *Echinomyia Brunneri* nov. sp. ♂.

Magna, abdomine quam affinium latiore. Caput totum polline suturate ochraceo vestitum; antennae rufae, articulo tertio late ovato et praeter basim fusco, paenultimo aristae articulo brevi; genae totae pubes ochraceâ vestitae, setis nullis instructae; palpi tenues. Iu-tei. Thorax niger, dorso levissime tantum cinereo-pollinoso, nitido; scutellum rufo-piceum. Abdomen latum, praeter vittam nigram piceo-rufum, nitidum, margine antico segmenti tertii latera versus anguste et obsoletissime lutescente-pollinoso, segmenti quarti dimidio anteriore adversus latera polline dilute lutescente confertius asperso; margo posticus segmentorum primi et secundi singulorum praeter setas laterales in medio abdominali setis, illius quartuor, hujus sex instructus, segmenti tertii totus confertâ setarum serie armatus; setae praeter marginales in segmentis tertio et quarto nullae. Femora nigra, tibiae cum tarsis rufo-piceae. Alae fusco-cinereae, basi tegulisque ochraceis. — Long. corp.  $7\frac{1}{4}$  lin., long. al.  $6\frac{1}{2}$  lin.

45. *Strongylogaster pannonus* nov. sp. ♂.

Niger, nitidus, antennis, palpis pedibusque totis concoloribus, facie abdominalisque fasciis tribus interruptis confertius albo-pollinosus, singulis in segmentorum secundi, tertii et quarti basi sitis, humeris pleurisque polline albo minus confertim aspersis; tegulae et alae infuscatae. A mare *Strongylogastri delicati* Meig., quocum in reliquis notis congruit, corpore duplo longiore, fronte paulo latiore

et alis multo obscurioribus differt. — Long. corp.  $2\frac{1}{2}$  lin., long. al. 2 lin.

**46. *Chirosia fallax* nov. sp. ♂.**

Nigra, antennis, palpis pedibusque totis concoloribus; vitta frontalis rufa, adversus ocellos rufo-fusea, setis decussatis ab ocellis sat late distantibus instructa; thoracis dorsum polline subfuscō adspersum, opacum. vittis distinctis nullis; abdomen polline cinereo opacum, imā tamen segmentorum singulorum basi nigricante et vittā latiusculā nigrā; hypopygium parvum cinereum; tegulae exalbidae; alae cinereo-hyalinae, costā basim versus setulis brevibus ciliatā et spinulam conspicuum gerente; venae longitudinales tertia et quarta apicem versus parallelae, venula transversalis posterior subnormalis et recta. — Long. corp.  $1\frac{5}{8}$  lin., long. al.  $1\frac{1}{2}$  lin.

**47. *Anthomyia triplex* nov. sp. ♂.**

Nigra, antennis, palpis pedibusque concoloribus, polline albidente cinerea; oculi subcontigni; frons modice prominens, facies perpendicularis; antennae mediocres, selam breviter sed distincte pilosulam. in imā basi satis incrassatam gerentes; thoracis dorsum obsolete vittatum; tria ultima abdominis segmenta singula maculis ternis trigonis atris, ad marginem anticū sitis ornata; hypopygium cinereum. Tegulae albae, superior inferiore modice brevior; alae cinereo-hyalinae, spinulā costali minutā, venis longitudinalibus tertia et quartā adversus apicem parallelis, venulā transversā mediā in ultimo cellulae discoidalis triente sitā, posteriore modice tantum obliquā et rectā. — Long. corp.  $2\frac{1}{2}$  lin., long. al.  $2\frac{1}{2}$  lin.

**48. *Anthomyia corvina* nov. sp. ♂.**

Ex affinibus *Anthomyiae Billbergi* Zett. — Atra, nitida, tota setis longis nigris instructa; caput subtumidum, genis totis et facie albo-pollinosis, oris margine antico reflexo et confertim setoso, fronte pro portione latā, orbitis frontalibns angustis et nitidis, adversus marginem anticū frontis levissime albo-pollinosis, antennarum brevium articulo terminali subrotundo et setam nudam prope basim valde incrassatam gerente; abdomen cylindricum, modice depresso; pedes validi, valde setosi, unguibus validis pulvillisque magnis instructi; balteres sublutescentes; tegulae minutae, subaequales, exalbidae vel dilutissime flavicantes; alae ex fusco cinereae, adversus basim fuscae et in imā basi nigrae, venis nigris, longitudinalibus tertia et quartā apicem versus divergentibus, transversā posteriore rectā et subnormali, spinā costali minutissimā vel nullā. — Long. corp.  $2\frac{5}{8}$  lin., long. al.  $2\frac{5}{12}$  lin.

**Nota.** Foemina, quam *Anthomyiae corvinae* esse persuasum habeo, tarsorum anticorum articulis secundo et tertio dilatatis excellit; color alarum, magis luteo-cinereus quam in mare, adversus costam et basim in luteum vergit, in imâ tamen basi niger est; frons paulo tantum latior quam maris.

**49. *Homalomyia cothurnata* nov. sp. ♂.**

Magnitudine, figurâ et totius corporis picturâ *Homalomyiae armatae* Meig. simillima et tarsorum intermediorum articulo primo infra in imâ basi dente valido ut in hac instructo; tibiae posticae superne setis duabus longis instructae, infra subnudae; tibiae intermediae infra brevius pilosulae quam *Homalomyiae armatae* et praeter trientem basalem modice incrassatae, non dimidio apicali valde incrassato, quale in *Homalomyia armata* conspicitur. — Long. corp.  $1\frac{1}{2}$  — 2 lin.

**50. *Homalomyia coracina* nov. sp. ♂.**

Tibiarum intermediarum fabricâ *Homalomyiae scalari* L. proxima, tuberculo tamen, quo infra instructae sunt, longiore et minus alto; praeterea facile distinguitur thoracis dorso vix levissime pollinoso et atro, femoribus intermediis infra aequaliter selosis, non setas in medio femore confertiores gerentibus, tibiis posticis utrinque pilis multo longioribus instructis, alis saturate nigricantibus venisque longitudinalibus tertiatâ et quartâ adversus finem accurati parallelis. — Long. corp.  $2\frac{5}{12}$  lin., long. al. 2 —  $2\frac{1}{2}$  lin.

**51. *Homalomyia fasciculata* nov. sp. ♂.**

Nigra, pedibus concoloribus, femoribus posticis longis, incurvis et infra prope apicem pilorum longorum nigrorum fasciculo instructis; segmenta abdominalia secundum, tertium et quartum pallide flavicantia, subpellucida, singula triangulo atro ornata; tegulae albidæ; halteres pallidi, alae cinerascentes. — Long. corp.  $2\frac{1}{2}$  lin., long. al.  $2\frac{1}{3}$  lin.

**52. *Homalomyia obesa* nov. sp. ♂ et ♀.**

Nigra; frons maris pro sexu lata, foeminae angusta; thoracis dorsum in mare leviter, in foeminâ confertius cinereo-pollinosum; abdomen quam in congeneribus plerisque minus depresso; aequaliter cinereum, maris vittâ angustâ et aequali nigrâ pictum; maris metasternum spinis duabus rectis instructum et coxae posticae singulæ spinâ aduncâ armatae; tibiae maris piceae, anticae nou raro fere totae vel totae nigrae, intermediae plerumque adversus basim nigrae, subsimplices et infra nigro-pilosulae, posticae iufra confertim

pilosae; tibiae foeminae piceae vel rufo-piceae, simplices. Halteres et tegulae dilute lutescentes. Alae cinereae, foeminae tamen dilutiores quam maris, basi in utroque sexu luteâ. — Long. corp.  $2\frac{7}{8}$ — $2\frac{3}{4}$  lin., long. al.  $2\frac{5}{8}$ — $2\frac{7}{8}$  lin.

53. *Aricia pura* nov. sp. ♂.

Cinerea, antennis pedibusque nigris, illarum aristâ longe plumatâ, tegulis niveis, alis totis hyalinis, venis longitudinalibus tertiatâ et quartâ adversus apicem divergentibus. Facies tota et frons angusta confertim albo-pollinosae, vittâ hujus linearî nigrâ, prope annas modice dilatatâ; palpi nigri; oculi hirti. Vittae thoracis ex cinereo nigricantes, intermediae artes angustae, intervallo lato macrochaetis nullis instruncto separatae. Ferales latiores, singulae e maculâ ante suturam et alterâ longiore et magis erucatâ pone suturam sitâ compositae. Scutellum totum cinereum. Abdomen albido-cinerenum, tantum obsolete tessellatum, segmentis intermediis vittâ nigricante ad incisuras interruptâ pectilis. Genua extrema rufa; tibiae anticae setas nullas gerentes praeter subapicalem, intermediae praeter setas apicales in latere postico setis tribus vel quatuor armatae. Halteres pallidi. Alarum venae fusco-nigrae, transversalis posterior subrecta et modice obliqua; spinula costalis nulla. — Long. corp.  $3\frac{3}{4}$ — $3\frac{5}{8}$  lin., long. al.  $3\frac{1}{2}$  lin.

54. *Aricia aculeata* nov. sp. ♂.

*Ariciae pallidae* Fbr. similis, sed major, oculis brevius pilosis, antennarum articulo tertio toto fusco et setâ breviter pilosâ instructo, tibiis posticis calcare validissimo armatis venisque longitudinalibus secundâ et tertiatâ subparallelis facile distincta. Ab *Aricia* plerisque setâ antennarum non plumatâ sed pilosâ differt, sed reliquis notis iis tam propinqua est, ut ailio generi inseri non possit. Long. corp.  $3$ — $3\frac{1}{2}$  lin., long. al.  $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{5}{8}$  lin.

55. *Hydrotaea amoena* nov. sp. ♂.

Atra, nitida, facie et lunulâ frontali cinereis, alis basim versus lutescentibus, imâ tamen basi atrâ, venis longitudinalibus tertiatâ et quartâ subparallelis, transversâ posteriore rectâ et subnormali, oculis nudis, tegulis pallidis, halteribus nigris.

♂. Oculi in fronte contigui; thorax et scutellum polline nullo aspersa; abdomen distinete chalybescens, albido-pollinosum, segmentis paenultimo et antepaenultimo singulis maculâ trigonâ atrâ notatis; femora antica bidentata, intermedia prope apicem infra pilo longissimo instructa; alae quam foeminae magis cinerascentes.

♀. Frons atra, opaca, triangulo verticali et marginibus laterali bus nitidis; abdominis color ater in chalybeum vix levissime ver gens, pollen fere nullum.

Long. corp.  $2 - 2\frac{5}{12}$  lin., long. al.  $2 - 2\frac{1}{2}$  lin.

56. *Coenosia inornata* nov. sp. ♂ et ♀.

Cinerea, setâ antennarum longissime plumatâ, vittâ frontis latissimae antice rufâ, abdomine maris vittâ nigro-fuscâ piecio, foeminae unicolor, pedibus testaceis; femoribus tamen anticis praeter apicem tarsisque omnibus nigris, alis spinulâ costali et venâ longitudinali sextâ in marginem alae excurrente instructis. — Long. corp.  $2 - 3$  lin., long. al.  $1\frac{7}{12} - 2\frac{1}{2}$  lin.

57. *Blepharoptera brachypterna* nov. sp. ♂.

Cinerea, duobus primis antennarum articulis, capite praeter verticem et praeter superius occipitis dimidium, abdomine pedibusque rufis, tarsis fuscis, primo tamen posticorum articulo dilutiore et mire abbreviato; ultimus antennarum articulus niger, arista concolor subtilis, articulo tamen primo et imâ secundi basi incrassatis; setae mystacinae ulrinque binae; pleurarum dimidium inferius praeter pilos ordinarios pube nullâ vestitum; alarum costa distinete setosa, venae transversales colore obscuriore nullo limbatae. — Long. corp.  $2\frac{1}{2}$  lin., long. al.  $2\frac{7}{12} - 2\frac{2}{3}$  lin.

58. *Ortalidis levigata* nov. sp. ♂.

Totius corporis fabricâ et colore *Ort. ruficipiti* Fbr. simillima, vittis tamen dorsalibus thoracis postice non abbreviatis, sed integris et picturâ alarum paulo diversâ, vittulâ nempe subbasali latiore magisne normaliter demissâ et maculâ apicali, ubi incipit, inde a costâ usque in cellulam posteriorem primam dilatatâ, ita ut alae similiter alque in *Ort. gratâ* Lw. pictae sint. — Long. corp.  $2\frac{2}{3}$  lin., long. al.  $2\frac{1}{12} - 3$  lin.

59. *Ortalidis Kowarzii* nov. sp. ♂.

Cinerea, pedibus nigris, thorace subtiliter nigro-punctulato et pilis quam in reliquis speciebus longioribus hirto, ita ut inter *Ortalides* et *Trichonotas* quasi intermedia sit; alarum figura et venae *Ortalidis* verae sunt, pictura vero nigro-fusca similis est *Pteropoe ciliae lamed* Schrk., paenultimo tamen venae quartae segmento late fusco-limbato et paenultimo quintae praeter basim et apicem limbo fusco destitutum. — Long. corp.  $2\frac{3}{4}$  lin., long. al.  $3\frac{1}{12} - 3\frac{1}{6}$  lin.

60. *Lonchaea inaequalis* nov. sp. ♂.

Nitida, nigra, pedibus totis halterumque capitulo concoloribus; tertius antennarum articulus rotundato-ovatus; ultimum abdominis segmentum permagnum, praecedentibus simul sumis subaequale; tegulae exalbidae; alae hyalinae, in speciminiis maturis dilutissime lutescentes. venis paulo saturatis luteis. longitudinalibus secundâ et tertiatâ quam in speciebus plerisque minus divergentibus. — Long. corp.  $1\frac{1}{2} - 1\frac{1}{2}$  lin., long. al.  $1\frac{1}{2} - 1\frac{2}{3}$  lin.

61. *Sapromyza tetrachaeta* nov. sp. ♀.

Lutea, antennis, palpis pedibusque totis concoloribus, setâ antennarum plumatâ, tertio abdominis segmento mire abbreviato et in margine postico ultrinque setis binis validissimis instructo. — Long. corp.  $1\frac{2}{3}$  lin., long. al.  $1\frac{5}{6}$  lin.

62. *Athyroglossa nudiuscula* nov. sp. ♂.

*Athyroglossae glabrae* Meig. simillima, sed setae antennalis radiis pluribus longioribusque, setis verticis et sentelli brevioribus, halteribus denique dilute luteis bene distincta. — Long. corp.  $1\frac{1}{6}$  lin., long. al. 1 lin.

63. *Drosophila rufifrons* nov. sp. ♂ et ♀.

*Drosophilae obscurae* Fall. similis, sed colore frontis saturatissime rufo adversus margines laterales et anticum saepe in atrum vergente, thorace minus opaco et abdome magis nitente, alis proportione brevioribus et venis transversis intervallo minore separatis, tarsis denique anticis maris simplicibus distincta. — Long. corp.  $1\frac{1}{4} - 1\frac{1}{3}$  lin., long. al.  $1\frac{1}{6} - 1\frac{1}{4}$  lin.

64. *Scyphella latifrons* nov. sp. ♀.

Pallidissime flavescens, opaca, fronte praeter margines laterales et antennis luteis, vittis dorsalibus thoracis tribus cinereis, lateralibus interruptis, metanoto nigro, abdome praeter segmentorum singulorum margines laterales et posticum fusco, extreto tarsorum omnium articulo dilute subfusco; alae hyalinae, venis dilute lutescentibus, longitudinalibus secundâ et tertiatâ apicem versus quam in congeneribus magis convergentibus. tertiatâ in summam alae apicem excurrente et cum quartâ parallelâ, venâ transversali mediâ in ultimo cellulae discoidalis triente collocatâ. — Long. corp.  $\frac{7}{12} - \frac{2}{3}$  lin., long. al.  $\frac{3}{4} - \frac{5}{6}$  lin.

65. *Dicraeus obscurus* nov. sp. ♀.

Ater nitidus; caput concolor, frontis dimidio anteriore rufo, facie et genis luteis; triangulum ocellare majusculum, subaequilaterale, atrum, nitidum; antennae breves ex luteo rufae, articuli tertii margine et latere exteriore nigro-fuscis vel nigris. Oculi majusculi, rotundati; genae medioeres; facies paulo recedens; scutellum convexum; pedes nigri. femorum apice, tibiis anterioribus maximâ ex parte vel totis, posticarum apice, tarsis denique rufis, his tamen adversus apicem nigro-fuscis; halteres lutei; alae subhyalinae, colore cinereo, adversus costam saturatiore tinctae; venae nigrae, longitudinales tertiarâ et quartâ adversus apicem parallelæ, costalis in alae apice inter longitudinales tertiam et quartam delinqescens. — Long. corp. 1—1 $\frac{1}{6}$  lin., long. al. 1 $\frac{1}{4}$ —1 $\frac{1}{3}$  lin.

*Nota.* *Dicraeus*, novum *Oscinidarum* genus *Elliponeuræ* proximum, a reliquis hujus familiae generibus adhuc cognitis venâ transversali posteriore nullâ distinguitur; ab *Elliponeurâ* differt venis longitudinalibus secundâ et tertiarâ non recurvis sed rectis, tertiarâ et quartâ adversus apicem non divergentibus sed parallelis, segmentis costæ secundo et tertio non subaequalibus, sed illo quadruplicem hujus longitudinem adaequante.

66. *Oscinis (Siphonella) quinquangula* nov. sp. ♀.

Atra, modice nitens, coxis anticis pedibusque omnibus flavis, femoribus tamen posterioribus praeter trientem apicalem atris et tibiarum posticarum annulo obsoleto tarsorumque apice fuscis; caput atrum; frons lata, triangulo ocellari magno, subtiliter punctulato, quam reliqua frons vix magis nitente; antennae nigrae, articulo tertio permagno, subsecuriformi, basim versus infra rufo; seta antennalis breviuscula, tenuis, adversus basim non incrassata, nigricans; facies brevis, sub antennis excavata. adversus oris marginem valde projecta; genae angustae, albido-pollinosae; palpi lineares, pallide flavi; proboscis geniculata, fusca; thoracis dorsum subtiliter punctulatum, polline dilute fusco vix levissime aspersum; scutelli margo setulis sex rigidis nigris instructus; halteres nigri; alae pure hyalinae; vena longitudinalis secunda per breve, ita ut primum costæ segmentum sesquialteram secundi longitudinalinem paulo excedat, tertium duplicum ejus longitudinalinem aequiparet; basis venae longitudinalis tertiae a secundæ basi latius distat. quam in speciebus reliquis, ita ut cellula basalis prima figurâ quinquangulatâ excellat; vena transversalis media obliqua, posterior eliam obliquior et brevis; cellula submarginalis latissima; venae longitudinales tertia et

quarta parallelae, late inter se distantes. — Long. corp. 1 lin., long. al. 1 lin.

67. *Agromyza trivittata* nov. sp. ♂.

Flava, fronte antennisque praeter marginem articuli tertii subfuscum luteis, vittis thoracis tribus subconfluentibus et metanoto nigris, abdomine subnitido fusco-nigro, segmentorum tamen singularium margine postico flavo, terebrâ crassâ atrâ; pedes flavo et fusco variegati, posteriores praeter genna fere toti fusi; halteres albidi; alas cinereae, venâ costali paulo ultra longitudinali tertiam pertinente, longitudinali quartâ pone apicem alae excurrente, cellulâ discoidali brevissimâ, basali secundâ nullâ. — Long. corp.  $1\frac{1}{6}$  —  $1\frac{1}{4}$  lin., long. al.  $1\frac{5}{2}$  —  $1\frac{1}{2}$  lin.

---

# ZOBODAT -

## **www.zobodat.at**

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift  
\(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche  
Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1873

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Loew Hermann

Artikel/Article: [Diptera nova, in Pannonia inferiori et in  
confinibus Daciae regionibus a Ferd. Kowarzio captata. 33-52](#)

