

[Berliner entomologische Zeitschrift 1873.]

Diptera nova,

in Pannoniâ inferiori et in confinibus Daciae regionibus,
a *Ferd. Kowarzio* capta.

Descripsit *H. Loew*.

1. *Culex leucacanthus* nov. sp. ♂.

Nigricans, thoracis dorso orichalceo-tomentoso, pleuris, segmentorumque abdominalium singulorum fasciâ basali candido-tomentosis. Pedes nigri; femora adversus apicem albida; genua, extremus tibiaram apex, ultimus tarsorum articulus articularumque reliquorum basis et apex candida, tarsorum tamen anticorum articuli paenultimus totus et antepaenultimus praeter imam basim nigri; tibiaram setulae omnes candidae. — Long. corp. $1\frac{3}{4}$ lin., long. al. $1\frac{1}{2}$ lin.

2. *Tipula pannonia* nov. sp. ♂ et ♀.

Ex *Tip. ochraceae* Meig. affinis, luteo-testacea, fronte, thoracis dorso pleurisque cinerascentibus, vittâ mediâ thoracis didymâ dilute subfuscâ, lateralibus subnullis, abdomine fusco-trivittato; antennae nigro-fuscae. scapo et imâ flagelli basi luteis.

♂. abdominis vittae angustae, intermedia in segmentis primis plerumque obsoleta; alae colore fusco-cinereo modice tinctae, stigmatate fusco, lunulâ albâ in imam usque cellulae posterioris quartae basim pertinente; hypopygium fuscum, apice lamellae inferae pilorum fulvorum fasciculum gerente.

♀. abdominis vittae laterales dilatatae, intermedia adversus abdominis basim interdum subobsoleta; alae colore luteo-cinereo saturatius tinctae, stigmatate fusco, lunulâ albâ usque in cellulae posterioris quartae basim ductâ et hinc in cellulae posterioris quintae basim dilatata; terebra rufo-picea, lamellis superis rectis et acutis.

Long. corp. ♂ $6\frac{1}{2}$, ♀ $7\frac{1}{2}$ lin., long. al. ♂ $9-9\frac{1}{4}$, ♀ $10\frac{1}{4}-10\frac{1}{2}$ lin.

3. *Tipula truncata* nov. sp. ♂ et ♀.

Ex *Tip. ochraceae* Meig. affinibus, lutea, fronte thoracisque dorso leviter in cinereum vergentibus, vittis hujus dilute subfuscis, lateralibus angustis, intermediâ didymâ, interjectâ lineâ subfuscâ, abdomine fusco-trivittato; antennae luteae, articulis singulis flagelli inde a secundo in imâ basi nigris; alae colore luteo-cinereo modice tinctae, stigmatе fusco, lunulâ albidâ usque in basim cellulae posterioris quartae pertinente.

♂. vittae abdominis adversus basim plerumque obsoletae; lunula albida alarum in imâ cellulae posterioris quartae basi deliquescentes; hypopygium ingens. fuscum, lamellâ inferâ permagnâ, lalissimâ, truncatâ, apophysibus duabus permagnis apicem versus compressis et conniventibus instructâ.

♀. vittae abdominis laterales saepe, intermedia fere semper obsoletae: alarum lunula albida trientem basalem cellulae posterioris quartae explens; duo ultima abdominis segmenta fusca; terebra lutea, eximie abbreviata, lamellis superis acutis, adversus basim subhorizontaliter dilatatis, lamellis inferis obtusiusculis.

Long. corp. ♂ $6\frac{1}{3}$ —7, ♀ $7\frac{1}{3}$ — $7\frac{2}{3}$ lin., long. al. ♂ $8\frac{1}{2}$ — $9\frac{1}{4}$, ♀ $9\frac{1}{3}$ — $9\frac{1}{2}$ lin.

4. *Tipula bispina* nov. sp. ♂.

Tipulae truncatae mire similis, vix nisi hypopygio minus crasso, apophysibus lamellae inferae brevioribus, adversus apicem non compressis et in apice ipso setas binas validissimas gerentibus, alarum denique lunulâ albidâ paulo breviorе distincta. — Long. corp. $6\frac{1}{2}$ lin., long. al. $8\frac{1}{2}$ lin.

5. *Tipula helvola* nov. sp. ♂ et ♀.

Ex *Tip. ochraceae* Meig. affinibus, corporis figurâ et magnitudine *Tip. humili* Staeg. propinqua; dilute luteola, antennis concoloribus, imâ tamen basi articulorum singulorum flagelli omnium atrâ, thoracis dorso non vittato, abdominis vittâ subfuscâ vel adversus basim. vel totâ obsoletâ; alae subhyalinae, colore dilute fusco-cinereo leviter tinctae, stigmatе subfusco, lunulâ albidâ modice conspicuâ.

♂. lunula exalbida alarum usque ad cellulae discoidalis marginem posticum pertinens; hypopygium mediocre, non incrassatum, luteum, lamellis adversus basim plerumque fuscis, inferâ subelongatâ, apice truncato exalbido et pilorum fulvescentium fasciculum gerente.

♀. lunula exalbida alarum usque in cellulae posterioris quartae basim ducta; terebra luteola, breviuscula sed non abbreviata, lamellis superis rectis acutiusculis.

Long. corp. ♂ 4—5 $\frac{1}{3}$, ♀ 5—5 $\frac{1}{4}$ lin., long. al. 5 $\frac{2}{3}$ —6 $\frac{1}{4}$ lin.

6. *Limnobia decemmaculata* nov. sp. ♂ et ♀.

Fusca, nuper tamen exclusa rufescens; alae colore dilute vel dilutissime subfusco aequaliter tinctae et maculis quinque rotundatis fusco-nigris ornatae, quarum tres costales in venae auxiliaris venarumque longitudinalium primae et secundae apice, reliquae duae subcostales in venarum longitudinalium secundae et tertiae basi locum habent; praeterea venulae transversales colore fusco-nigro limbatae; venae alarum similiter atque *Limnobiae xanthopterae* Meig. ductae et combinatae. — Long. corp. 2 $\frac{3}{4}$ —3 lin., long. al. 3 $\frac{1}{2}$ —4 $\frac{1}{6}$ lin.

7. *Rhypholophus pentagonalis* nov. sp. ♂ et ♀.

Fuscus, thorace non vittato, in immaturis rufescens; alae colore subfusco dilute tinctae. stigmatibus saturatius fusco, cellulâ marginali primâ usque ad submarginalis primae basim pertinente. cellulae discoidalis basi non cuneatâ sed truncatâ, cellulâ basali secundâ quam prima satis brevior, venâ longitudinali ultimâ non elongatâ. — Long. corp. ♂ 2—2 $\frac{1}{6}$, ♀ 2 $\frac{5}{12}$ —2 $\frac{7}{12}$ lin., long. al. 2 $\frac{3}{4}$ —3 $\frac{1}{4}$ lin.

8. *Cladura fuscula* nov. sp. ♂ et ♀.

Alae adversus apicem et prope marginem posticum pilosae; cellula posterior secunda perbrevis — Long. corp. ♂ 1 $\frac{3}{4}$, ♀ 2 $\frac{1}{4}$ lin., long. al. 2 $\frac{7}{12}$ —2 $\frac{3}{4}$ lin.

9. *Dynatosoma nobilis* nov. sp. ♂ et ♀.

Exemplis *Dynatosomae fuscicornis* Meig. dilutius pictis similima, sed major, picturâ venisque alarum nigrioribus, pedunculo cellulae posterioris quartae brevior, hypopygio maris minus tumido et terebrâ foeminae modice longiore. — Long. corp. ♂ 2 $\frac{3}{4}$, ♀ 3 $\frac{1}{4}$ lin., long. al. ♂ 2 $\frac{3}{4}$, ♀ 3 $\frac{1}{2}$ lin.

10. *Sciophila pallens* nov. sp. ♀.

Dilute lutea, pleuris totis concoloribus, antennis praeter basim, capite superne, thoracis vittis tribus segmentorumque abdominalium singulorum dimidio priore, segmenti tamen primi dilutius fuscis; tibiae anticae metatarsis modice sed distincte breviores; basis cellulae posterioris quartae pone primae basim sita; cellula submarginalis interior majuscula, venâ obliquâ ab exteriori distincta, colore obscuriore nullo tincta. — Long. corp. 2 $\frac{2}{3}$ lin., long. al. 2 $\frac{1}{2}$ lin.

11. *Sciophila nigriceps* nov. sp. ♀.

Lutea, antennis praeter basim. capite toto, palpis, thoracis vitis integris, pleurarum maculis magnis, metanoti dimidio inferiore abdomineque nigris, hujus tamen segmentis secundo, tertio et quarto singulis fasciâ basali subinterrupta luteâ ornatis; tibiae anticae quam metatarsi longiores; basis cellulae posterioris quartae ante primae basim sita. — Long. corp. $2\frac{1}{7}$ lin., long. al. $2\frac{1}{4}$ lin.

12. *Bibio macer* nov. sp. ♂.

Corporis formâ pedumque posticorum fabricâ *Bib. clavipedi* Fabr. similis, similior *Bib. lepto* Lw.; ater, nitidus, pedum posteriorum tibiis praeter apicem et metatarsis adversus apicem rufis; tibiae posticae calcaribus curvis et acutis instructae; alae nigro-cinereae adversus apicale costae dimidium nigricantes, stigmatibus oblongo nigro, venis validis, anticis nigris, posticis fuscis, auxiliari et longitudinalium ultimâ dilutioribus; pili totius corporis nigri. — Long. corp. $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{3}$ lin., long. al. $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{3}$ lin.

13. *Odontomyia periscelis* nov. sp. ♀.

Cellulam submarginalem unicam gerens, corporis magnitudine et figurâ *Odontomyia flavissima* Ross. proxima, sed similiter atque *Odontomyia felina* Pnz. picta, a quâ corpore majore, antennis pro portione longioribus, maculis lateralibus abdominis non aequalibus, sed adversus marginem abdominis latioribus, tibiis denique flavis annulo medio nigro ornatis aperte differt. — Long. corp. $4\frac{1}{2}$ lin., long. al. $4\frac{5}{8}$ — $4\frac{1}{2}$ lin.

14. *Carysopila maerens* nov. sp. ♀.

Chrosopila auratae Fbr. proxima, sed paulo minor et alis limpidioribus stigmatibus longiore instructis diversa; abdomen maris praeter basim nigro-pilosum; in foeminae abdomine segmentum primum totum segmentorumque secundi tertii et quarti singulorum fascia basalis latissime interrupta tomento dilutissime flavicante, fere exalbido teguntur. — Long. corp. ♂ $2\frac{1}{2}$ — 3, ♀ $3\frac{1}{3}$ — $3\frac{1}{2}$ lin., long. al. ♂ 3 — $3\frac{1}{2}$, ♀ $3\frac{1}{6}$ — $3\frac{1}{3}$ lin.

15. *Xylota rufipes* nov. sp. ♂ et ♀.

Inter *Xylotas femorata* L. et *curvipedem* Lw. intermedia, ab illâ stigmatibus alarum nigro, femoribus posticis paulo crassioribus eorumque apice latius nigro, ab hac pedibus brevius pilosis, posticorum femoribus minus crassis tibiisque minus incurvis distincta. — Long. corp. $4\frac{5}{8}$ — 6 lin., long. al. $4\frac{1}{2}$ — $5\frac{5}{8}$ lin.

16. *Brachypalpus eunotus* nov. sp. ♀.

Niger, facie totâ, antennis pedibusque concoloribus; caput et thoracis dorsum polline albido-cinereo opaca, vittis tamen ordinariis hujus nigris et distinctissimis; abdomen fasciis tribus anguste interruptis glauco-cinereis ornatum, ultimâ plerumque polline detrito nitidâ. — Long. corp. $4\frac{1}{2}$ lin., long. al. $4\frac{1}{2}$ lin.

17. *Ceria tridens* nov. sp. ♀.

Ceria euprosopae Lw. simillima; vitta atra faciei superne tridentata, maculam flavam nullam includens; scutellum praeter fasciam basalem angustam et femora postica praeter basim et apicem nigra. — Long. corp. 5 lin., long. al. $4\frac{2}{3}$ lin.

18. *Empis procera* nov. sp. ♂ et ♀.

Nigra, antennis palpisque concoloribus, capite thoraceque polline exalbido cinereis et opacis, vittarum dorsalium interstitiis in fuscum vergentibus; labrum pedum anticorum tibiis et metatarso simul sumtis longius, labella longissima linearia; halteres pallidi; pili in mento et pleuris, in abdominis lateribus et in ventre pallidissimi, reliqui corporis pili nigri.

♂. tibiae praeter basim fuscae, tarsi toti fusco-nigri; femora intermedia infra pilis longis et validis nigris, adversus basim confertioribus instructa; alae subfuscae; hypopygium parvum, nigrum, lamellis lateralibus brevibus et simplicibus; segmentum ventrale ultimum dilatatum et filamentum longum, lamellis unguiformibus suffultum emittens.

♀. tibiarum apex et tarsi fusci, femora posteriora infra breviter pennato-ciliata; alae nigro-fuscae; lamellae anales lineares.

Long. corp. $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{7}{8}$ lin., long. al. $2\frac{3}{4}$ — $2\frac{5}{6}$ lin.

19. *Empis alampra* nov. sp. ♂.

Tota nigra, thorace cinereo-pollinoso, abdomine superne atro et opaco, pilis setisque totius corporis nigris, halteribus pallidis; proboscis elongata labellis linearibus mire longis instructa; alae nigro-cinerae, basi lutescente, venis omnibus perfectis; pedes longi, intermediorum femoribus infra tibiisque utrinque setas longas confertas, anticorum posticorumque tibiis superne minus confertas gerentibus, metarsis non incrassatis; hypopygium parvum, lamellis lateralibus brevissimis obtusis, filamento centrali brevi et crassissimo. — Long. corp. $2\frac{1}{3}$ — $2\frac{5}{8}$ lin., long. al. $2\frac{2}{3}$ lin.

20. *Empis nitidiventris* nov. sp. ♀.

Tota nigra, thorace cinereo-pollinoso, abdomine atro et nitido, pilorum fasciculo ante halteres, pilis abdominis et plerisque coarum pallidis, reliquis pilis setisque omnibus nigris, halteribus pallidis; proboscis elongata labellis linearibus mire elongatis instructa; alae subhyalinae, cinerascens, basi lutescente, venis omnibus perfectis et stigmate fusco-nigris, illis tamen in basi alarum dilute luteis; pedes longiusculi, femoribus posterioribus utrinque squamato-pennatis, tibiis anticis superne subsquamato-ciliatis, intermediis posticisque superne totis squamato-pennatis, illis infra in imâ basi, his praeter basim et apicem squamato-pennatis. — Long. corp. $2\frac{7}{8}$ — $2\frac{2}{3}$ lin., long. al. $2\frac{4}{8}$ lin.

21. *Empis tanysphyra* nov. sp. ♂.

Tota nigra, polline albido-cinereo aspersa, in thorace modice confertiore quam in abdomine, ita ut ille opacus, hoc vero subopacum sit; pili totius corporis nigri; halteres pallidi; proboscis mediocris, labro quam tibiae anticae vix longiore, labellis linearibus modice longis; setae scutelli duae; alae hyalinae, leviter cinerascens, stigmate nigro-cinereo, venis omnibus perfectis, costali longitudinaliumque tribus primis nigro-fuscis, reliquis dilutius fuscis vel ex luteo fuscis; pedes longi et tenues, intermediorum femoribus infra setas paucas, tibiis superne tres gerentibus, metatarsis omnibus non incrassatis; lamellae laterales hypopygii breves et obtusae, filamentum centrale longiusculum, recurvum. — Long. corp. $1\frac{3}{4}$ lin., long. al. $1\frac{5}{6}$ lin.

22. *Empis plebeja* nov. sp. ♂ et ♀.

Tota nigra, thorace cinereo-pollinoso; pili totius corporis nigri; halteres pallidi; proboscis mediocris, labro quam tibiae anticae vix longiore, labellis linearibus modice longis; setae scutelli quatuor; alae nigro-cinereae, basi obsolete et sordide lutescente, venis omnibus perfectis et stigmate nigro-fuscis.

♂. pedes longi et tenues, intermediorum femoribus infra setas paucas, tibiis superne setas quatuor gerentibus, metatarsis omnibus non incrassatis; lamellae laterales hypopygii breves et obtusae, filamentum centrale longiusculum et recurvum.

♀. alae subdilatae; femora posteriora utrinque squamato-pennata, tibiae intermediae superne subsquamato-ciliatae, tibiae posticae superne aequaliter subsquamato-pennatae, infra adversus basim subsquamato-ciliatae.

Long. corp. ♂ $1\frac{2}{3}$, ♀ $1\frac{3}{4}$ lin., long. al. ♂ $1\frac{1}{2}$, ♀ 2 lin.

23. *Empis melanotricha* nov. sp. ♂ et ♀.

Tota nigra, thorace leviter cinereo-pollinoso, abdomine subopaco, apicem versus magis nitente; pili totius corporis nigri; halteres pallidi; proboscis mediocris, labro quam tibiae anticae vix longiore, labellis linearibus modice longis; setae scutelli quatuor; venae alarum omnes perfectae.

♂. alae cinereae, venis auxiliari, longitudinalium tribus primis praeter basim sordide sublutescentem et stigmatate fusco-nigris, venis reliquis modice dilutioribus; pedes longi et tenues, intermediorum femoribus infra setas minus raras, tibiis superne setas quatuor gerentibus, metatarsis omnibus non incrassatis; lamellae laterales hypopygii breves et obtusae, filamentum centrale longiusculum et recurvum.

♀. alae quam maris latiores, nigro-cinereae, venis et stigmatate fusco-nigris, illis in imâ alarum basi paulo dilutioribus; femora posteriora superne tota, infra praeter basim breviter subsquamato-ciliata.

Long. corp. ♂ $1\frac{2}{3}$, ♀ $1\frac{3}{4}$ lin., long. al. $1\frac{1}{2}$ —2 lin.

24. *Empis filata* nov. sp. ♂ et ♀.

Ex *Emp. chiopterae* Mg. affinibus; tota nigra, capite, thorace abdomineque polline exalbido subopacis et cinereis; caput fere totum nigro-pilosum; thoracis dorsum pilis nigris rarioribus, sed longis instructum; pilorum fasciculus, qui ante halteres locum habet, albidus, pilis tamen validioribus plerumque nigricantibus vel nigris; abdomen albo-pilosum, segmentis paenultimo et ultimo in mare superne nigro-pilosis; hypopygium oblique ascendens, infra productum et filamentum centrale arcuatum, prope basim leviter anfractuosum emittens; pili hypopygii longiusculi, in inferâ ejus parte albidi, in reliquo hypopygio omnes nigri; lamellae anales foeminae tenues, longiusculae; pedes maris pilosi, metatarsis omnibus simplicibus, apice intermediorum pilum longum gerente; femora posteriora foeminae utrinque pennata, tibiae anticae superne ciliato-pennatae, posteriores superne totae et infra adversus basim pennatae; halteres nigri; alae maris hyalinae, stigmatate nigricante, venis costali longitudinaliumque tribus primis praeter basim nigris, reliquis pallidis; alae foeminae saturate cinereae; fere nigro-cinereae, adversus basim et costam etiam saturatiores, stigmatate nigricante, venis costali longitudinaliumque tribus primis praeter basim nigris, reliquis fuscis vel subfuscis; venae longitudinales quarta et sexta in utroque sexu non abbreviatae. — Long. corp. $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ lin., long. al. $1\frac{3}{4}$ —2 lin.

25. *Empis levis* nov. sp. ♂.

Ex *Emp. chiopterae* Mg. affinibus; atra, tota nitida et tota nigro-pilosa; hypopygium parvum, breviter pilosum, lamellis laterali-
bus parvis, breviter ovatis, porrectis, filamento centrali praeter imam
basim valde incrassatam operto; pedes modice pilosi, metatarsis
omnibus simplicibus pilosque longiores nullos gerentibus; halteres
nigri; alae totae aequaliter cinereo-hyalinae, stigmatate subobsoleto
saturatius cinereo, venis omnibus nigris, longitudinali sextâ ante
marginem alae abbreviatâ. — Long. corp. $1\frac{1}{4}$ lin., long. al. $1\frac{1}{2}$ lin.

26. *Empis leucopeza* nov. sp. ♂ et ♀.

Corporis formâ ac figurâ *Empidi griseae* Fall. (= *pilipedi* Meig.)
proxima, ita ut cum hac aut *Pachymeriis* aut *Empidibus* adnume-
randa sit; albo-cinerea, vittarum dorsalium interstitiis paululo ob-
scurioribus; antennae totae nigrae; caput et thoracis dorsum fere
totum nigro-pilosa, fasciculus pilorum ante halteres, pili breves ab-
dominis et halteres albi; hypopygium similiter atque *Empidis gri-
sae* Fall. constructum, fere totum nigro-fuscum, nigro-pilosum; pe-
des nigri vel fusco-nigri, femorum posticorum apice plerumque ti-
biisque posticis adversus apicem semper badiis; femora postica mo-
dice incrassata, maris infra nigro-setosa, foeminae utrinque nigro-
pennata; tibiae maris simplices, intermediae et posticae foeminae ba-
sim versus, illae infra, hae utrinque nigro-pennatae; tarsi postici
in utroque sexu albi, articulo ultimo praeter basim nigro; tarsi an-
teriores fusco-nigri, articulis singulis praeter apicem plerumque sor-
didissime albicantibus, praesertim in mare; alae hyalinae, maris to-
tae albidae, foeminae adversus basim albicantes, stigmatate in utro-
que sexu nullo. — Long. corp. $1\frac{3}{4}$ — $2\frac{1}{2}$ lin., long. al. 2 — $2\frac{1}{2}$ lin.

27. *Rhamphomyia sphenoptera* nov. sp. ♂ et ♀.

Macra, nudiuscula, nitida, atra, antennis palpisque concoloribus;
proboscis quam caput paulo longior, labro luteo; pedes cum coxis
lutei, apice femorum anteriorum superne nigro-fusco, posticorum un-
dique nigro, tibiis anticis et posticis adversus apicem tarsisque om-
nibus totis nigris, tarsis posticis $\frac{1}{2}$ incrassatis; alae adversus basim
longe cuneatae, cinerae, stigmatate venisque nigro-fuscis, venâ lon-
gitudinali ultima prope marginem alae abbreviatâ et cellulâ discoi-
dali latiusculâ sed brevi. — Long. corp. $1\frac{1}{6}$ — 2 lin., long. al. $1\frac{7}{8}$ —
 $1\frac{3}{4}$ lin.

28. *Rhamphomyia eupterota* nov. sp. ♂ et ♀.

Tota nigra, polline exalbido, in abdomine maris confertiore aspersa; vertex, superius occipitis dimidium thoracisque dorsum nigro-pilosa; pili in dimidio inferiore occipitis, fasciculus pilorum ante halteres abdominisque pili albi; proboscis nigra; labro femoribus anticis modice longiore. labellis linearibus modice longis, sed interdum valde elongatis; halteres exalbidi; venae alarum omnes perfectae.

♂. pili pedum nigri, adversus femorum basim exalbidi; femora posteriora infra et tibiae posteriores superne pilis longis nigris instructa; metatarsus posticus levissime subincrassatus; alae hyalinae, venis dilute subfuscis, costali longitudinaliumque tribus primis suturatus fuscis et apicem versus fusco-nigris, stigmate obsolete, vix levissime cinerascens; hypopygium parvum, ultimo ventris segmento dilatato suffultum, lamellis lateralibus oblique ascendentibus in margine postico pallide pilosis, filamento centrali recurvo sed inoperto.

♀. femora posteriora utrinque, tibiae posteriores superne totae, infra ad versus basim squamato-pennata; alae latiusculae, nigro-cinereae, cellulâ marginali praeter basim hyalinam et cellulae submarginalis margine antico nigrioribus; lamellae anales lineares, longiusculae.

Long. corp. $1\frac{1}{2}$ lin., long. al. $1\frac{3}{4}$ lin.

29. *Rhamphomyia leptopus* nov. sp. ♂.

Tota nigra, thorace cinereo-pollinoso et opaco, abdomine leviter tantum pollinoso et subnitido; pili totius corporis nigri; proboscis mediocris, labro tibiis anticis sublongiore, labellis linearibus modice longis; hypopygium parvum, filamento centrali breviusculo, recurvo, praeter basim et apicem lamellis lateralibus operto; pedes elongati, tennes, modice pilosi, intermediorum femoribus infra tibiisque superne setas aliquot longiores gerentibus, tarsis omnibus simplicibus; halteres lutei; alae cinereae, stigmate saturatius cinereo, venâ longitudinali quartâ ante marginem alae abbreviatâ. — Long. corp. $1\frac{7}{8}$ lin., long. al. $1\frac{3}{4}$ lin.

30. *Hilara scrobiculata* nov. sp. ♂ et ♀.

Tota nigra, polline cinereo leviter aspersa, subnitida, nigro-pilosa, alis cinereo-hyalinis, stigmate fusco-nigro, venis nigris; frons aterrima, velutina; vittae ordinariae thoracis subobsolete, laterales singulae ab intermediâ interstitio saturate nigro distinctae, vittae

intermediae partes angustissimae, interstitio interjecto latissimo paulo obscuriore et antice pilis in tres, postice in quatuor series dispositis instructo; halteres nigri.

♂. pili in thoracis dorso mediocres; tibiae anticae posticaeque superne setis aliquot mediocribus instructae, intermediae setis destitutae; metatarsus anticus oblongo-ovatus, superne brevissime tantum pubescens; hypopygium majusculum, clausum vel subclausum.

♀. pili in thoracis dorso breviusculi; tibiae posticae validiusculae sed non incrassatae, adversus apicem paulo distinctius attenuatae, superne setis perpaucis instructae; tibiae reliquae superne setas nullas gerentes.

Long. corp. $1\frac{3}{4}$ lin., long. al. 2 lin.

31. *Hilara cornicula* nov. sp. ♂.

Tota atra, nitida, polline cinereo leviter aspersa, pilis longiusculis nigris vestita; alae subnigrae, basi modice dilutiore, stigmate saturatius nigro; vittae ordinariae thoracis cum interstitiis unicolors; pili interstitiorum rariores, lateralium in seriem subsimplicem, intermedii breviores et in series subquatuor dispositi; tibiae anticae et posticae superne pilis inaequalibus hirtae; metatarsus anticus ovatus, superne praeter pubem brevem pilis aliquot mediocribus instructus; hypopygium majusculum, nitidum, clausum, lamellis apicalibus pilos recurvos nigros gerentibus; halteres nigri. — Long. corp. $1\frac{1}{2}$ lin., long. al. $1\frac{1}{2}$ lin.

32. *Hilara platyura* nov. sp. ♂ et ♀.

Nigra et nigro-pilosa, capite thoraceque totis polline conferto cinereo opacis, abdomine non pollinoso, nitido; alae hyalinae, levissime cinerascens, venis adversus marginem anticum at basim sordide luteis, adversus marginem posticum et apicem nigris, stigmate cinerascens subobsoleto; palpi testacei vel ex testaceo fuscis; thoracis dorsum non vittatum, pilis interstitiorum subbrevibus, lateralium in seriem unicam, intermedii in series quatuor dispositis, setis vero prope margines laterales et posticum longis; pedes pro portione tenues, genibus luteo-testaceis; halteres sordide lutei, capitulo saepe subfusco.

♂. tibiae anticae superne pilis brevibus setisque aliquot longioribus vestitae, postice pilis longioribus inaequalibus hirtae; metatarsus anticus ovato-oblongus, superne pilis brevibus instructus; hypopygium magnum, valde compressum, clausum, superne brevissime nigro-pilosulum.

♀. tibiae anticae et posticae setas aliquot gerentes.
Long. corp. $1\frac{7}{8}$ lin., long. al. $1\frac{3}{4}$ lin.

33. *Hilara eumera* nov. sp. ♂.

Tota nigra exceptis genibus luteo-testaceis, modice nitens, pube brevissimâ vestita; frons atra holosericea; thoracis dorsum obsolete cinereo-pollinosum, vittis et interstitiis concoloribus, horum pilis minutissimis, in intermedio in series duas dispositis; pleurae confertim cinereo-pollinosae; hypopygium parvum, modice compressum, clausum; tibiae anticae superne breviter pilosae et ante apicem pilo longiore munitae; metatarsus anticus valde incrassatus, oblongus, superne breviter pubescens; femora postica valde incrassata, apice infra exciso; halteres nigri; alae nigro-cinereae, venis validis et stigmatibus nigris. — Long. corp. $1\frac{2}{3}$ — $1\frac{3}{4}$ lin., long. al. $1\frac{1}{2}$ lin.

34. *Hilara tetragramma* nov. sp. ♂ et ♀.

Caput, thorax et abdomen tota dilute cinerea et opaca; thoracis dorsum brevissime nigro-pilosulum et vittis quatuor distinctissimis fusco-nigris et opacis pictum; abdomen pallide pilosulum; coxae cinereae, pallide pilosae; pedes nigri, leviter cinereo-pollinosi; halteres pallidi; alae cinereo-hyalinae, venis nigris, in imâ alarum basi testaceis, stigmatibus fusco-nigro.

♂. pedes breviter pilosi, metatarso antico ovato-oblongo, superne brevissime pilosulo; hypopygium cinereum, lamellis superis nigris.

♀. pedes simplices, breviter pilosuli.

Long. corp. $1\frac{5}{6}$ —2 lin., long. al. 2— $2\frac{1}{2}$ lin.

35. *Hilara pubipes* nov. sp. ♂ et ♀.

Praecedenti simillima; mas tamen pedum intermediorum femoribus tibiisque in latere antico, metatarsis superne pilos confertiores et multo longiores gerentibus differit, foemina pilis totius corporis paulo longioribus aegre distinguitur. — Long. corp. 2 lin., long. al. 2— $2\frac{1}{2}$ lin.

36. *Hilara cuneata* nov. sp. ♀.

Corporis formâ ac figurâ *Hilarae flavepidi* Meig. similis, sed fronte aterrimâ, femorum posteriorum apice tibiisque posterioribus praeter basim nigris, cellulâ denique discoidali longius cuneatâ distincta; ab *Hilarâ canescente* Zett. fronte aterrimâ holosericeâ, thorace ab-

domineque minus opacis, ventre pallido et femorum posticorum apice nigro differt. — Long. corp. $1\frac{5}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ lin., long. al. $1\frac{7}{2}$ lin.

37. *Clinocera fallaciosa* nov. sp. ♂ et ♀.

Notis omnibus *Clinocerae lotae* Wlk. proxima, corpore majore, genis paululo latioribus, alarum cellulâ submarginali secundâ modice longiore et stigmatе oblongo minutissime subfusco, tantum in specimenibus minus maturis subobsoleto, diversa; mas hypopygii parte, ex quâ penis nascitur, validiore et parte, cui lamellae terminales insident, multo majore et multo crassiore facilius a mare *Clinocerae lotae* dignoscitur. — Long. corp. 2 — $2\frac{1}{2}$, long. al. $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$ lin.

38. *Psilopus bellus* nov. sp. ♂ et ♀.

Corporis colore alarumque figurâ *Psil. platyptero* Fbr. simillimus, a quo mas articulis tarsorum intermediorum tertio breviorе, quarto toto atro, compresso et valde dilatato differt, foemina vero antennis praeter imam basim nigris et alarum cellulâ posteriore secundâ breviorе facile distinguitur. — Long. corp. $2\frac{1}{2}$ lin., long. al. $2\frac{1}{3}$ — $2\frac{5}{2}$ lin.

39. *Psilopus ludens* nov. sp. ♂.

Figurâ et colore corporis *Psil. lobipedi* Mg. similis, sed tarsorum anticorum articulo paenultimo non lobato, sed simpliciter compresso alarumque venâ transversâ posteriore magis obliquâ distinctus; a *Psil. valido* Lw., cui tarsorum anticorum fabricâ proximus est, magnitudine minore, pilis totius corporis brevioribus et venâ transversâ posteriore etiam obliquiore differt; appendices hypopygii luteae, adversus apicem nigrae. — Long. corp. $2\frac{1}{3}$ — $2\frac{1}{2}$ lin., long. $2\frac{1}{6}$ — $2\frac{1}{4}$ lin.

40. *Oncopygus magnificus* nov. sp. ♂.

Quam *Oncop. distans* Lw. major; alae cinerae, dimidii costalis parte terminali nigrâ, venae tamen longitudinalis tertiae dimidio apicali postice vittâ tenui et aequali albo-hyalinâ limbo. — Long. corp. $2\frac{3}{4}$ lin., long. al. $2\frac{1}{3}$ — $2\frac{5}{2}$ lin.

41. *Sybistroma maerens* nov. sp. ♂ et ♀.

Nigro-viridis, pedibus in utroque sexu simplicibus et totis atris, alis nigricantibus.

♂. antennarum articuli duo primi nigri, tertius brevissimus, luteus, aristâ elongatâ binodotâ instructus.

♀. antennae totae nigrae, aristâ non elongatâ simplice.

Long. corp. $1\frac{3}{4}$ — $1\frac{5}{6}$, long. al. $1\frac{3}{2}$ lin.

42. *Phorostoma adelpha* nov. sp. ♂ et ♀.

Phorostomae trianguliferae Zett. (non Rond.) proxima, sed facie minus carinatâ, antennis totis nigris et articulo terminali longiore instructis, abdomine denique similiter quidem, magis tamen tessellatim picto diversa. — Long. corp. 5—5½ lin., long. al. 4½—4¾ lin.

43. *Phorostoma macrophthalma* nov. sp. ♀.

Colore et picturâ *Phorostomae pectinatae* Meig. similis, sed carinâ faciei minus altâ, antennis longioribus, segmento abdominis secundo macrochaetis destituito tibiisque posticis longius et aequalius ciliatis facile dignota; a *Phorostoma subrotundata* Rond., ad quam proxime accedit, vertice minus confertim piloso, fronte ipsâ et vittâ frontali adversus verticem magis angustatis, sed orbitis albidis portione latioribus differt; praeterea genae angustiores sunt, quam *Phorostomae subrotundatae*. — Long. corp. 4¾—4¾ lin., long. al. 4½ lin.

44. *Echinomyia Brunneri* nov. sp. ♂.

Magna, abdomine quam affinium latiore. Caput totum polline suturate ochraceo vestitum; antennae rufae, articulo tertio late ovato et praeter basim fusco, paenultimo aristae articulo brevi; genae totae pube ochraceâ vestitae, setis nullis instructae; palpi tenues. lutei. Thorax niger, dorso levissime tantum cinereo-pollinoso, nitido; scutellum rufo-piceum. Abdomen latum, praeter vittam nigram piceo-rufum, nitidum, margine antico segmenti tertii latera versus anguste et obsolete lutescente-pollinoso, segmenti quarti dimidio anteriore adversus latera polline dilute lutescente confertius asperso; margo posticus segmentorum primi et secundi singulorum praeter setas laterales in medio abdomine setis, illius quatuor, hujus sex instructus, segmenti tertii totus confertâ setarum serie armatus; setae praeter marginales in segmentis tertio et quarto nullae. Femora nigra, tibiae cum tarsis rufo-piceae. Alae fusco-cinereae, basi tegulisque ochraceis. — Long. corp. 7¼ lin., long. al. 6½ lin.

45. *Strongylogaster pannonicus* nov. sp. ♂.

Niger, nitidus, antennis, palpis pedibusque totis concoloribus, facie abdominisque fasciis tribus interruptis confertius albo-pollinosis, singulis in segmentorum secundi, tertii et quarti basi sitis, humeris pleurisque polline albo minus confertim aspersis; tegulae et alae infuscaetae. A mare *Strongylogastri delicati* Meig., quocum in reliquis notis congruit, corpore duplo longiore, fronte paulo latiore

et alis multo obscurioribus differt. — Long. corp. $2\frac{1}{2}$ lin.; long. al. 2 lin.

46. *Chirosia fallax* nov. sp. ♂.

Nigra, antennis, palpis pedibusque totis concoloribus; vitta frontalis rufa, adversus ocellos rufo-fusca, setis decussatis ab ocellis sat late distantibus instructa; thoracis dorsum polline subfusco adpersum, opacum, vittis distinctis nullis; abdomen polline cinereo opacum, imâ tamen segmentorum singulorum basi nigricante et vittâ latiusculâ nigrâ; hypopygium parvum cinereum; tegulae exalbidae; alae cinereo-hyalinae, costâ basim versus setulis brevibus ciliatâ et spinulam conspicuam gerente; venae longitudinales tertia et quarta apicem versus parallelae, venula transversalis posterior subnormalis et recta. — Long. corp. $1\frac{1}{2}$ lin., long. al. $1\frac{1}{2}$ lin.

47. *Anthomyia triplex* nov. sp. ♂.

Nigra, antennis, palpis pedibusque concoloribus, polline albicante cinerea; oculi subcontigui; frons modice prominens, facies perpendicularis; antennae mediocres, setam breviter sed distincte pilosulam. in imâ basi satis incrassatam gerentes; thoracis dorsum obsolete vittatum; tria ultima abdominis segmenta singula maculis ternis trigonis atris, ad marginem anticum sitis ornata; hypopygium cinereum. Tegulae albae, superior inferiore modice brevior; alae cinereo-hyalinae, spinulâ costali minutâ, venis longitudinalibus tertiâ et quartâ adversus apicem parallelis, venulâ transversâ mediâ in ultimo cellulae discoidalis triente sitâ, posteriore modice tantum obliquâ et rectâ. — Long. corp. $2\frac{1}{2}$ lin., long. al. $2\frac{1}{2}$ lin.

48. *Anthomyia corvina* nov. sp. ♂.

Ex affinibus *Anthomyiae Billbergi* Zett. — Atra, nitida, tota setis longis nigris instructa; caput subtumidum, genis totis et facie albo-pollinosis, oris margine antico reflexo et confertim setoso, fronte pro portione latâ, orbitis frontalibus angustis et nitidis, adversus marginem anticum frontis levissime albo-pollinosis, antennarum brevium articulo terminali subrotundo et setam nudam prope basim valde incrassatam gerente; abdomen cylindricum, modice depressum; pedes validi, valde setosi, unguibus validis pulvillisque magnis instructi; halteres sublutescentes; tegulae minutae, subaequales, exalbidae vel dilutissime flavicantes; alae ex fusco cinerae, adversus basim fuscae et in imâ basi nigrae, venis nigris, longitudinalibus tertiâ et quartâ apicem versus divergentibus, transversâ posteriore rectâ et subnormali, spinâ costali minutissimâ vel nullâ. — Long. corp. $2\frac{5}{6}$ lin., long. al. $2\frac{1}{2}$ lin.

Nota. Foemina, quam *Anthomyia corvinae* esse persuasum habeo, tarsorum anticorum articulis secundo et tertio dilatatis excellit; color alarum, magis luteo-cinereus quam in mare, adversus costam et basim in luteum vergit, in imâ tamen basi niger est; frons paulo tantum latior quam maris.

49. *Homalomyia cothurnata* nov. sp. ♂.

Magnitudine, figurâ et totius corporis picturâ *Homalomyiae armatae* Meig. simillima et tarsorum intermediorum articulo primo infra in imâ basi dente valido ut in hac instructo; tibiae posticae superne setis duabus longis instructae, infra subnudae; tibiae intermediae infra brevius pilosulae quam *Homalomyiae armatae* et praeter trientem basalem modice incrassatae, non dimidio apicali valde incrassato, quale in *Homalomyiâ armatâ* conspicitur. — Long. corp. $1\frac{1}{2}$ — 2 lin.

50. *Homalomyia coracina* nov. sp. ♂.

Tibiarum intermediarum fabricâ *Homalomyiae scalaris* L. proxima, tuberculo tamen, quo infra instructae sunt, longiore et minus alto; praeterea facile distinguitur thoracis dorso vix levissime pollinoso et atro, femoribus intermediis infra aequaliter setosis, non setas in medio femore confertiores gerentibus, tibiis posticis utrinque pilis multo longioribus instructis, alis saturate nigricantibus venisque longitudinalibus tertiâ et quartâ adversus finem accuratius parallelis. — Long. corp. $2\frac{1}{2}$ lin., long. al. 2— $2\frac{1}{2}$ lin.

51. *Homalomyia fasciculata* nov. sp. ♂.

Nigra, pedibus concoloribus, femoribus posticis longis, incurvis et infra prope apicem pilorum longorum nigrorum fasciculo instructis; segmenta abdominalia secundum, tertium et quartum pallide flavicantia, subpellucida, singula triangulo atro ornata; tegulae albiae; halteres pallidi, alae cinerascens. — Long. corp. $2\frac{1}{2}$ lin., long. al. $2\frac{1}{2}$ lin.

52. *Homalomyia obesa* nov. sp. ♂ et ♀.

Nigra; frons maris pro sexu lata, foeminae angusta; thoracis dorsum in mare leviter, in foeminâ confertius cinereo-pollinosum; abdomen quam in congeneribus plerisque minus depressum, aequaliter cinereum, maris vittâ angustâ et aequali nigrâ pictum; maris metasternum spinis duabus rectis instructum et coxae posticae singulae spinâ aduncâ armatae; tibiae maris piceae, anticae nou raro fere totae vel totae nigrae, intermediae plerumque adversus basim nigrae, subsimplices et infra nigro-pilosulae, posticae infra confertim

pilosae; tibiae foeminae piceae vel rufo-piceae, simplices. Halteres et tegulae dilute lutescentes. Alae cinereae, foeminae tamen dilutiores quam maris, basi in utroque sexu luteâ. — Long. corp. $2\frac{7}{8}$ — $2\frac{3}{4}$ lin., long. al. $2\frac{5}{8}$ — $2\frac{7}{8}$ lin.

53. *Aricia pura* nov. sp. ♂.

Cinerea, antennis pedibusque nigris, illarum aristâ longe plumatâ, tegulis niveis, alis totis hyalinis, venis longitudinalibus tertiâ et quartâ adversus apicem divergentibus. Facies tota et frons angusta confertim albo-pollinosae, vittâ hujus lineari nigrâ, prope antennas modice dilatatâ; palpi nigri; oculi hirti. Vittae thoracis ex cinereo nigricantes, intermediae in partes angustae, intervallo lato macrochaetis nullis instructo separatae. Thorales latiores, singulae e maculâ ante suturam et alterâ longiore et magis emicatâ pone suturam sitâ compositae. Scutellum totum cinereum. Abdomen albedo-cinereum, tantum obsolete tessellatum, segmentis intermediis vittâ nigricante ad incisuras interruptâ pictis. Genua extrema rufa; tibiae anticae setas nullas gerentes praeter subapicalem, intermediae praeter setas apicales in latere postico setis tribus vel quatuor armatae. Halteres pallidi. Alarum venae fusco-nigrae, transversalis posterior subrecta et modice obliqua; spinula costalis nulla. — Long. corp. $3\frac{3}{4}$ — $3\frac{5}{8}$ lin., long. al. $3\frac{1}{2}$ lin.

54. *Aricia aculeata* nov. sp. ♂.

Ariciae pallidae Fbr. similis, sed major, oculis brevius pilosis, antennarum articulo tertio toto fusco et setâ breviter pilosâ instructo, tibiis posticis calcare validissimo armatis venisque longitudinalibus secundâ et tertiâ subparallelis facile distincta. Ab *Ariciis* plerisque setâ antennarum non plumatâ sed pilosâ differt, sed reliquis notis iis tam propinqua est, ut alio generi inseri non possit. Long. corp. 3 — $3\frac{1}{2}$ lin., long. al. $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{5}{8}$ lin.

55. *Hydrotaea amoena* nov. sp. ♂.

Atra, nitida, facie et lunulâ frontali cinereis, alis basim versus lutescentibus, imâ tamen basi atrâ, venis longitudinalibus tertiâ et quartâ subparallelis, transversâ posteriore rectâ et subnormali, oculis nudis, tegulis pallidis, halteribus nigris.

♂. Oculi in fronte contigui; thorax et scutellum polline nullo aspersa; abdomen distincte chalybescens, albedo-pollinosum, segmentis paenultimo et antepaenultimo singulis maculâ trigonâ atrâ notatis; femora antica bidentata, intermedia prope apicem infra pilo longissimo instructa; alae quam foeminae magis cinerascens.

♀. Frons atra, opaca, triangulo verticali et marginibus laterali-
bus nitidis; abdominis color ater in chalybeum vix levissime ver-
gens, pollen fere nullum.

Long. corp. $2 - 2\frac{5}{12}$ lin., long. al. $2 - 2\frac{1}{2}$ lin.

56. *Coenosia inornata* nov. sp. ♂ et ♀.

Cinerea, seta antennarum longissime plumata, vittâ frontis la-
tissimae antice rufâ, abdomine maris vittâ nigro-fuscâ picto, foemi-
nae unicolore, pedibus testaceis; femoribus tamen anticis praeter api-
cem tarsisque omnibus nigris, alis spinulâ costali et venâ longitu-
dinali sextâ in marginem alae excurrente instructis. — Long. corp.
 $2 - 3$ lin., long. al. $1\frac{7}{12} - 2\frac{1}{2}$ lin.

57. *Blepharoptera brachypterna* nov. sp. ♂.

Cinerea, duobus primis antennarum articulis, capite praeter ver-
ticem et praeter superius occipitis dimidium, abdomine pedibusque
rufis, tarsis fuscis, primo tamen posticorum articulo dilutiore et
mire abbreviato; ultimus antennarum articulus niger, arista conco-
lor subtilis, articulo tamen primo et imâ secundi basi incrassatis;
setae mystacinae utrinque binae; pleurarum dimidium inferius praeter
pilos ordinarios pube nullâ vestitum; alarum costa distincte se-
tosa, venae transversales colore obscuriore nullo limbatae. — Long.
corp. $2\frac{1}{2}$ lin., long. al. $2\frac{7}{12} - 2\frac{2}{3}$ lin.

58. *Ortalis levigata* nov. sp. ♂.

Totius corporis fabricâ et colore *Ort. ruficipiti* Fbr. simillima,
vittis tamen dorsalibus thoracis postice non abbreviatis, sed integris
et picturâ alarum paulo diversâ, vittulâ nempe subbasali latiore ma-
gisque normaliter demissâ et maculâ apicali, ubi incipit, inde a costâ
usque in cellulam posteriorem primam dilatatâ, ita ut alae similiter
atque in *Ort. gratâ* Lw. pictae sint. — Long. corp. $2\frac{2}{3}$ lin., long.
al. $2\frac{1}{2} - 3$ lin.

59. *Ortalis Kowarzii* nov. sp. ♂.

Cinerea, pedibus nigris, thorace subtiliter nigro-punctulato et
pilis quam in reliquis speciebus longioribus hirto, ita ut inter *Or-
talides* et *Trichonotas* quasi intermedia sit; alarum figura et venae
Ortalidis verae sunt, pictura vero nigro-fusca similis est *Pteropoe-
ciliae lamed* Schrk., paenultimo tamen venae quartae segmento late
fusco-limbato et paenultimo quintae praeter basim et apicem limbo
fusco destitutum. — Long. corp. $2\frac{3}{4}$ lin., long. al. $3\frac{1}{12} - 3\frac{1}{6}$ lin.

60. *Lonchaea inaequalis* nov. sp. ♂.

Nitida, nigra, pedibus totis halterumque capitulo concoloribus; tertius antennarum articulus rotundato-ovatus; ultimum abdominis segmentum permagnum, praecedentibus simul sumtis subaequale; tegulae exalbidae; alae hyalinae, in speciminibus maturis dilutissime lutescentes. venis paulo saturatius luteis. longitudinalibus secundâ et tertiâ quam in speciebus plerisque minus divergentibus. — Long. corp. $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ lin., long. al. $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{2}{3}$ lin.

61. *Sapromyza tetrachaeta* nov. sp. ♀.

Lutea, antennis, palpis pedibusque totis concoloribus, setâ antennarum plumatâ, tertio abdominis segmento mire abbreviato et in margine postico utrinque setis binis validissimis instructo. — Long. corp. $1\frac{2}{3}$ lin., long. al. $1\frac{5}{6}$ lin.

62. *Athyroglossa nudiuscula* nov. sp. ♂.

Athyroglossae glabrae Meig. simillima, sed setae antennalis radiis pluribus longioribusque, setis verticis et scutelli brevioribus, halteribus denique dilute luteis bene distincta. — Long. corp. $1\frac{1}{6}$ lin., long. al. 1 lin.

63. *Drosophila rufifrons* nov. sp. ♂ et ♀.

Drosophilae obscurae Fall. similis, sed colore frontis saturatissime rufo adversus margines laterales et anticum saepe in atrum vergente, thorace minus opaco et abdomine magis nitente, alis proportionem brevioribus et venis transversis intervallo minore separatis, tarsis denique anticis maris simplicibus distincta. — Long. corp. $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{3}$ lin., long. al. $1\frac{1}{6}$ — $1\frac{1}{4}$ lin.

64. *Scyphella latifrons* nov. sp. ♀.

Pallidissime flavescens, opaca, fronte praeter margines laterales et antennis luteis, vittis dorsalibus thoracis tribus cinereis, lateraliibus interruptis, metanoto nigro, abdomine praeter segmentorum singulorum margines laterales et posticum fusco, extremo tarsorum omnium articulo dilute subfusco; alae hyalinae, venis dilute lutescentibus, longitudinalibus secundâ et tertiâ apicem versus quam in congeneribus magis convergentibus, tertiâ in summam alae apicem excurrente et cum quartâ parallelâ, venâ transversali mediâ in ultimo cellulae discoidalis triente collocatâ. — Long. corp. $\frac{7}{2}$ — $\frac{2}{3}$ lin., long. al. $\frac{3}{4}$ — $\frac{5}{6}$ lin.

65. *Dicraeus obscurus* nov. sp. ♀.

Ater nitidus; caput concolor, frontis dimidio anteriore rufo, facie et genis luteis; triangulum ocellare majusculum, subaequilaterale, atrum, nitidum; antennae breves ex luteo rufae, articuli tertii margine et latere exteriori nigro-fuscis vel nigris. Oculi majusculi, rotundati; genae mediocres; facies paulo recedens; scutellum convexum; pedes nigri. femorum apice, tibiis anterioribus maximâ ex parte vel totis, posticarum apice, tarsis denique rufis, his tamen adversus apicem nigro-fuscis; halteres lutei; alae subhyalinae, colore cinereo, adversus costam saturatiore tinctae; venae nigrae, longitudinales tertiâ et quartâ adversus apicem parallelae, costalis in alae apice inter longitudinales tertiam et quartam deliquescens. — Long. corp. 1—1 $\frac{1}{6}$ lin., long. al. 1 $\frac{1}{4}$ —1 $\frac{1}{3}$ lin.

Nota. *Dicraeus*, novum *Oscinidarum* genus *Elliponeuræ* proximum, a reliquis hujus faemiliae generibus adhuc cognitis venâ transversali posteriore nullâ distinguitur; ab *Elliponeurâ* differt venis longitudinalibus secundâ et tertiâ non recurvis sed rectis, tertiâ et quartâ adversus apicem non divergentibus sed parallelis, segmentis costae secundo et tertio non subaequalibus, sed illo quadruplicem hujus longitudinem adaequante.

66. *Oscinis (Siphonella) quinquangula* nov. sp. ♀.

Atra, modice nitens, coxis anticis pedibusque omnibus flavis, femoribus tamen posterioribus praeter trientem apicalem atris et tibiaram posticarum annulo obsoleto tarsorumque apice fuscis; caput atrum; frons lata, triangulo ocellari magno, subtiliter punctulato, quam reliqua frons vix magis nitente; antennae nigrae, articulo tertio permagno, subsecuriformi, basim versus infra rufo; seta antennalis breviuscula, tenuis, adversus basim non incrassata, nigricans; facies brevis, sub antennis excavata, adversus oris marginem valde projecta; genae augustae, albido-pollinosae; palpi lineares, pallide flavi; proboscis geniculata, fusca; thoracis dorsum subtiliter punctulatum, polline dilute fusco vix levissime aspersum; scutelli margo setulis sex rigidis nigris instructus; halteres nigri; alae pure hyalinae; vena longitudinalis secunda perbrevis, ita ut primum costae segmentum sesquialteram secundi longitudinem paulo excedat, tertium duplicem ejus longitudinem aequiparet; basis venae longitudinalis tertiae a secundae basi latius distat, quam in speciebus reliquis, ita ut cellula basalis prima figurâ quinquangulatâ excellat; vena transversalis media obliqua, posterior etiam obliquior et brevis; cellula submarginalis latissima; venae longitudinales tertia et

quarta parallelae, late inter se distantes. — Long. corp. 1 lin., long. al. 1 lin.

67. *Agromyza trivittata* nov. sp. ♂.

Flava, fronte antennisque praeter marginem articuli tertii sub-fuscum luteis, vittis thoracis tribus subconfluentibus et metanoto nigris, abdomine subnitido fusco-nigro, segmentorum tamen singulorum margine postico flavo, terebrâ crassâ atrâ; pedes flavo et fusco variegati, posteriores praeter genna fere toti fusci; halteres albidii; alae cinerae, venâ costali paulo ultra longitudinalem tertiam pertinente, longitudinali quartâ pone apicem alae excurrente, cellulâ discoidali brevissimâ, basali secundâ nullâ. — Long. corp. $1\frac{1}{6}$ — $1\frac{1}{4}$ lin., long. al. $1\frac{5}{12}$ — $1\frac{1}{2}$ lin.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1873

Band/Volume: [17](#)

Autor(en)/Author(s): Loew Hermann

Artikel/Article: [Diptera nova, in Pannonia inferiori et in confinibus Daciae regionibus a Ferd. Kowarzio capta. 33-52](#)

