

Tapinopterus aetolicus nov. spec.

Tap. thessalico Reitt. *simillimus*, differt ab hoc capite multo crassiore, antennis fortioribus et longioribus et forcipite latiore, apicem versus haud angustato.

♂ segmento ventrali ultimo apice utrinque puncto setigero unico, ♀ punctis duobus instructo. — Long. 16—18 mill.

Koraxgebirge.

Von *Tapinopterus thessalicus* Reitt. (Wien. Ent. Zeit. 1886, 173) vom Ossa nur durch viel größeren und dickeren Kopf, viel längere, den Hinterrand des Halsschildes auch beim ♀ weit überragende Fühler und durch die Form des Forceps verschieden. *Tap. thessalicus* ist nach einem einzelnen ♂ beschrieben. Bei demselben ist der Forceps weniger breit und gegen die Spitze schwach, aber deutlich verschmälert; bei *Tap. aetolicus* ist der Forceps breiter und gegen die Spitze gar nicht verschmälert, also vollkommen gleichbreit und daher an der Spitze selbst viel breiter abgestutzt abgerundet als bei *thessalicus*.

Von *Tap. protensus* unterscheidet sich *aetolicus* durch kürzeren und breiteren Halsschild, viel kürzere Flügeldecken und sehr spärliche und schwache Punktirung an den Seiten der Hinterbrust und der vorderen Ventralsegmente. Scutellarstreifen in der Regel rudimentär oder ganz fehlend, bei einzelnen Stücken aber wohl ausgebildet.

L. Ganglbauer.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [1889](#)

Autor(en)/Author(s): Ganglbauer Ludwig

Artikel/Article: [Tapinopterus aetolicus nov. spec. 126](#)