

Pseudolimnaeum Eichhoffi Krtz. = *inustum* Duval (*Bemb.*)

Hr. v. Heyden hat in seinem *Limnaeum inustum* Duval (1857) mein *Pseudolimnaeum Eichhoffi* (Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 365) und ich glaube mit Recht erkannt. Duval erwähnt zwar in seiner Beschreibung Annales de France 1857, p. 103 (nicht 163, wie der neueste de Marseul'sche Catalog angiebt) den starken Kopfpunkt nicht, doch überwiegen die übereinstimmenden Punkte in seiner Beschreibung. Auch Duval hebt bereits den eigenthümlichen Habitus des Käfers hervor, indem er a. a. O. sagt: „son facies est assez remarquable et lui donne quelque ressemblance éloignée avec les Stomis“. Später ist der Käfer bei *Limnaeum* eingereiht worden ¹⁾. Hr. v. Heyden hält die Gattung *Pseudolimnaeum* für begründet. Merkwürdig ist, daß Hr. v. Heyden den Käfer ebenfalls an einem Hause bei Montreux fand; das typische Stück des *inustum* stammt aus den Piemonteser Alpen.

Dr. G. Kraatz.

¹⁾ Vergl. die Bemerkung von Baudi über *Bemb. inustum* in der Berliner entomol. Zeitschr. 1864, p. 219: „a *Bembidio discedit tarsorum anticorum articulis duobus primis in mare apice intus in dentem acutum porrectis nec non palporum maxillarium interiorum articulo secundo primo longiore; Bembidium inustum potius Lymnaeo generi adscribendum“ etc. Die *Limnaeum* sind aber Küstenbewohner, *Pseudolimnaeum* scheint dagegen ein verkappter Hausfreund zu sein. Piochard de la Brûlerie bespricht ein bei Rueil von Hrn. Montagné im Fluge gefangenes Ex. und nennt es une des acquisitions les plus intéressantes pour la faune parisienne; er fügt hinzu: elle doit vivre habituellement dans une retraite bien cachée, pour avoir si longtemps échappé aux investigations des entomologistes parisiens (Annales de France 1875, p. CXI). Es sind mehrere Ex. des *Ps. inustum* von Hrn. Oberförster Eichhoff unter einem Brette im Keller seines Hauses in Mühlhausen (nicht in Saarlouis, wie ich früher irrig angegeben hatte) gefunden worden, so daß das Vorkommen des Käfers daselbst durchaus kein zufälliges zu sein scheint.*

Nach Mittheilung des Hrn. Ganglbauer kommt *Peryphus inustus* auch in der Krimm vor und *Bemb. Lederi* Reitt. (? *longicolle* Motsch.) scheint davon kaum generisch zu trennen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [1889](#)

Autor(en)/Author(s): Kraatz Gustav

Artikel/Article: [Pseudolimnaeum Eichhoffi Krtz. = inustum Duval \(Bemb.\) 395](#)