

4'' Kopf und Halsschild lang greis behaart; auch die Flügeldecken, obzwar mit kürzerer, so doch deutlich aufstehender Behaarung. Südrufsland, Kaukasus.

*pollinosa* Kryn.

4' Kopf und Halsschild nur kurz, die Flügeldecken sehr kurz gelb behaart, die Behaarung der letzteren wie immer nur spärlich und wenig über die Schuppen hinausragend. Im Uebrigen mit *H. farinosa* übereinstimmend und nur ♀ bekannt. Südcroatien . . . . . *farinosa*, v. *fissa* m.

3' Die Beine und die Brust spärlich und kurz, wenig auffällig behaart. Beine in beiden Geschlechtern rothgelb. Die spärliche Behaarung der Oberseite äußerst kurz und auf Halsschild und Flügeldecken gleichmäfsig. Banat. Bisher mit *H. flavipes* Germ. verwechselt <sup>1)</sup>. . . . . *dilutipes* n. sp.

---

1) Nach Burmeister hat das ♂ der *H. flavipes* einfache, das ♀ gespaltene Klauen an den Hinterfüfsen. Ich finde die dalmatinischen *flavipes* in beiden Geschlechtern mit einfachen, die Banater hingegen mit gespaltenen Klauen.

---

## Uebersicht der bekannten kaukasischen *Deltomerus*-Arten.

Von

*Edm. Reitter* in Mödling bei Wien.

---

- 1'' Der 3., 5. und 7. Zwischenraum auf den Flügeldecken mit einer Reihe gröfserer Punkte besetzt. Beine roth. Central-Kaukasus. *D. triseriatus* Putz. . . . . *fulvipes* Motsch.
- 1' Gewöhnlich nur der 3., seltener auch der 5. Zwischenraum mit einer gröfseren Punktreihe.
- 2'' Halsschild etwas länger als breit, schwach herzförmig, an der Basis schwach eingeschnürt, Seitenrand sehr schmal abgesetzt und aufgebogen. Schläfen viel länger als der Durchmesser der Augen.
- 3'' Beine zum gröfsten Theile oder ganz roth.

- 4'' Kopf lang und fast von der Breite des Halsschildes, Augen aus der Wölbung des Kopfes sehr wenig vorragend. Beine ganz roth. Schmale, langgestreckte rothbraune Art. Central-Kaukasus. *D. Raddei* Putz. . . . . *elegans* Chaud.
- 4' Kopf dicker, schmaler als der Halsschild, Augen stark vortretend, Beine dunkel, Schenkel roth. Oberseite am Grunde mit Spuren dichter äusserst feiner Punktirung. Swanetien. *tibialis* Reitt.
- 3' Fühler und Beine schwarz. Grofse, langgestreckte Art. Central-Kaukasus . . . . . *elongatus* Dej.
- 2' Halsschild fast etwas breiter als lang, stark herzförmig, an der Basis stark eingeschnürt und gerade, Seitenrand breiter abgesetzt und stark aufgebogen. Kopf dicker, viel schmaler als der Halsschild, Flügeldecken kürzer, breiter und regelmäfsiger oval. Gedrungene Arten, mit am Grunde sehr fein punktulirter Oberseite.
- 5'' Schläfen länger als der Durchmesser der Augen. Beine roth. Dritter Zwischenraum der Streifen auf den Flügeldecken mit einer Punktreihe, der 5. vorn selten mit einigen gröfseren Punkten. Circassien. Zwischen *tibialis* und *pseudoplatynus* in der Mitte stehend . *circassicus* Reitt.
- 5' Schläfen nur so lang als der Durchmesser der Augen. Kopf kurz und dick. Beine schwarz. (Schwarze Arten.)
- 6'' Oberseite des Körpers schwer sichtbar, weitläufig punktulirt; nur der 3. Zwischenraum der Punktstreifen auf den Flügeldecken mit einer Reihe gröfserer Punkte. Gröfsere Art. Nördliches, armenisches Gebirge. *D. dubius* Chd.? *validus* Chaud.
- 6' Oberseite des Körpers dicht und deutlich punktulirt; der 3. und 5. Zwischenraum der Punktstreifen auf den Flügeldecken mit einer Reihe gröfserer Punkte. Kleinere Art. Circassien . . . . . *pseudoplatynus* Reitt.
-

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1890

Band/Volume: [1890](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Uebersicht der bekannten kaukasischen Deltomerus - Arten. 383-384](#)