

Interessante persische *Coleoptera*.

Mitgetheilt von

Major z. D. Dr. L. von Heyden.

Durch Dr. Staudinger erhielt ich in letzter Zeit wieder eine Anzahl recht interessanter Käfer aus verschiedenen Theilen Persiens, deren Aufzählung ich hier folgen lasse.

1. Von Salmas: Die ausgezeichnete, weiter verbreitete Art, aber stets nur nach einzelnen, unter sich variablen Stücken, ist bereits dreimal beschrieben, nämlich als *Ancylochira Salomonii* Thoms. [*Davidis* Fairm., *Nikolskyi* Semen.¹⁾]. James Thomson beschrieb sie zuerst in *Typi Buprestidarum* 1878, p. 40. Da das Werkchen weniger verbreitet ist, so gebe ich hier diese erste Beschreibung: *A. Salomonii* Thms. (nicht *Salamoni*, wie im neuen Catalog). *Patria Persia*. Long. 21 mill., lat. 8 mill. *Obscure viridi-metallica, maculis vel fasciis flavis tecta; prothorace fasciis 3 longitudinalibus ornato. Ampla. Obscure viridi-metallica, maculis vel fasciis flavis tecta. Caput inter oculos maculis 2 minoribus ornatum; mandibulae basi maculatae; antennae obscure virides. Prothorax fasciis 3 longitudinalibus (2 externis latissimis medio disruptis) ornata minute et sat sparsim punctata. Elytra maculis 6 magnis scilicet: 2 humeralibus, subrotundatis medio disruptis, 2 post mediis subtransversis et 2 ante posticis subrotundatis, ornata, longitudinaliter 16-striato-punctata, punctis minutis, apice biacuta. Corpus subtus maculis tectum, tenue punctatum. Abdomen seriebus longitud. 4 maculorum ornata, scilicet maculis 20 ornatum. Femora singula subtus longe maculata.* — Voisine de l'*A. hilaris* Klug, mais beaucoup plus espacée et 3 bandes longitudinales; les élytres offrent 6 grandes taches seulement, et le dessous du corps est tout autrement maculé. Espèce des plus distinctes.

Fairmaire beschreibt (Ann. Fr. 1884, p. 168) dieselbe Art von Akbes in Syrien als *Davidis*. — Die Angabe der Flecken weicht etwas von der oben angegebenen Beschreibung ab: „*elytrorum maculis utrinque 3 flavis, 1^a magna basin (sutura excepta) occupante, prope humeros macula atro-cyaneo signata, 2^a post medium trans-*

¹⁾ Schon Ritter zieht, Wien. E. Z. 1889, p. 231, die 3 Arten zusammen. Er erhielt sie aus Ordubad am Araxes.

versa, marginem attingente, 3^a que ante apicali triangulari flavis.“
Die Zeichnung der Unterseite ist bei Fairmaire genau angegeben.

Während des Druckes erhielt ich Heft 9, 1891, Rev. d'Ent., worin Abeille de Perrin p. 260 eine Var. *metallescens* ♂ ♀ der *A. Davidis* von Monts Amanus (Haute Syrie) beschreibt, bei der die gelben Zeichnungen zurücktreten; die mittlere Thoraxbinde fehlt, auf den Fld. ist nur ein Humeralfleck.

Im Bull. Moscou 1888, p. 682 (Citat im Cat. Col. Eur. nachzutragen) beschreibt Semenow die Art als *Buprestis Nikolskii* vom Aral-See. Die 3 Binden des Halsschildes sind vollständig. Von der Farbe der Decken sagt Semenow: „La couleur dominante est le jaune . . . ; ce n'est que l'espace entre la suture et la 2^{me} strie, une tache allongée d'une forme irrégulière, située après l'épaule, une large bande transversale, située au milieu de l'élytre et fortement dilatée vers le bord latéral, une fascie transversale en zigzag au-delà du milieu et enfin le bout de l'élytre qui sont d'un vert bleuâtre plus foncé que sur la tête et le pronotum, mais bien plus claire et plus vif que dans la *flavopunctata*.“

Mit der ausführlichen Beschreibung Semenow's stimmt das mir vorliegende Exemplar vollkommen überein.

2. Von Edgin: *Malacosoma collaris* Humm. var. *flavipes* Heyden. *Leptura bitliensis* Chev. — *Cyamophthalmus moesiacus* Friv. — *Dorcadion Mniszecki* Kraatz.

3. Von Eibes: *Onthophagus furciceps* Marseul (Abeille VI, 1870 juin, 379). Marseul beschreibt die Art nach einem ♂ von Bekaà. Mir liegt ebenfalls nur ein ♂ vor, das in die Nähe von *Camelus* zu stellen und durch die Form der Kopflamelle sehr ausgezeichnet ist. Diese aufrechtstehende Lamelle geht von den Augen aus, ist seitlich stark eingeschnürt, erweitert sich dann beiderseits nach aussen, wo sie in lange, an der Spitze abgerundete  Zacken auslaufen, die sehr wenig convergiren; zwischen diesen Zacken oben in der Mitte kaum ausgerandet, genau in der Mitte einer Verdickung. Vor dieser Lamelle befindet sich eine gebogene scharfe Leiste.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [1892](#)

Autor(en)/Author(s): Heyden Lucas [Lukas] Friedrich Julius Dominicus von

Artikel/Article: [Interessante persische Coleoptera. 111-112](#)