

Fast cylindrisch, aber nur mäfsig gewölbt, kurz und sehr dicht grau behaart, verschossen bräunlich gelb, matt, die vertiefte Mittellinie der Stirn über den Fühlern, Spitze der Mandibeln und das Schildchen schwarz, ebenso drei Flecke, die in einer Querreihe in der Mitte des Halssch. stehen. Der Mittelfleck fehlt öfter. Stirn breit, ziemlich gewölbt. Fühler etwas länger als die Hälfte des Körpers, dünn, nach der Spitze deutlich verschmälert, Glied 2 kurz, 3 länger als 2, 4 länger als 3, so lang als 1, 5 bis 8 allmählich ein wenig verkürzt, die letzten 3 dünner und kürzer als die vorhergehenden. Halssch. $2\frac{1}{2}$ mal so breit als lang, an den Seiten leicht gerundet und nach vorn etwas verengt, sparsamer punktirt als die Fld. und glänzender als diese, hinter dem Vorderrande ein bogenförmiger Quereindruck mehr oder weniger vertieft. Fld. äußerst dicht und ziemlich fein punktirt, zuweilen mit Spuren einiger schmaler Längsrippen. Beim ♂ ist das erste Tarsenglied an den 4 Vorderbeinen erweitert, namentlich am ersten Paare sehr groß, der letzte Bauchring hat eine tiefe, dreieckige Grube.

Chrysomelen aus dem hohen Caucasus.

Auch in diesem Jahre sammelte Herr Rost wieder einige Monate im Caucasus, namentlich in solchen Gegenden, die seither wenig besucht waren, z. B. Abchasien. Er fand unter Steinen mehrere *Chrysomela*-Arten, theils mit *rufa*, theils mit *hemisphaerica* nahe verwandt, die sich auf folgende Art übersehen lassen:

- 1 Seitenwulst des Halssch. niedrig, ziemlich schmal, innen nur durch einen stärker punktirten Längsstreifen oder durch einen leicht vertieften Längseindruck abgesetzt 2.
- 1' Seitenwulst ziemlich dick, hinten durch einen rinnenförmigen Eindruck scharf begrenzt 3.
- 2 Neben dem Seitenwulste des Halssch. ein grob punktirter Längsstreifen, Fld. mit 9 Punktreihen, die inneren drei fein, die äußeren stärker und einander paarig genähert. Oben lebhaft metallisch kupferroth, mit bläulichem Anfluge, oder düster kupferig *abchastica* 1).

1) *Chr. abchastica*: *Subaptera, fere parallela, convexa, subtus rufo-picea, supra purpureo-cuprea, prothorace lato, crebre subtilis-*

- 2' Seitenwulst innen durch eine schwache Längsvertiefung abgesetzt, die kaum stärker als die Scheibe punktirt ist. Oben rothbraun, wie *rufa*, oder lebhaft kupferig roth, zuweilen bläulich schimmernd *porphyrea* Fald.
- 3 Sehr kurz und breit eiförmig, stark gerundet und gewölbt, der rinnenförmige Eindruck an der Basis des Halssch. jederseits kurz, gerade. Metallisch kupferroth, leicht grünlich überflogen (*caucasica* Ws. olim) *caspica* Ws.
- 3' Länglich-eiförmig, an den Seiten wenig gerundet, der rinnenförmige Eindruck an der Basis des Halssch. jederseits lang, vorn nach innen gebogen 4.
- 4 Mäfsig gewölbt, Fühler rostroth, Halssch. dicht, fein und tief punktirt, der Seitenwulst vorn durch eine schwache Vertiefung abgesetzt *Rosti* ¹⁾.
- 4' Ziemlich stark gewölbt, Fühler pechschwarz, die ersten und letzten Glieder heller. Halssch. seicht punktirt, der Seitenwulst vor der Mitte durch eine längliche Grube begrenzt *fuscicornis* ²⁾.

sime punctulato, antice rotundato-angustato, callo laterali fere nullo, laevi, impressione obsoletissima fortius punctata terminato; elytris seriatim punctatis, seriebus 3 interioribus sat tenuibus, exterioribus 6 fortiter punctatis perparia approximatis, interstitiis parce punctulatis. — Long. 5—6 mill.

¹⁾ *Chr. Rosti*: Subaptera, ovalis, modice convexa, subtus ferruginea, supra purpureo-cuprea, antennis ferrugineis, prothorace brevi basi coleopteris haud angustiore, crebre et profunde subruguloso-punctulato, lateribus antrorsum rotundatim paulo angustatis, callo laterali incrassato sublaevi, postice plica profunda subcurvata, antice impressione obsoleta, rugoso punctata terminato; elytris lateribus minus rotundatis, crebre subseriatim punctatis, interstitiis punctulatis. — Long. 5—6 mill.

Variat supra obscure cuprea, viridi micans.

²⁾ *Chr. fuscicornis*: Subaptera, ovalis, convexa, picea, supra cupreo-violacea, prothorace brevi, crebre subtilissime punctulato, antrorsum angustato, lateribus sat rotundatis, callo laterali crasso, sublaevi, postice plica profunda subcurvata, antice fovea elongata terminato, elytris crebre subseriatim punctatis, interstitiis paulo subtilius punctatis. — Long. 5.5—7.5 mill. J. Weise.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [1892](#)

Autor(en)/Author(s): Weise Julius

Artikel/Article: [Chrysomelen aus dem hohen Caucasus. 405-406](#)