

Ueber abnorm gefärbte Stücke von *Plateumaris sericea* Linn. Weise (*Donacia*).

Von

Wilh. Paulcke in Baden-Baden.

Von dieser durch Farbenvarietäten ausgezeichneten Art fand ich im Frühjahr 1891 zwei interessante und auffallende Stücke.

Grundfärbung bei beiden ist ein intensives Blau (wie Var. a. *festucae* Fabr.).

Bei dem ersten Stück ist die linke Flügeldecke jedoch violett mit schmalem blauen Rande, die rechte blau mit schmalem violetten Rande.

Das zweite Stück zeigt die Farbencontraste noch deutlicher und schöner ausgeprägt.

Grundfarbe ist ein schönes Blau, aber die rechte Flügeldecke ist rothgolden (wie Var. d: *nymphaeae* Fabr.) und hat einen blauen Rand. Punktreihe 1, 3, 5 und 6 derselben Flügeldecke sind stellenweise goldgrün.

Die anormale Färbung reicht bei beiden von der Naht bis Punktreihe 6 incl.

Die Farben sind scharf von einander getrennt, ohne jegliche Verwaschungen. Beide Thiere sind Männchen. Das zweite Stück fand ich in Copula mit der Stammform.

Außerdem fand ich in Copula:

Var. a ♂ mit Stammform ♀.

Var. a ♂ mit Var. d ♀.

Var. b ♂ mit Stammform ♀.

Var. c ♂ mit Stammform ♀.

Stammform ♂ mit Var. d ♀.

Fundort: An den Altwässern des Rheines bei Baden-Baden.

Druckfehler-Berichtigungen.

- S. 148, Zeile 9 von oben lies: Unterseite, statt: Untersuchung.
- 170, - 8 - - - corollenf. - corallenförmig.
- 205, - 5 - - - nochmals - manchmal.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [1892](#)

Autor(en)/Author(s): Paulcke Wilhelm

Artikel/Article: [Ueber abnorm gefärbte Stücke von Plateumaris sericea Linn. Weise \(Donacia\). 416](#)