

Elater punctatus Schwarz nov. spec.

Subparallelus, atcr, parum nitidus, supra nigro-pubescens; prothorace latitudine sublongiore, confertim punctis umbilicatis adperso, canaliculato; elytris prothorace haud latioribus, ultra medium parallelis, coccineis, immaculatis, striatis, striis punctis fuscis; tarsi brunneis. — Long. 9—11 mill., lat. $2\frac{1}{2}$ —3 mill. Hoch-Armenien.

Schwarz, ziemlich matt, die Flügeldecken einfarbig scharlachroth, die Oberseite schwärzlich, die Unterseite mehr grau behaart. Das Halsschild ist reichlich so lang wie breit, überall stark und narbig, an den Seiten und vorn sehr dicht, nur auf dem Rücken nahe der Basis etwas weniger dicht punktirt, mit einer an der Basis sehr deutlichen Mittelrinne, die sich, allmählich schwächer werdend, bis nahe zum Vorderrande hinzieht. Die Seitenstücke der Vorderbrust sind einfach, feiner und weniger dicht punktirt als die Oberseite. Die Fld. sind nicht breiter als das Halssch., und bis hinter die Mitte gleichbreit, die Punkte in den Streifen geschwärzt.

Dem *Elater praeustus* F. nahe verwandt, aber noch etwas schlanker und durch die sehr starke und narbige Punktirung und die fast durchlaufende Mittellinie des Halssch. von ihm unterschieden.

Mehrere übereinstimmende Ex. aus Hoch-Armenien.

Otto Schwarz.

Adelocera Kraatzii Schwarz nov. spec.

Angusta, rufo-ferruginea, subnitida, pilis subsquamiformibus fulvis minus dense vestita; antennis longioribus; prothorace elongato, parum convexo, lateribus parallelo, basi obsolete impresso, sat crebre punctato; elytris prothorace latioribus, ultra medium parallelis, dorso depressis, punctatis, obsolete striatis. — Long. 7 mill., lat. $1\frac{1}{2}$ mill. Jerusalem.

Einfarbig braunroth; die verhältnißmäfsig langen Fühler erreichen die Basis der Fld.; das schlanke Halssch. ist ungefähr $1\frac{1}{2}$ mal so lang als breit, an den Seiten gerade und parallel, nach der Basis zu fast etwas verschmälert, vor den Hinterecken schwach eingedrückt, nicht sehr dicht, aber ziemlich stark punktirt und nur an der Basis mit schwach angedeuteter Mittelrinne. Der Käfer erinnert an *Dilobitarsus* Latr.

Von Dr. E. Leuthner in Jerusalem (l. 3. 85) gesammelt; mitgetheilt von Hrn. Dr. Kraatz.

Otto Schwarz.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1893

Band/Volume: [1893](#)

Autor(en)/Author(s): Schwarz Otto Carl Ernst

Artikel/Article: [Adelocera Kraatzi Schwarz nov. spec. 192](#)