© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Zwei neue Varietäten der *Anochilia rufipes* Kraatz aus Madagascar.

Von

Prof. Dr. *G. Schoch* (Fluntern-Zürich).

Die beiden Varietäten der sehr veränderlichen *Anochilia rufipes* Kraatz[1]) wurden mir ebenfalls von Herrn Sikora zugesendet und muthmafslich bei Annanarivo gesammelt. Die eine ist der var. *nigripes* ähnlich, hat aber eine rothe Querbinde über der Mitte der Fld., die andere ist der var. *dilutipennis* ähnlich, hat aber keine schwarzen Flecken auf dem Thorax.

Anochilia nigriceps Waterh. Ent. mont. Mag. XV, p. 85. — Long. 20 mill., lat. 11 mill.

Colore multo varians, tota nigra vel brunnea vel brunneo-nigro-variegata. Caput et prothorax niger seu brunneus, seu vittis longitudinalibus rubidis vel nigris, vittae rufae, si adsunt, semper medianae et marginales. Infra opaca, variatione femoribus tibiisque atris seu rufis. Prothorax ante scutellum sensim emarginatus.

Anochilia rufipes var. *signata.* Long. 18 mill., lat. 10 mill.

Anochiliae rufipes Krtz. var. *plagiatae* Krtz. *similis. Caput nigrum, clypeo punctato. Prothorax niger, undique subtiliter punctulatus, in medio angulatus, postice marginibus convergentibus, margine posteriore fere recto. Elytra juxta humeros valde excisa, in series grosse cribrato-punctata, postice subrotundata, nigra cum fascia lata rufa transversali in partem anteriorem, suturam superante sed marginem externam non attingente. Pygidium laeve, subtus atrum femoribus anticis longe rufociliatis. In utroque sexu tibiae ant. acute tridentatae, posteriores externe unidentatae, tarsi breviores. Abdomen maris impressum et ejus segmenta vittis tenuibus albidis ornata, quae feminae desunt.* — Madagascar, Annanarivo.

Anochilia bipunctata (*rufipedis* var. *dilutipennis* var.). Long. 20 mill., lat. 10 mill.

Supra rufo-testacea, elytris maculis nigris duabus in medio sitis. Capite rufo. Prothorax totus rufus, micans, in disco subtilissime, margines versus grosse punctatus, lateribus marginatis, in medio angulatis, retro-attenuatis, ante scutellum paullo exsisus. Elytra punctis grossis, rugulosis seriatim impressa, post humeros

---

[1]) Wiener Entomol. Zeitung 1893, p. 149.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

profunde emarginata, rufotestacea, in mediam vitta pallida obsoleta transversa et post illam macula rotundata discoidali ornata, apice rotundata. Pygidium grosse punctatum. Subtus nigro-picea, abdominis segmenta fulvociliata, margine posteriori brunnea. Pedes brunnei, femoribus ciliatis. Tibiarum dentes ut in specie praecedenti. Madagascar, Annanarivo.

Lomaptera Giesbersi Kraatz nov. spec.

Lom. Gilnickii Kraatz *similis et affinis, sed minus metalliconitens, elytrorum basi nigricante Ischiosophae lucivoraci similis sed hac specie minor, elytris apicem versus minus attenuatis quam in L. Gilnickii* Kr., *laete viridis, thorace parce subtiliter punctato lobo laevigato, elytris simili modo quo in L. Gilnickii sed paullo minus fortiter striolatis, circa scutellum laevigatis, pygidio supra fere laevigato, tarsis coeruleo-nigris.* — Long. 22—27 mill.

Mas: *Tibiis anticis leviter 3-dentatis, pygidio deplanato, abdominis segmentis linea media transversa punctorum parum perspicua.*

Fem.: *Tibiis anticis fortiter 3-dentatis, pygidio conico, subtus basi lateribus utrinque impresso, medio carinulato, abdominis segmentis linea media transversa punctorum valde perspicua segmentoque quinto fere toto crebre punctato.*

Neu-Guinea, Constantin-Hafen.

Durch den schwarzen Schimmer an der Basis der Fld. an *Ischiopsopha lucivorax* Kraatz (D. E. Z. 1890, p. 32) erinnernd, aber weniger grofs, durch die Streifung der Fld. der *Lom. Gilnickii* Kr. (D. E. Z. 1885, p. 85) verwandt, von derselben Gröfse, aber nach hinten weniger verschmälert, also ziemlich parallel, die Fld. weniger metallisch, mehr hellgrün, mit Ausnahme der schwarzen Basalfärbung, welche nicht scharf abgegrenzt ist, sondern mehr eine Art von schwarzem Schimmer ist, der indessen bei allen Individuen auftritt, bei einigen allerdings stärker als bei anderen.

Der Kopf ist hinten ziemlich weitläufig punktirt, nach vorn allmählich dichter und stärker. Das Halssch. ist ähnlich gebaut wie bei *Isch. lucivorax*, doch sind die Seiten meist deutlich flach aufgebogen. Die Strigilirung der Fld. ist weniger deutlich als bei *Lom. Gilnickii*; an der Basis sind sie glatt, dann folgt eine zerstreute Punktirung, dann beginnt die Strichelung; die schwarze Farbe verschwindet nach der Schulter zu, doch ist in der Regel ein Fleck auf der Schulter schwärzlich.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung)

Jahr/Year: 1894

Band/Volume: 1894

Autor(en)/Author(s): Schoch Gustav

Artikel/Article: Zwei neue Varietäten der Anochilia rufipes Kraatz aus Madagascar. 319-320