

Bücher-Anzeige.

Die Käfer Europa's, von Dr. H. C. Küster und Dr. G. Kraatz, fortgesetzt von J. Schilsky. Heft XXXII. Mit 1 Kupfertafel und 1 Textfigur. Nürnberg 1896. Verlag von Bauer & Raspe.

In diesem Hefte sind 25 *Henicopus* (5 neue), 9 *Allotarsus* (1 neuer), 14 *Dasytes* (8 neue), 7 *Chaetomalachius* (5 neue), 34 *Dasytiscus* (6 neue), 11 *Trichoceble* (4 neue) beschrieben, so daß der Leser ein gutes Bild von den meisten überhaupt beschriebenen Arten dieser Gattungen erhält. Außerdem sind auf der beigegebenen Tafel von 25 *Henicopus*-Männchen Darstellungen des ersten Hintertarsengliedes gegeben; durch Bestimmungstabellen werden außerdem die Männchen von *Henicopus*, *Allotarsus*, sowie die *Chaetomalachius*, *Dasytiscus* und *Trichoceble* auseinandergehalten. Auf *Henicopus privignus* Ksw. wird eine neue Untergattung *Dasyoma* begründet, von der wohl im Index hätte Notiz genommen werden müssen. Die Gattung *Dasytiscus* Ksw. wird in die Untergattungen *Trithrix*, *Dasytiscus*, *Dasytidius* und *Haplothrix* zerfällt; *Chaetomalachius* Kraatz, welcher von Reitter und Bourgeois zu *Dasytiscus* gezogen wurde, wird als gute turkestanische, persische Gattung aufrecht erhalten und enthält bereits 7 Arten, von denen 5 neu sind.

Die einzelnen Species sind mit bekannter Sorgfalt beschrieben; *Dasytiscus graminicola* Kiesw. ist von Bourgeois als Mischart aufgefaßt worden; nach Reitter's Bemerkung (in Karsch's Entomol. Nachrichten 1885, p. 246 unter *Dasytiscus aequalis*) darf *D. graminicola* nicht als Mischart betrachtet werden. Nach meinem Materiale aus der alten Zeit ist *Dasytiscus graminicola* Ksw. in der Hauptsache *aequalis* Reitter gewesen; auch die vier von v. Kiesenwetter an Hrn. v. Heyden mitgetheilten typischen Ex. des *D. graminicola* (vergl. unter *D. aequalis* Reitter, Karsch, Entom. Nachrichten, 1885, p. 246) sind von Reitter als *aequalis* beschrieben worden. Da Reitter mit Unrecht den bei *Sarepta* häufigen *D. affinis* Mor. auf *gram.* deutete, konnte er in den ächten Typen natürlich nicht den *graminicola* erkennen. In der That hat auch v. Kiesenwetter, wie aus seiner Beschreibung hervorgeht (Berl. E. Z. 1859, S. 180: „*elytris seriebus nonnullis plus minusve obsolete setulorum vestitis*“) Ex. des *impressipennis* Reitt. mit *graminicola* vermengt. Die Abbildung (a. a. O. taf. II, f. 12) ist sicher nach *aequalis* entworfen; *D. rufitarsis*, unter dem Bourgeois (Ann. de France 1885, p. 259) den *graminicola* citirt, ist Ksw. unbekannt geblieben. Dr. G. Kraatz.