

Deltomerus andalusicus n. sp.

Schwarz, abgeflacht, die Fühler zur Spitze sehr wenig heller, die Tarsen braun, letztere oben spärlich und lang gelb behaart. Palpen und Mandibeln rostroth. Fühler die Mitte des Körpers etwas überragend, vom 2. Gliede dicht behaart, das 3. Glied langgestreckt. Kopf sammt den Augen etwas schmaler als der Thorax, die Frontalfurchen kurz und gebogen, Scheitel an den Seiten mit einigen groben Borstenpunkten, die Mitte des Kopfes fast glatt. Augen mäfsig groß, vorstehend. Halssch. so lang als der Kopf ohne Mandibeln, etwas breiter als lang, stark herzförmig, vorne stark gerundet, im oberen Drittel am breitesten, von da zur Spitze stark verengt, geschwungen, von den scharf rechtwinkeligen Hinterecken parallel, gleichmäfsig fein aufgebogen, mit vollständiger Mittellinie, die Scheibe vorn und an den Seiten sehr wenig, spärlich punktirt, ohne Borstenhaare, die Längseindrücke an der Basis ringsum dicht und fein punktirt, die Mitte der Scheibe glatt erscheinend, Seitenrand vorne mit 4 Lateralborsten. Schildchen glatt. Fld. oval, breiter als der Halssch., mit stumpf ver rundeten Schultern, die Seiten fein, in der Mitte breiter aufgebogen, Oberseite abgeflacht, mit mäfsig starken Punktstreifen, die Punkte der Streifen nicht oder kaum gekerbt, die Zwischenräume flach, die dorsalen kaum, die äufseren schwer sichtbar punktulirt, die abwechselnden (3., 5. und 7.) mit einer weitläufigen Borstenpunktreihe, hiervon ist die am 3. Zwischenraume ganz, die am 5. reicht bis zur Mitte, die am 7. ist nur vorn markirt. Unterseite fast glatt; die Trochanteren der Hinterbeine etwas heller rostbraun gefärbt, die Bauchsegmente haben jederseits nur einen Borstenpunkt. — Long. 10—11 mill.

Dem kaukasischen *D. pseudoplatynus* Rtr. äufserst ähnlich, aber durch den fast glatten Kopf und Halssch., schwächere Streifen der Fld., flachere, undentlich punktirte Zwischenräume derselben unterschieden; von dem mir unbekanntem *D. nebrioides* Vuillefr., A. 1866, 346, aus Asturien durch die feine Randpunktur des Halssch. und der ganzen Brust an den Seiten sicher abweichend; von beiden durch den Mangel von borstentragenden Punkten auf der vordersten Dorsalfäche des Halssch. specifisch abweichend.

Andalusien (Lanjaron).

Edm. Reitter.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: [1896](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Deltomerus andalusicus n. sp. 304](#)