

Eine neue schwedische marine Homalotiden-Art.

Beschrieben von

J. B. Ericson in Mölndal.

Acrotona curtipennis. *Nigrofusca*, *pedibus sordide testaceis*, *coleopteris apice emarginatis*, *brevioribus quam prothorace*. — Long. 1.6 mill.

A. orphanæ Er. *similis*, *elytris brevioribus*.

Habitat sub fucis exsiccatis.

Color nigrobrunneus. Caput subcirculare, pilosum, antice attenuatum, sculptura granulosa. Oculi deplanati, ovati, ad basin antennarum submarginati, margine inferiori subrecto; genae margine elevato continuo inter oculos. Elytra et abdomen granulosa, abdomen magis quam elytra. Thorax ex nigrobrunneo rufobrunneus, laeviter marginatus, aequè longus ac latus (supra visus), prima tertia parte postice circulariter rotundatus, ad basin aequè latus ac elytra, antice attenuatus margine antice truncato, aequa latitudine ac pars capitis latissima, latere lineam (curvatam usque ad oculum) vel basin antennae formante. Latera thoracis (postice visa) subcircularia, marginibus anticis et posticis rotundato-truncatis. Elytra thorace paullo breviora, latiora quam longiora, marginibus ex humero usque ad medium flavo-brunneis, ad basin et marginibus posticis densius pilosis. Venter cinereus, pilosus. Segmentum abdominis ultimum pilis lateralibus longis, nigris. Antennae rufo-brunneae, thorace longiores; antennarum articulus primus minore crassitudine quam in *A. orphanæ*, aequè longus ac tertius, secundus aliquanto longior, tertio crassior, primo gracilior, quartus paullo longior quam crassior, quinto gracilior, quintus — decimus paullo crassiores quam longiores, undecimus conicus, duplo longior quam decimus; a basi tertii articuli, ubi antenna gracillima est, crassitudo usque ad articulum ultimum accrescit; articulus undecimus aequè crassus ac primus. Instrumenta cibaria flavi, palpis fuscis exceptis. Tarsi antici 4-articulati, articulis 1—3 aequali longitudine, articulo unguali longitudine hos aequante, versus unguem incrassato. Tarsi medii 4-articulati, articulo primo longiore quam quarto, paullo breviorè quam secundo et tertio junctis. Tarsi postici 5-articulati, articulo primo quarta parte [breviorè quam articulo unguali, secundo paullo longiore quam tertio, tertio et quarto inter se eadem longitudine, junctis

longitudine quintum aequantibus. Pedes plus minus fulvi, maculati; tarsi dilutiores. Longitudo 1.6 mill.

Patria: Åskloster, Hallandiae, sub fucis exsiccatis anno 1895 (auctor).

Lathridius microps J. B. Ericson n. sp.

Rugicollis affinis, paullo minor et angustior, capite oculis minoribus sed magis acute prominulis, fronte haud canaliculata; prothorace fere quadrato, lateribus antice parum dilatatis, carinis dorsalibus antice fere deletis; elytris postice minus convexis, dorso deplanatis, apice abrupte declivibus, costis alternis elevatis et intermedia, quae in *L. rugicollis* postice fere deleta, ubique distincta et cum interiore ante apicem conjuncta certe distinctus.

Patria: Lagklarebäck, Westrogothiae, anno 1895 (auctor).

Goliathus intermedius Krtz. ist sicher Varietät
von *giganteus*.

Ich habe bereits (Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 439, Note) gesagt, daß das Material des Berliner Museums dafür spreche, daß mein *intermedius* eine Varietät des *giganteus* Lam. sei. Nunmehr hat mir Hr. Möllenkamp einige Goliathen mitgeteilt, deren Zeichnung dafür spricht, daß *intermedius* sicher Varietät von *giganteus* sei.

Unter denselben befindet sich das erste mir zu Gesicht gekommene *gig.* ♂, bei dem die Binden neben der Mittelbinde nicht nur zusammengefloßen, sondern auch ebenso breit sind wie bei meinem *intermedius* (D. E. Z. 1895, p. 438). Die Fld. dieses *Gol.* sind an der Basis weiß, im Uebrigen schwarzbraun.

Außer diesem *gig.* ♂ hat mir Hr. M. einen *intermedius* von 84 mill. Länge mitgeteilt (also viel größer als der von mir beschriebene), der sich von dem von mir abgebildeten nur dadurch unterscheidet, daß der weiße Streif am Seitenrande des Halssch. an der Basis nach innen nicht erweitert ist.

Zu diesem *intermedius* hat Hr. M. ein ♀ mit größtentheils weißen Fld. eingesendet (mit Ausnahme der Schulter- und Apicalflecken), welches ohne Weiteres als *intermedius* ♀ anzusprechen ist.

Von der var. *conspersus* Kraatz (D. E. Z. 1889, p. 377, T. IV) hat Hr. M. ein schönes ♀ eingesendet, bei dem die Binden auf dem Halssch. länger sind als bei den von mir (a. a. O. Fig. 3) abgebildeten Ex.

Ein fünftes Ex. (♀) ist als sehr reines ♀ von *giganteus* zu betrachten; die ganzen Fld. sind mit grauem Duft überzogen; der Seitenrand breit weißlich, der weiße Basalrand springt unregelmäßig dreieckig nach hinten vor.

Dr. G. Kraatz.