

dato-truncato, margine apicali non serrato; corpore inferiore non piloso, trochanteribus palpisque (articulo ultimo nigro) flavis vel rufis; elytris densissime foveolato-punctatis, interstitiis cribriformibus; plaga parva media in basi collocata glabra; lunula humerali elongata parum incurva, stria obliqua a margine medio in discum producta (antice posticeque dilatata), macula apicali (antice incrassata, suturam non attingente) flavis; corpore supra obscure aeneo, non nitente; elytris fere nigris, pedibus antennisque nigro-metallicis, tibiis hinc inde rufescentibus, labro flavo nigro-marginato, pectore obscure-coerulescente, abdomine viridescente. — Long. 18—20 mill.

1 ♀ ♂, Usaramo. A celeberrimo R. von Bennigsen capta.

Die dichte, netzförmige, äusserst feine Fld.-Skulptur ist charakteristisch für diese auffallende Art. Palpen und Fühlerglieder sind nicht verdickt. Die Behaarung ist ausserordentlich spärlich für eine echte *Cicindela*: nur die Hinterhüften sind stellenweise punktiert-behaart.

Ueber einige Typen der Dokhturow'schen Cicindeliden-Sammlung.

Die Dokhturow'sche Sammlung strandete nach wechsellvollen Schicksalsschlägen im vorigen Jahre bei einem Petersburger Trödler, wo sie von einem Insektenhändler entdeckt wurde. Nach langen Verhandlungen — durch Zufall hatte ich Nachricht bekommen — gelang es mir, eine umfassende erste Auswahl zu erwerben; sämtliche Typen waren allerdings nicht darunter, Dokhturow hatte sie aber auch gar nicht alle besessen.

Eurytarsa bigranipha D. ist = *Heptodonta patricia* Schm.

Cosmema armigera D. ist das ♂ von *C. furcata* Boh., *C. transvaalensis* D. das ♀.

Cosm. connexa Pér. (*C. marginella* Chd.) ist = *C. alboclavata* D.

Cosm. lateralis ♀ Pér. (*aspera* Chd. i. l., Pér.) ist = *C. aspera* ♀ D.

Cosm. foveolata ♂ Pér. (*Myrmecoptera* sec Pér.) ist = *C. granulata* ♂ D. Der Typus der letzteren hat kaum erweiterte Fühlerglied! diese Form ist vielleicht nur Var. von *C. aspera* D., *C. lateralis* Boh. ist eine andere Species. — *C. aspera* Pér. müfste umgetauft werden.

Cicindela elaphroides D. = *discreta* Schm.

Cic. hybrida var. *palpalis* D. ist *C. transbaicalica* Mtsch. var.

Odontochila Chaudoiri D. ist = *Od. procera* Chd.

Cic. Fauveli ist = *mandibularis* ♂.

Cic. Solskyi ist = *conicicollis* Schm. ♀. Dr. W. Horn.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [1897](#)

Autor(en)/Author(s): Horn Walther Hermann Richard

Artikel/Article: [Ueber einige Typen der Dokhturow'schen Cicindeliden- Sammlung. 62](#)