

das Analsegment jederseits stark schräg niedergedrückt; bei dem ♂ sind diese Eindrücke seicht und in der Mitte mit einer Grube. — Große Arten. (*Transsilvanicus*-Gruppe.)

- 9" Rüssel vorne mit langer und starker Dorsallängsfurche, Halssch. mit breiter Basalbehaarung. Analsegment des ♂ mit flacher Apicalgrube, welche die Mitte des Segmentes kaum erreicht. Außer siebenbürgischen Stücken besitze ich jetzt ein Stück vom Monte-Baldo <sup>1)</sup> aus Ludy's Sammlung; ein Ex. von Görz sah ich in der Coll. von Dr. Schreiber. *transsilvanicus* Petri.
- 9" Rüssel vorne ohne, oder ohne prononcirte Dorsallängsfurche; Halssch. nur mit schmaler Basalbehaarung. Analsegment des ♂ mit tieferer, die Mitte des Segmentes nach vorne überragender Grube. Von der Gestalt und Größe des vorigen. Der Forceps ist viel breiter als bei dem vorigen, mit breiteren Seitenwülsten, vorn breiter gerandet, mit stumpferer Spitze. — Ober-Engadin.  
*engadinensis* n. sp.

<sup>1)</sup> Nachdem *engadinensis* nicht kleiner als *transsilvanicus* ist, und Petri erwähnt, daß die kleinsten Stücke von letzterem am Monte-Baldo vorkommen, so glaube ich annehmen zu dürfen, daß Dr. Petri darunter den kleineren *baldensis* verstanden hat.

#### *Mesostylus Bangi* Reitter n. sp.

Dem *M. Hauseri* Fst. sehr ähnlich, aber trüb grauweiß, auf Halssch. und Fld. mit gleichen, braunen, jedoch sehr wenig begrenzten, meist nur schwach getrübbten Zeichnungen. Noch näher verwandt, wegen den kreisrunden Augen und ähnlicher, verwischter Dorsalzeichnung mit *M. truchmenus* Fst., von dem er sich durch die Fühlergeißel sehr bestimmt unterscheidet; das erste Glied derselben ist doppelt, beim ♀ nur  $1\frac{1}{2}$  mal so lang als breit, das 2. ist quer beim ♂, wenig länger als die nächsten, beim ♀ stark transversal, fast so wie die übrigen Glieder. Die Schienen sind vor, nicht in der Mitte, wadenförmig erweitert. Rüssel mit einer Längsrinne; Halssch. in der Mitte gerundet und hier am breitesten, die Börstchen auf den Decken sind kaum erkeubar. Größer als *truchmenus*, von der Größe des *Hauseri*. — Long. 5—7 mill.

Transcaspien: Buchara.

Von Hrn. A. Bang-Haas freundlichst eingesandt und ihm zu Ehren benannt.

Edm. Reitter.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [1897](#)

Autor(en)/Author(s): Ritter Edmund

Artikel/Article: [Mesostylus Bangi Ritter n. sp. 243](#)