

Zwei neue *Thamnurgus*-Arten (*Coleoptera*).

Von

Edm. Reitter in Paskau (Mähren).

Thamnurgus declivis n. sp.

Dem *Th. Kaltenbachi* in Gröfse und Form ganz ähnlich und von diesem durch stärkere Punktur der Oberseite und die Form des Deckenabsturzes verschieden. Dieser ist abgeflacht, die Naht steht etwas vor, die Depression daselbst wird nur von wenigen Punkten der Dorsalreihen durchsetzt und wird seitlich von einer erhabenen, etwas gebogenen Falte begrenzt; beim ♂ ist die Depression und die seitliche Falte stärker entwickelt. — Cylindrisch, schwarz, glänzend, lang weiß behaart, Fühler gelblich, Beine braun, Tarsen gelb. Halssch. um $\frac{1}{4}$ länger als breit, reichlich von der Breite der Fld., oben stark, nicht gedrängt punktirt, die Punkte fast etwas gröber als auf den Fld., mit schmaler, punktfreier Mittellinie, Fld. doppelt so lang als zusammen breit, die Punktreihen gedrängt, oft etwas confus, zur Spitze merklich feiner werdend. — Long. fast 2 mill.

Aus *Tenacium*, 5 Ex. in meiner Zuchtkammer ausgekommen, dessen Provenienz mir nicht mehr klar ist; es kommt Böhmen, Mähren, Deutschland oder Nordungarn in Frage.

Thamnurgus armeniacus n. sp.

Mit *characrae* Rosenh. zunächst verwandt, aber kürzer, gedrungen gebaut, Halssch. kürzer, stärker punktirt; von *caucasicus* Reitt. durch den Deckenabsturz sofort zu unterscheiden.

Cylindrisch, schwarz, glänzend, lang gelblich oder weiß behaart; Fühler gelb, Beine schwarz, Tarsen gelb. Halssch. höchstens um $\frac{1}{4}$ länger als breit, an den Seiten gerundet, wie die Decken mäfsig stark und mäfsig dicht punktirt, mit punktfreier Mittellinie. Fld. von der Breite des Halssch., parallel, kaum doppelt so lang als zusammen breit, Punktreihen gedrängt, oft etwas confus, Absturzfläche flachgedrückt, die Naht erhabener, aufsen von einer feinen erhaltenen Falte begrenzt, die Punktreihen durchsetzen zum Theil die abgeflachte Absturzfläche, in der Mitte zwischen Naht und Seitenfalte mit einem feinen, schmalen, convexen Zwischenraum. — Long. 2.8 mill.

Kaukasus: Araxesthal bei Ordubad ein ♂ und ♀ (Col. Reitter).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [1897](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Zwei neue Thamnurgus- Arten \(Coleoptera\). 244](#)