

Eine neue (termitophile) *Myrmedonia* aus Westafrika.

Von

E. Wasmann S. J.

Myrmedonia (*Rhynchodonia*) *leonina* n. sp.

Tota flavotestacea, nitida, capite vir obscuriore, oculis nigris; lata, parallela, plana, flavosetosa, alata. Caput magnum, thorace paullo angustius, triangulare, labro porrecto, punctatum, in medio laeve. Thorax transversoaquadratus, longitudine duplo latior, tenuiter marginatus, margine antico toto emarginato, postico leviter rotundato, lateribus rubrectis, parallelis, angulis anticis rectis, posticis obtusis; subtiliter alutaceus, sat fortiter haud dense punctatus, linea media longitudinali laevi, impressione longitudinali utrinque prope marginem lateralem instructus. Elytra thorace neque longiora neque latiora, sutura infusca; subtiliter rugulosa, densius fortiusque thorace punctata. Abdomen planum, alte marginatum, sat fortiter haud dense punctatum. — Long. 6—7.5 mill., lat. 2.3—2.7 mill.

Antennae capite thoraceque vir longiores, fractae, compressae, sub serratae; art. 2^o et 3^o oblongoconicis, 3^o duplo longiore 2^o; 4—10 triangularibus, sensim paullo brevioribus, primis haud, ultimis vir transversis; 11^o ovato, praecedenti angustiore et paullo tantum longiore. Labrum quadratum, antice truncatum et in medio incisum, angulis anticis rotundatis. Tarsi postici art. 1^o dimidio longiore 2^o.

Mas: Segmento 6^o dorsali utrinque sulcato et plicato, apice medio emarginato.

Die Art stimmt mit keiner der von Eppelsheim und Anderen beschriebenen westafrikanischen *Myrmedonien* überein. Wegen der fast rüsselförmig vorgezogenen Oberlippe und der flachgedrückten, gesägten Fühler gehört sie zur (termitophilen) Untergattung *Rhynchodonia* Wasm. (Ann. Mus. Civ. Gen. (2) XVI, 1896, p. 620), unterscheidet sich jedoch von allen mir bekannten Arten durch die einförmig blafs-rothgelbe Färbung, das sehr breite Halssch., die vollkommen parallele, flache Gestalt und die männlichen Geschlechtsauszeichnungen. Die Art gehört nach der Zungenbildung zu *Myrmedonia* Er., nicht zu *Ctenodonia* Wasm. 2 Stück, 1 ♂ und 1 ♀ aus der Sammlung von Herrn René Oberthür lagen vor. Freetown (Sierra Leone), A. Mocquerys! 1888. Ich halte die Art wegen ihrer Fühlerbildung für termitophil, wegen ihrer blassen Färbung für unterirdisch (resp. im Innern d. Termitenbauten) lebend.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [1897](#)

Autor(en)/Author(s): Wasmann Erich P.S.J.

Artikel/Article: [Eine neue \(termitophile\) Myrmedonia aus Westafrika. 279](#)