

*Psadacopectera bipunctata* nov. sp. von Natal.

Seiner Zeit sprach ich die Vermuthung aus, das die Tupfen auf den Fld. für die Arten der Gattung *Psadacopectera* charakteristisch wären (Deutsche Ent. Zeitschr. 1882, p. 67 unten); in der That finden sich dieselben bei einer dritten neuen Art aus Natal wieder. Schoch scheint keine Ahnung von dem Habitus der *Psadacopectera*-Arten, die durch die Haartolle auf der Stirn leicht kenntlich sind, zu haben, denn er citirt als zu dieser Gattung gehörig in seinem Catal. syst. Ceton. drei echte Pachnoden: *Fairmairei* Raffr., *laticincta* Burm. und *orphanula* Herbst.

*Psadacopectera bipunctata*: *Supra rufotestacea, thoracis vittis 2 plerumque conjunctis, elytrorum maculis 2 discoidalibus, interdum punctum album includentibus piceo-nigris, elytris interdum apice tenuiter albomaculatis, pygidio rufo, medio piceo, lateribus albis, abdominis lateribus biserialim albo-maculatis, punctis interioribus albis, femoribus posticis albomarginatis.* — Long. 12—13 mill. ♂♀.

Patria: Natal (Staudinger.)

Der *Psad. simulatrix* Krtz. <sup>1)</sup> ähnlich, aber kleiner, oben ebenfalls gelbbraun, der Discus des Thorax aber mit 2 großen dreieckigen schwarzbraunen Flecken geziert, die bisweilen zusammenfließen und hinten in der Mitte eckig ausgeschnitten sind, die Fld. jede hinter der Mitte nur mit einem dunklen Fleckchen, in dem bisweilen ein weißer Fleck deutlich hervortritt. Die Fühler sind schwärzlich. Der Clypeus ist dicht, ziemlich deutlich punktirt, vorn leicht ausgerandet, die Vorderecken abgerundet. Die Stirn ist mit einem dichten, gelben Haarbüschel besetzt. Der Thorax ist ziemlich weiltläufig, seicht punktirt, wie bei *simulatrix* gebaut. Die Fld. sind kaum bemerkbar punktirt-gestreift, am äußersten Seitenrande und nach der Spitze zu bisweilen mit kleinen, weißen Flecken versehen. Das Pygidium ist jederseits breit weiß eingefasst. Die Hinterleibssegmente 1—4 sind hinten an den Aufsenecken mit einem viereckigen, weißen Fleck versehen; innerhalb jedes einzelnen weißen Fleckes steht bei Segm. 2—4 ein mehr als doppelt so breiter ähnlicher Fleck; die 4 ersten Segmente sind in der Mitte glatt, 5 ist punktirt, an den Seiten mit einem länglichen weißen Fleck. Die Vorder- und Mittel-Schenkel sind lang greis behaart, die Hinterschenkel meist vorn und hinten weiß gesäumt, die Hinterschienen innen; der erste von den 3 Vorderzähnen ist beim ♂ kaum, beim ♀ deutlich bemerkbar, der Hinterleib beim ersteren leicht verflacht.

Dr. G. Kraatz.

<sup>1)</sup> Deutsche Ent. Zeitschr. 1882, p. 68.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: [1898](#)

Autor(en)/Author(s): Kraatz Gustav

Artikel/Article: [Psadacoptera bipunctata nov. sp. von Natal. 92](#)