

tomentirt, doch so, daß ein ovaler Fleck in der Mitte nackt bleibt, an dessen Basis ein tomentirter Fleck befindlich ist. Thorax, Brust und Hinterleib sind an den Seiten dicht grau tomentirt und gelb behaart, Unterseite grünlich schwarz, Hinterleibsegmente weitläufig punktirt, das letzte glatt. Der erste Zahn an den Vorderschienen ist schwach, aber deutlich (♂).

Pseudoprotactia puncticollis var.? soror.

Ein zweites Ex. von Transvaal ist etwas kleiner als das eben beschriebene, hat unbehaarte Stirn und unbehaartes Halssch.; der Ton der Oberseite sticht mehr in's Pechbraune. Die Punktirung ist merklich deutlicher; die weißen Sprenkela auf dem Halsschilde treten gar nicht, auf den Fld. viel schwächer hervor; eine Querbinde hinter der Mitte der Fld. fehlt.

Ob wir es hier mit einer anderen Art oder einer Lokalvarietät zu thun haben, kann nur die Untersuchung einer größeren Reihe von Ex. lehren.

Dr. G. Kraatz.

Adoretus guttulatus Kraatz n. sp. von Ukambani.

Nigro-piceus, supra testaceus, dense albedo-pubescentibus, thorace vix, elytris 5-seriatim testaceo-guttulatis, pedibus testaceis, albedo maculatim pubescentibus. — Long. $8\frac{1}{2}$ mill.

Patria: Africa orientalis (Ukambani).

Ex. unicum in coll. Dom. Prof. Hauser.

Eine kleine reizende Art, oben gelblich, Brust und Bauch schwärzlich, die Oberseite dicht (aber nicht fein) weiß behaart, 5 Reihen rundlicher Flecke auf jeder Fld. unbehaart. Der Käfer hat ganz die Form der *Adoretus*-Arten. Der Kopf ist dicht weiß behaart. Auf dem Thorax bleiben nur einzelne undeutliche Flecke von der Behaarung frei, auf jeder Fld. dagegen 5 Reihen rundlicher Flecke; die neben der Naht enthält nur 3—4, die nächste gegen 10, die mittlere etwa 8, die vierte 6, die Reihe am Rande 7 Flecke, dieselben sind von regelmässig runder Gestalt; an der Basis jedes Fleckes befindet sich ein schräg eingestochener Punkt. Auf dem Pygidium ist die Behaarung feiner, ziemlich lang abstehend, an den Spitzen gelblich. Der Bauch ist mäsig dicht behaart und punktirt, schwärzlich. Die Beine sind gelb, kurz und kräftig, scheckig weiß behaart; die Vorderschienen sind dreizählig, die Zähne nicht besonders scharf, der erste am kürzesten. Von den Klauen ist die längere innen an den 4 Vorderbeinen an der Spitze undeutlich gespalten.

Dr. G. Kraatz.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [1899](#)

Autor(en)/Author(s): Kraatz Gustav

Artikel/Article: [Adoretus guttulatus Kraatz n. sp. von Ukambani. 109](#)