

gens ist alles an Bord vorzüglich, was allerdings bei den hohen Preisen — für die 12 Tage von Suès-Colombo beträgt der Fahrpreis I. Cajüte 860 *M* (ohne Getränke: nur Citronen-Limonade ist frei) — auch zu verlangen ist.

Doch nun, mein lieber Hr. Dr., muß ich schliesen; die Küste von Ceylon ist bereits in Sicht!

Ihr

Walther Horn.

Nickerlea nov. gen. *Euryodinatorum*.

Corpus (cum coxis posticis) glabrum.

Metathoracis episterna impressione longitudinali vestigium equi immitante levissima ornata.

Elytra discrete punctata.

Labrum longum mandibulas superans, palpi labiales valde incrassati, breves.

Habitus Distysiderarum.

Patria: Australia.

Das Genus *Distysidera* hat einen tiefen hufeisenförmigen Eindruck auf der Episternal-Platte der Hinterbrust, eine dichte und tiefe Skulptur der Fld. (die mindestens stellenweise deutliche Querrunzeln aufweist), eine stets ausgeprägte Mittelbinde und niemals eine einfarbig-dunkle Oberlippe. — *Oxygoniola* stimmt zwar in dem Eindruck der Episternen des Metathorax mit der neuen Gattung einigermaßen überein, hat sonst aber gar keine näheren Beziehungen zu *Nickerlea*. Die Mandibeln sind auffallend verlängert, Oberlippe kurz, Taster dünn und lang, Stirn flach, Kopf klein und (ebenso wie das Halssch.) nicht im geringsten an *Distysidera* erinnernd, Prosterno-episternal-Naht schwach entwickelt etc. Uebrigens besteht auch ein gewisser Unterschied in der Gestalt des hufeisenförmigen Eindruckes: bei dem neuen Genus zeigen die Episternen der Hinterbrust hinten eine flache Grube, von welcher aus eine seichte Furche (medialer Schenkel des Hufeisens!) nach vorn zieht; der laterale Schenkel ist erheblich kürzer und undeutlicher. Beim ersten Anblick gewinnt man fast nur den Eindruck, als wäre auf der Scheibe der Episternen ein längs gestellter, schwach erhabener Wulst vorhanden. Die Hinterecken des Halssch. sind ohne quere Prominenz. Fühler, Abdomenspitze und Kiefertaster fehlen leider dem einzigen Ex., welches ich kenne.

Nickerlea distypsideroides.

Differt a Distypsidera flavicante Chd. labro paullo brevior, antice latius truncato et in parte centrali antica dentibus 3 (non dente una!) perparvis (vix percipiendis) ornato: dentibus 2 majoribus in utroque latere fere ut in illa specie, toto unicolori obscure metallico; capite thoraceque fere omnino eisdem, sed supra paullo levius sculptis (rugis longitudinalibus juxta-orbitalibus perparum profundioribus exceptis), fovea frontali centrali latiore profundioreque, thorace brevior antice magis dilatato marginibusque lateralibus magis arcuatis; elytris longioribus, usque ad medium discrete minute punctatis, punctis a medio ad apicem etiam minoribus rarioribusque, serie punctorum majorum rarorum juxta-suturali evidente, apice singulo minus rotundato; signatura alba: maculis 3 sat magnis marginalibus, prima humerali vix marginem sequente, secunda media, tertia ante-apicali. Colore supra obscure aeneo, thorace capiteque paullulum nitente, elytris opacis; subtus cyaneo-nigricante modice nitente. Palpis labialibus (articulo ultimo nigro), trochanteribus, pedibus testaceo-rufis, tibiis tarsisque perparum obscurioribus, horum apice angustissime nigro annulato. — Long. $10\frac{1}{2}$ mill. (sine labro).

1 ♀ (?), Australia bor. (Odewahn). Ab amico Dr. Nickerl mihi datum, cuius in collectione superba exemplar unicum fuit.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [1899](#)

Autor(en)/Author(s): Horn Walther Hermann Richard

Artikel/Article: [Nickerlea nov. gen. Euryodinatorum. 135-136](#)