

mählich in sanfter Rundung erweitert und an der Basis doppelt so breit als lang, die vordere Borstenpore ein Stück hinter den schwach verdickten Vorderecken eingestochen, die hintere in den scharf rechtwinkligen Hinterecken; die Scheibe ist vorn querüber gewölbt und etwas zusammengedrückt, hinten auf dem mittleren Theile ziemlich flach, vor dem Schildchen und jederseits davon vor dem Schulterhöcker der Fld. mit einem weiten und schwachen, jedoch deutlichen Eindrucke versehen, äußerst fein und verloschen punktirt. Schildchen dreieckig, die Spitze gerundet-abgestutzt. Fld. in den Schultern breiter als das Halssch., sodann fast parallel (♂) oder leicht erweitert (♀), hinten breit gemeinschaftlich abgerundet, mit einzeln verrundeter Nahtcke; auf dem Rücken verworren punktirt.

Trachymetopa cretica: Oblongo-ovalis, convexiuscula, testaceo-rufa, nitida, antennis articulis 5 ultimis, scutello, pectore abdomineque nigris, elytris saturate cyaneis vel aeneo-coeruleis, sat crebre subtiliter punctatis. — Long. 2—2,5 mill.

Gestalt und Körperbau ähnlich der *Aphthona venustula* Kutsch., glänzend röthlich gelbbraun, auf Kopf und Halssch. etwas dunkler wie an den Beinen und Fühlern. Das 5. und 6. Glied der letzteren oben angedunkelt, die folgenden Glieder, sowie das Schildchen, die Seiten der Mittelbrust, die Hinterbrust und der Bauch schwarz. Fld. gesättigt violett, kornblumenblau oder heller blau mit metallisch grünem Schimmer, ziemlich dicht und fein punktirt.

Chrysomela globipennis Suffr., welche sich von *coerulea* Ol. durch den sehr flachen, oft kaum bemerkbaren, aber niemals furchenartig vertieften Eindruck in den Hinterecken des Halssch., sowie durch bauchigere Fld. sicher trennen läßt, ist trotzdem nur eine Var. von *coerulea*, keine selbstständige Art. Der Penis und Ductus stimmt bei beiden überein. Hr. Deubel sammelte *coerulea* im Kronstädter Gebirge und ein fast schwarzes Stück, zu meiner Var. b gehörig, in der alpinen Region am Bucsecs (von hier sandte auch Hr. v. Bodemeyer zahlreiche Stücke ein, die sich durch geringe Gröfse von 5,5—7 mill. auszeichnen), die Var. *globipennis* im Rodnaer Gebirge.

J. Weise.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [1899](#)

Autor(en)/Author(s): Weise Julius

Artikel/Article: [Chrysomela globipennis Suffr. 140](#)