

Paraneptunides nov. gen. *Cetonidarum*.

Von

Dr. G. Kraatz.

Antennae (maris) elongatae, fere duplo longiores quam in gen. Neptunide.

Caput lateribus et apice altius elevatum, apice tricuspe, dentibus acutis sed parum prominentibus, dente medio paullo brevior.

Thorax, scutellum et elytra ut in gen. Neptunide.

Pedes validiusculi, maris tibiis anterioribus apice haud dentatis, extus apice emarginatis, intus apice haud denticulatis ut in gen. Neptunide.

Prosternum basi dente medio, longo instructum.

Mesosternum processu leviter producto, acuminato.

Patria: Africa or. (Usaramo).

Exemplar unicum (♂) in coll. v. Bennigsen.

Der Gattung *Neptunides* ähnlich und nahe verwandt, durch den tiefer ausgehöhlten, mit kurzen Zähnen bewaffneten Kopf, längere Fühler, den Bau des Prosternums und der Vorderschienen (der ♂) der sonst ähnlich geformten Beine genugsam unterschieden.

Paraneptunides Bennigseni: Piceo-purpureus, nitidus, capite thoraceque nigris, elytris piceis, glabris, pygidio piceo-purpureo, pedibus valdiusculis, tibiis (maris) apice intus haud dentatis, extus apice emarginatis. — Long. 25 mill.

In der Gestalt des Halssch. und der Structur der Fld. einem kleinen *Neptunides* sehr ähnlich, aber die Fühler länger, der Kopf ziemlich tief ausgehöhlt, vorn mit drei kleineren, scharfen Spitzen, die seitliche etwas länger als die mittlere. Kopf und Halsschild schwarz, Fld. dunkel pechbraun, Pygidium bräunlich, Abdomen röthlich pechbraun, mit Purpurglanz. Die Beine röthlich braun, mit Purpurglanz; die Tarsen namentlich an der Spitze von aufsen gesehen mehr grünlich.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [1899](#)

Autor(en)/Author(s): Kraatz Gustav

Artikel/Article: [Paraneptunides nov. gen. Cetonidarum. 210](#)