- 286 Edm. Reitter: Beiträge zur Kenntnifs der Gattung Laena Latr.
- 16' Fühler kürzer, gegen die Spitze deutlicher verdickt, ihr Endglied kurz eiförmig, sehr wenig länger als breit. Oberseite in den Zwischenräumen wenig lang aufstehend behaart.
- 17" Körper schwach gewölbt, oben leicht abgeflacht. Arten aus Syrien.
- 18" Long. 5-5,4 mill. Augen größer, deutlich vorragend. Cypern syriaca Baudi.
- 17' Körper leicht gleichmäßig gewölbt, oben nicht abgeplattet. Arten aus Südost-Europa (Dalmatien, Griechenland, Türkei, Kreta).
- 19" Größer (Long. 4-5 mill.), weniger gewölbt, Kopf und Halsschild dichter, ziemlich fein punktirt, Augen klein. (L. Marthae Reitt.) ferruginea Küst.
- 19' Klein (Long. 3-4 mill.), gewölbter, Kopf und Halsschild fein und spärlich punktirt, Augen sehr klein. (L. Krüperi Reitt.) v. minima Motsch.

Dryocoetes baikalicus nov. sp.

Dem D. autographas Ratz. und villosus Fabr. sehr ähnlich, kleiner und dunkler als der erstere, der Thorax länger, oben dichter und stark körnig punktirt, die Fld. mit feineren Punktstreisen, die Punkte derselben dichter gestellt, ebenso die Zwischenraumreihen dichter und seiner, an der Basis dicht irregular punktirt; von villosus durch die weise, kürzere, wie beim autographus gestaltete Behaarung, gedrungeneren Körperbau, seine Punktstreisen der Fld., deren Hauptreihen von den Zwischenraumreihen an den Seiten durchaus gleich gebildet sind, verschieden. — Long. 3 mill.

Im Quellgebiet des Irkut. Von Leder aufgefunden.

E. Reitter.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: 1899

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: Dryocoetes baikalicus nov. sp. 286