

Neue afrikanische Cicindeliden.

Beschrieben von

Dr. med. **Walther Horn.***Cicindela (Cratohaereu) Colmanti.*

Differt a ceteris huius subtribus speciebus labro angusto in medio parum producto (dente centrali magna) disco plus minusve albo- aut brunneo-testaceo; mandibulis ♀♂ fere longitudine aequalibus, fronte iuxta orbitas ♀♂ dense longitudinaliter striolata; prothorace subtus viridescente; elytris applanatis margine antico nitente destero. — Long. 9—10 mill.

♀♂; in silvis humidis Africae centralis prope Surango (non procul a flumine Uellé) mense Majo, Junio, Octobre a clarissimo centurione Belgico Colmant capta.

Statura graciliore quam Cicindela (Cratohaerea) Bruneti Gory, capite thoraceque perparum minoribus; vertice pronotoque puillo subtilius sculptis; hoc angustiore, basim versus magis angustato, lateribus minus rotundatis; elytris valde planioribus praecipue pone medium, ante apicem ipsum impressione transversa sat evidenti ornatis, margine laterali angusto ab humeris fere usque ad medium acute declivi et (cyaneo) nitente; superficie tota reliqua valde opaca multoque subtilius variusque punctato-sculpta, tota parte centrali (fere usque ad humeros) obscure pruinosa (sculptura vix perspicua); 2^o et 3^o palporum maxillarium articulo viridi-metallescentibus; trochanteribus posticis metallicis. Colore supra opaco smaragdino, marginaliter hinc inde anguste cyanescente; subtus viridi-coerulescente (externo abdominis apice viridescente); pectore subtus raris, toto abdomine sparsim et breviter pilosis, coris posticis lateraliter densius hirsutis; capite pronotoque nudis.

Myrmecoptera Pantheri.

Differt ab omnibus reliquis speciebus costis 2 angustis acutis longitudinalibus in utroque elytro ab humero usque ad quartam partem apicalem ductis. — Long. 13—14 mill. (sine labro).

2 ♀ (specimen alterum in Museo Viennensi, alterum in coll. mea) a Doctore A. Panther meridionalis Africae partes percurrente „verisimillime in Matabeleland“ captae.

Statura paululum Myrm. bilunatam Dohrn refert, sed graciliore. Primo antennarum articulo in medio setis quibusdam ornato. Capite (quam in illa specie) minore, fronte concavio impressionibusque

2 levibus transversis inter oculos ornata; prothorace angustiore, planiore, antice minus dilatato (lateribus magis parallelis), sulcis in pronoto minus profunde impressis; elytrorum humeris magis distinctis, apice magis angustiusque acuminato, superficie minus convexa, tota fere aequaliter (ante apicem perparum indistinctius quam antice) sculpta: punctis parvis impressis (magnitudine illorum ante apicem in *Myrm. bilunata* Dohrn positorem: sed levioribus!), interstitiis minus distinctis et fere semper hinc inde confluentibus, ut lineae obliquae aut longitudinales plus minusve longae (cristatae, ut ita dicam) formentur; costis 2 longitudinalibus distinctis: altera in medio, altera inter hanc et suturam (illi paululum approximata); vitta sat lata flava juxta-marginali ab humeris usque ad spinam suturalem (vix acutiorem quam in illa specie) ducta: fere ut in *Myrm. Ritsemae* m. sed antice (usque pone medium) duplo longius a margine ipso remota et parte apicali crassiore (sine hamulo centrali); pubescentia corporis inferioris ut in *Myrm. bilunata* Dohrn, sed coris posticis minus dense hirsutis. Colore fere ut in hac specie, sed omnino paululum magis violaceo-purpurascens micante; tibis tarsiisque articulis 3 basilibus testaceis (apice singulo summo metallico).

Labro in altero specimine unicolori nigro, in altero lateraliter anguste flavo-marginato. Vitta elytrorum marginali flava valde dilacerata: impressionibus aut punctiformibus aut longitudinaliter-obliquis obscuris vel metallescentibus. Costa mediali paullo brevior quam laterali.

Aus derselben Quelle liegen mir einige Ex. der seltenen *Myrm. limpopoiana* Pér. vor. Diese Art ist recht variationsfähig: Die Oberlippe ♀ hat häufig nahe den Seitenrändern einen gelben Wisch¹⁾, andererseits kann sie auch einfarbig schwarz sein. Das gewöhnlich recht breit-bauchige ♀ ist bisweilen so schmal wie sonst das ♂. *Myrmecoptera speciosa* Pér. ist eine Varietät dieser Art, bei welcher die weiße Fld.-Zeichnung völlig ausgebildet ist. Das Charakteristikum der Species ist das Vorhandensein einer einzigen deutlich entwickelten Längsrippe, die in der Nähe der Naht verläuft.

Tetracha euphratica Oliv. var. *nigra*.

Differt a typo magnitudine multo minore, statura graciliore, corpore toto (partibus in typo testaceis exceptis) nigro opaco. — Long. 15—17 mill.

♀♂; Cairo (Kaeseberg).

¹⁾ Oberlippe ♂ weiß mit dunkler Basis und Spitze.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [1899](#)

Autor(en)/Author(s): Horn Walther Hermann Richard

Artikel/Article: [Nene afrikanische Cicindeliden. 381-382](#)