

14 G. Kraatz: *Ogmothorax* nov. gen. prope *Coenochilus* Schaum.

nach vorn und die Seiten sehr dicht punktirt, die Mittelfurche dicht punktirt, vorn und hinten abgekürzt. Scutellum dicht, seicht punktirt. Fld. oben ziemlich flach, eine Naht und drei Furchen auf dem Discus ziemlich tief, die Zwischenräume dicht, nach vorn weitläufiger, an den Seiten und hinten dicht und deutlich punktirt. Schulterbeule durch einen Längseindruck neben derselben ziemlich deutlich, Apicalbuckel undeutlich. Pygidium dicht gerunzelt, oben etwas flach gedrückt. Der vorletzte Hinterleibsring von den Fld. unbedeckt. Unterseite ziemlich dicht punktirt, die ersten Segmente weniger. Die kräftigen Vorderschienen sind nicht gezähnt, sondern am Aufsenrande zweimal sanft ausgebuchtet. Die Tarsen sind sehr kurz, die Glieder, namentlich an den Vorderfüßen, quer.

Ein Ex. vom Congo im Berliner Museum und eins im Mus. Meier-Darcis.

---

### Zwei neue *Trichius* aus Westafrika.

*Trichius podicalis*: *Infra* griseo-squamosus, *supra* opacus. *niger*, *thoracis lateribus inaequaliter discique linea media abbreviata griseis*, *elytris punctis parvis 3 basalibus et 3 mediis griseis*, *segmenti penultimi abdominis utrinque pygidioque albo-squamosus*, *hoc utrinque macula rotundata nigra notato*, *tibiis anticis 3 spinosis*. — Long. 7 mill.

Patria: Congo gall. (Kuilu) Mocquerys 1892.

Habituell und in der Zeichnung einem ostindischen *Trichius indicus* Janson (schwarze Form) verwandt, aber kleiner, die Bezeichnung der Vorderschienen sehr verschieden, die Fühlerkeule viel schwächer, schwarz mit den in der Diagnose erwähnten Zeichnungen aus grauem Toment. Clypeus an der Basis kaum eingedrückt. Halsschild schmaler als die Fld., an den Seiten stark gerundet, größte Breite hinter der Mitte, mit einem deutlichen stumpfen Winkel, die graue Beschuppung der Seiten innen zweimal tief ausgebuchtet, die hintere Hälfte des Discus mit weißer Mittellinie. Fld. schwarz mit drei Punkten an der Basis (einer neben dem Schildchen, einer neben und einer hinter der Schulter) und drei in der Mitte (von denen der innere etwas tiefer steht); die Innenspitze leicht abgerundet. Das vorletzte, oben sichtbare Segment ist jederseits dicht weiß beschuppt. Das Pygidium ist weiß be-

schuppt, jederseits mit einem ziemlich großen, runden, schwarzen Fleck. Die ganze Unterseite ist grau beschuppt. Die Hintertarsen sind viel länger als die Schienen; die Vorderschienen haben einen ziemlich langen, scharf zugespitzten, am Ende nach außen gekrümmten Zahn; der folgende ist spitz und deutlich, der dritte sehr schwach.

Ein Ex. in der Sammlung des Hrn. Meier-Darcis.

*Trichius tristichus*: Ater, opacus, subtus griseo-pubescent, thorace lateribus ante medium acute angulato, creberrime (ut pygidium) paullo fortius quam elytra punctato, tibiis anticis paullo fortius dentatis quam in specie praecedente. — Long. 7 mill.

Patria: Afr. occ. (Loanda).

Der vorhergehenden Art sehr ähnlich gebaut, jedoch etwas plumper, unten feiner grau beschuppt, oben einfarbig, matt schwarz. Der Bau des Halssch. ganz derselbe, d. h. die größte Breite hinter der Mitte, mit einem Dörnchen an der breitesten Stelle, von da ab nach vorn ziemlich stark verengt; vom Dorn geht eine schwach erhabene Leiste nach innen; unter derselben fällt der Seitenrand schräg ab; ähnlich ist es bei dem vorhergehenden. Die Fld. sind äußerst dicht und fein punktirt und behaart; Pygidium und Thorax sind nicht ganz so dicht, deutlicher punktirt. Der Zahn an den Vorderschienen vor dem Endzahn ist kräftiger als beim *podicalis*, der Endzahn gestreckter.

Ein Ex. in der Sammlung des Hrn. Meier-Darcis.

Da die Geschlechter bei den *Trichius* oft verschieden gebildet sind, wäre es denkbar, daß *tristichus* das ♀ von *podicalis* wäre, doch scheint es mir nicht sehr wahrscheinlich.

Bei dem geringen Material, welches mir vorliegt, habe ich die beiden Arten einfach als *Trichius* aufgeführt und keine eigene Gattung auf denselben errichten wollen.

Die habituelle Aehnlichkeit des *podicalis* mit dem ostindischen *indicus* ist groß.

Dr. G. Kraatz.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [1900](#)

Autor(en)/Author(s): Kraatz Gustav

Artikel/Article: [Zwei neue Trichius aus Westafrika. 14-15](#)