

Flecken in das weiße Mittelfeld hereinreichend, sowie umgekehrt kleine, weiße Flecken in den braunen Abschnitt eingestreut. Vorder-, Mittel- und Hinterbrust mit längeren Haarschuppen dicht besetzt. Mittelstück der Vorderbrust hellbraun mit eingestreuten weißen Schuppenhaaren, die Seitenplatten hellbraun und weiß gefleckt. Mittelbrust, Hinterbrust und Platten der Hinterhöften größtentheils hellbraun, nur die Mittelbrust in der Mitte mit sehr zahlreichen weißen Schuppenhaaren. Die Beschuppung des Bauches wie an der Oberseite; sämtliche Bauchringe mit Ausnahme des letzten größtentheils rein weiß, nur ein meistens dreieckiger Fleck vorn am Aufsensrande hellbraun; in der Mitte der Ringe nur vereinzelte hellbraune Schuppen. Hinterrand des vorletzten und der letzte Ring hellbraun, letzterer mit 2 kleinen weißen Flecken. Fühler braun, die Fortsätze graubraun; die Fühlerglieder mit hellbraunen Schüppchen besetzt, die Fortsätze beim ♂ mit äußerst kleinen, kaum sichtbaren graubraunen Schüppchen. Beine hellbraun und weiß gefleckt, ebenso die Tarsen, letztere fast ganz weiß.

Bei Ikutha in Englisch Ost-Afrika von meinem Freunde Hrn. Missionar Säuberlich gesammelt und von dem verstorbenen Dr. Candèze als *novum genus et nova species Elateridarum* erkannt.

---

### *Protaetia regalis* var. nov. *Horni* Kraatz.

*Corpore valido, gibbo, atro, supra opaca, thorace 6-punctato, elytris 8-guttatis, subtus nitida, pallide guttata.* — Long. 23 mill.

*Patria:* Ceylon (Matabele).

Diese, durch tief schwarze Färbung ausgezeichnete Var. der schönen, gedrungenen, kupferrothen *regalis* aus Vorderindien scheint in Ceylon nur sehr selten vorzukommen, denn Dr. Horn brachte nur 2 Ex. derselben mit (von denen er mir das eine freundlichst überliefs) und Neevoort van de Poll erwähnt in seiner Aufzählung der von J. Z. Kannegieter in Ceylon gesammelten Cetoniden (Leyden Notes XIII [1891] p. 87) auch nur 2 Ex.

Zum schweren Erkennen meines Ex. der var. *Horni* trägt der Umstand bei, daß die 4 Flecke in der Mitte des Halsschildes viel deutlicher hervortreten als bei meiner *regalis*. Der von Burmeister erwähnte Fleck am Vorderrande fehlt sowohl bei meiner *Horni* als bei meiner *regalis*.

Dr. G. Kraatz.

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [1900](#)

Autor(en)/Author(s): Kraatz Gustav

Artikel/Article: [Protaetia regalis var. nov. Horni Kraatz. 144](#)