

7 neue Cicindeliden

beschrieben von

Dr. med. **Walther Horn.***Ctenostoma simpliceps.*

Humeris distinctis, elytris cylindricis perparum rugatis, apice non hirsuto; capite crasso fere impunctato pone oculos non cristato, verticis strangulatione levi (collo crasso): species parva. — Long. 6 mill.

1 ♀; Rio Janeiro.

Ctenost. corculo Bat. simillimum; fronte fere plana, sulcis levissimis in summo vertice evanescentibus, tota superficie leviter breviterque rugata; prothorace paullo ampliore, supra levissime rugato, punctis piligeris deficientibus; elytris longioribus, humeris minus prominentibus, spina apicali juxta-suturali nulla, apicali exteriore longius prominente, sculptura fere eadem sed in parte posteriore (pone fasciam mediam) paullo densiore, apice non flavescente (solummodo spina longa brunnea), palpis distaliter obscurioribus; pedibus (semper?) rarius longe pilosis.

Die kleine Art paßt in keine der von mir aufgestellten Untergruppen. Die vordere Hälfte der Fld. ist dicht punktirt und bilden sich hier und da Anfänge von Runzeln (ähnlich wie bei *Ct. corculum* Bat.). Hinter der Mitte stehen alle Punkte deutlich getrennt. Eine Reihe größerer, lange schwarze Haare tragender Grübchen ist parallel der Naht gestellt. Im ersten Viertel sind die Fld. neben der Naht indistinct hellbraun entfärbt, wie dies auch bei der Bates'schen Art vorkommt. Die Mittelbinde ist dunkler als bei jener und dicht punktirt, die ganze Naht (vor der Mitte sehr schmal) hell bräunlich. Kopf und Halsschild sind deutlich plumper gebaut, Orbital-Cristae fehlen ganz. Beine (Schenkel nach anssen dunkler), Hüften, Trochanteren, 4 ersten Fühlerglieder und Oberlippe bräunlich-gelblich.

Tricondyla Gounelli.

Pronoto longo parallelo, elytris subtiliter et sat discrete sculptis. — Long. 21½ mill. (sine labro).

1 ♀; Ramnad (Hindustania: P. Fabre 1883/4 collegit). Ab amico meo Gounelle, Francogallo illo faunae Brasiliensis exploratore, cuius in collectione specimen unicum fuit, liberalissime mihi data.

Tric. granuliferae Motsch. affinis; statura minore; orbitis densius grossiusque rugatis; pronoto duplo rarius multoque levius (levissime!) transversim striolato; elytris paullo brevioribus, in medio minus angustis, sculptura valde differente: tota superficie impressionibus punctiformibus paullulam transversis subtilibus satque levibus ornata, in dimidia parte antica his „punctis transversis“ saepissime 2—3 in directione transversali confluentibus, ut lineae irregulares undulatae breves leviter formenter aut formatae videantur, in medio punctis sensim magis separatis, ante apicem fere disparentibus; prothoracis episternis levius sculptis; palpis nigris, labro et 4 primis antennarum articulis nigro-metallicis (3^o et 4^o distaliter rufo-annulatis); unguiculis longioribus.

Diese südindische Art ist durch ihre feine und weniger dichte Fld.-Skulptur ohne Weiteres von den anderen echten Tricondylen mit parallel-cylindrischem Halssch. zu unterscheiden. Die Skulptur ist nicht sieb- noch netzförmig, sondern besteht aus kurzen queren, nicht sehr tiefen, punktförmigen Eindrücken, die auf der vorderen Hälfte häufig (der Quere nach 2—3) zu kurzen (wenig scharf gebildeten: manchmal nur scheinbar) unregelmäßigen Wellenlinien zusammenfließen. An der Naht und nach dem Rande zu stehen die Punkte spärlicher. Von der Mitte ab werden die Eindrücke reiner punktförmig und weniger dicht. Vor der Spitze und an der Randparthie der ganzen hinteren Hälfte sind sie sehr fein und spärlich.

Heptodonta Arrowi.

H. Eugeniae Chd. affinis; differt labro paullo longiore, parte media dentes 5 includente evidentius (aequaliter!) producta; capite supra pronotoque paullo rugosius grossiusque sculptis; elytris planioribus, impressione ante apicem minus profunda, sculptura multo subtiliore, rugis deficientibus. Colore supra sordide cupro-aeo, capite pronotoque hinc inde perparum viridescens; elytris ad marginem cyanescens, inter hanc partem lateralem et discum viridescens; subtus viridescens, abdominis basi et lateribus, pro- et mesothoracis episternis cyanescens. — Long. 10 mill. (sine labro).

1 ♂; N. Chin Hills: Burma. A Museo Britannico (Dom. Arrow), in qua collectione alterum ♂ vidi, mihi liberalissime datum.

Labro (margine libero obscuro), palpis (articulo ultimo brunnescente), trochanteribus, coxis (parte basali coxae posticae viridimetallica), femoribus, dimidia parte proximali tibiaram flavis.

Capite paullo, pronoto sat grossius sculptis quam in *H. posticali* Wht.; elytris multo subtilius, levius, densius punctatis etc.

Labri dentibus 5 medianis multo minus productis quam in *H. Ferrarii* Gestro et *pulchella* Hope (*Hopei* Parry); sculptura frontis, verticis, pronoti evidenter grossiore, oculis magis prominentibus; elytris paullo subtilius et multo densius sculptis (sed punctis fere nusquam confluentibus), ad apicem magis declivibus minusque prolongato-productis (brevius rotundatis), apice singulo ante summam extremitatem non oblique-intus truncato sed simpliciter rotundato-curvato (angulo suturali recto).

Myrmecoptera Batesi.

Myrm. Schaumi m. *simillima*; differt statura etiam minore, fronte verticeque sine macula cupreo-aenescente; thorace brevior, parte media valde crassiore (globose), vitta centrali metallica nulla, margine vix aenescente, rugis parallelis (partis centralis) minus regularibus; elytris brevioribus, postice paullo magis inflatis, spinam versus non simpliciter prolongato-attenuatis, sed brevius rotundatis, apice anguste truncato (angulo externo rotundato, suturali fere aequae longe spinoso atque in illa sp.), elytrorum sculptura paullo subtiliore, rugis obliquis (septis non confluentibus) nullis, reticulo in disco et ante apicem difficiliter visibili; macula flavescens basali minore, postica minus dilacerata sed in partes duas divisa (posteriore striam brevem angustam marginalem ante spinam formante, anteriore angulata [stria angusta marginali angulum paullo minorem quam rectum cum parte clavata (brevior quam in *M. Schaumi*) in discum prominente constituyente]); trochanteribus obscuris, pedibus totis nigro-metallicis, tibiis proximaliter brunnescentibus. — Long. 10 mill. (sine labro).

1 ♂; Stony Athi (Africa orient. Britann. — Le Gros collegit). Ab amico F. Bates, cuius in collectione superba specimina 2 altera vidi, mihi datum.

Diese zierliche Art ist kleiner und dabei gedrungenere als *M. Schaumi* m. Die Differenz im Halsschild-Bau ist recht erheblich. Die Spitzenzeichnung besteht aus einer compacteren gelblichen Masse, die weder durch Schräg- noch Längsfurchen zerrissen ist (dabei ist sie schmaler und der auf die Scheibe vorspringende Theil trägt einen verdickten Endknopf, welcher von der Naht erheblich weiter entfernt bleibt). Färbung und Behaarung der Unterseite identisch. Metallische Gruben-Reihe neben der Naht nicht sichtbar.

Cicindela declivis.

Cic. barbatae m. (*C. funeratae* Boisd. subsp.) *simillima*, differt labro antice ♂ sat, ♀ valde triangulariter producto (magis quam in illa ♀), dente medio validiore; capite graciliore, rugis suborbitalibus grossioribus; thorace angustiore, magis cylindrico (antice multo minus dilatato, vix magis quam postice constricto), lateribus (supra) nudis; elytrorum margine laterali multo minus planato, sat declivi et evidenter cupreo-aeneo-subnitente (sculptura paullulum levigata); signatura fere eadem: maculis vix angustioribus, linea marginali subapicali interdum, marginali media semper deficiente; juxta apicem striae subtransversalis discoidalis (brevioris, angustioris, non clavatae) foveolis nonnullis magnis viridescensibus insculptis (ceteris foveolis aequae atque in illa spec.); pubescentia corporis inferioris evidenter sparsiore, malis nudis; pedibus obscurius metallicis, femoribus ante apicem angustissime testaceo-annulatis. — Long. $8\frac{1}{2}$ — $9\frac{1}{2}$ mill.

1 ♂ (coll. mea), 1 ♀♂ (coll. R. a Bennigsen). Ab amico meo, R. a Bennigsen, regio Novae Guineae praefecto, collecta: Bismarck Archip. (Gazelle paeninsula et Montes Baining).

Lunula humerali semper interrupta, 1^o et 2^o antennarum articulo obscure sordide-metallicis, 3^o et 4^o cyaneo-purpureis.

Cic. variolosae Bl. affinis, differt clypeo nudo; striis suborbitalibus paullo grossioribus; forma thoracis; elytrorum signatura, margine laterali declivi subnitente, foveolis discoidalibus (vide supra!) etc.

Cic. Boisduvali m. item affinis, differt capite minore, clypeo fronteque nudis etc.; thorace angustiore magis cylindrico, pronoti lateribus nudis etc.; elytrorum signatura, margine, foveolis etc. (♀ sine speculo).

Oxychila Haenschi.

Ox. nigro-aeneae Bat. *simillima*, differt labro angustiore; angulis humeralibus magis prominentibus, elytrorum sculptura vix grossiore sed ante medium multo densiore, apice singulo anguste transversim truncato (angulis parum acutis); palpis omnibus pallidis; episternis metathoracis ad marginem lateralem breviter transversuliter rugatis. — Long. 17 mill. (sine labro).

1 ♂; Napo (Ecuadoria oriental.), ab exploratore R. Haensch anno 1899/1900 collectum.

Corpore toto (subtus opaco, supra valde nitente), labro, antennis, pedibus, trochanteribus nigris. Pronoto ad basim, apicem et latera levissime sculpto.

Species nova differt ab *Ox. Chestertoni* Bat. corpore supra valde nitente, labro multo angustiore satque longiore; oculis magis prominentibus; elytris minus elongato-parallelis, angulo humerali magis prominente, apice singulo anguste sed distincte truncato, ante medium densius grossiusque, postea paullo rarius sculptis; colore palporum femorumque etc.

Differt ab *Ox. Germaini* Flt. corpore supra nitente, oculis magis prominentibus; elytris longioribus, antice paullo densius, postice paullo rarius sculptis, apice singulo truncato; colore antennarum pedumque etc.

Oxychila affinis.

Ox. nigro-aeenae Bat. similis, differt corpore supra multo minus nitente (non omnino opaco!); pronoto paullo magis ruguloso, ante angulum basalem tuberculo perparvo rotundato ornato; elytris paullo grossius, ante medium evidenter densius, pone medium paullo crebrius punctatis, apice singulo extremo truncato (angulo externo rotundato, suturali sat recto); 5^o—11^o antennarum articulis, palpis, pedibus (unoquoque articulo summa extremitate angustissime nigro) flavis, femoribus cum trochanteribus totis nigris. — Long. 19 mill. (sine labro).

1 ♂; Ecuador.

Pronoti basi apiceque levissime rugulosis, partis centralis lateribus breviter transversim striolatis, disco ipso levigato.

Ox. Chestertoni Bat. differt statura tota graciliore angustioreque; labro latiore; thorace antice multo, postice paullo magis angustato, tuberculis basalibus deficientibus, superficie magis levigata; coloratione pedum, palporum, antennarum.

Ox. Germaini Flt. discrepat statura brevior; pronoto minus ruguloso, antice magis angustato, tuberculis basalibus nullis; elytrorum angulo humerali magis prominente, his in medio ovato-dilatatis, apice singulo non truncato.

Ox. aquatica Guér. differt corpore supra magis opaco; labro latiore; thorace graciliore antice magis angustato, tuberculis basalibus deficientibus; elytris paullo minus parallelis; coloratione labri, antennarum, femorum.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [1900](#)

Autor(en)/Author(s): Horn Walther Hermann Richard

Artikel/Article: [7 neue Cicindeliden 361-365](#)