

winkelig, Vorderecken abgerundet, Seitenrandleiste schmal, bewimpert. Fld. weniger dicht, doch stärker als das Halssch. punktiert, mit 2 oder 3 kurzen, fast regelmässigen, nach aussen gebogenen kräftigen Punktreihen neben der Naht im ersten Drittel. Diese Reihen sind bei abgeriebenen Stücken sehr deutlich. Bauchlinien vollständig, ziemlich klein; sie reichen bis zur Mitte des Segmentes und endigen neben der Aufsenecke der Hüftpfannen, vom Seitenrande entfernt. Die Klauen haben in der Mitte einen mässig spitzen Zahn.

Die Art unterscheidet sich von *notivestis*, wenn deren Beschreibungen von Mulsant und Crotch<sup>1)</sup> richtig sind, namentlich dadurch, dafs die rothe Längsmakel nicht in  $\frac{1}{4}$  bis  $\frac{2}{3}$  der Länge liegt, die Bauchlinien nicht  $\frac{5}{8}$  des Ringes erreichen und dafs die Klauen nicht einfach sind; aber beide dürften zu derselben Gattung gehören, die ich *Empia* nenne und die von *Aulis* durch die ebenen Seitenstücke der Vorderbrust unbedingt abweicht.

<sup>1)</sup> In der Revision p. 294 fehlt *Aulis rufovittata* Mls. Opusc. 1853, 135. Brasilia.

### *Aspidomorpha Gorhami.*

*Ovata, testacea (viridis), antennis articulis 2 ultimis sternoque medio nigris, elytris sat fortiter crebreque punctato-striatis, punctis plurimis brunneo tinctis, interstitiis angustis nonnullis subcostatis, protecto explanato limbo crasso sat fortiter reflexo.* — Long. 9 mill.

Hab. in foliis *Solani*. Natal: Estcourt (Gorham).

Von der sehr ähnlichen *Asp. adjuncta* Ws. leicht durch die viel dichtere und etwas feinere Punktirung der Fld. verschieden, auf denen mehrere Zwischenstreifen, namentlich der 1., 2. und 4. rippenförmig sind. Das Seitendach wird von der Scheibe durch eine dichte Punktreihe, aber nicht durch eine weitläufige Grubenreihe abgesetzt. Das Thier ist im Leben grün, nach dem Tode bräunlich gelb, die grössere Hälfte der Punkte auf den Fld. braun, Glied 9 der Fühler an der Spitze angedunkelt, 10 und 11 schwarz, eine Längsbinde über Pro- und Mesosternum und die Mittelrinne des Metasternums schwarz. Punktstreifen der Fld. dicht punktiert, hier und da durch schmale Zwischenwände unterbrochen; Seitendach muldenförmig, dicht punktiert.

Ich widme die Art Hrn. Gorham, von dem ich sie erhielt.

J. Weise.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [1900](#)

Autor(en)/Author(s): Weise Julius

Artikel/Article: [Aspidomorpha Gorhami. 445](#)