

- 10" Fld. mit 3 deutlichen Dorsalrippen, die 3. dem Seitenrande sehr genähert und vorn mit diesem verschmolzen; Halssch. dreimal so breit als lang.
- 11" Die 2. Dorsalrippe nach vorn verkürzt, Halsschild fein und spärlich granulirt, ohne erhabene Mittellinie. — Nord-china: Gan-ssu, Jantscheu, Chua-Tschensa. — Große Stücke sind: *obesa* Friv. (nec Reitt.) *Reitteri* Friv.
- 11' Die 2. Dorsalrippe ist vorne nicht verkürzt, Halsschild dichter und stark granulirt, mit erhabener Mittellinie. — China: Gan-ssu, Scu-esou-fu. *parvula* Friv.
- 10' Fld. mit 1—2 Dorsalrippen; ist eine dritte an den Seiten schwach angedeutet, so steht sie in der Mitte zwischen der zweiten und der gezähnten Randrippe.
- 12" Fld. mit 2 Dorsalrippen, beide nach hinten stark, die äußere stärker verkürzt, die innere meist nur an der Basis deutlich. Halsschild reichlich dreimal so breit als lang, oben dicht granulirt, mit der Spur einer kurzen Mittellinie. — Nord-Thibet. *Amandana* Reitt.
- 12' Fld. mit einer starken, hinten verkürzten Dorsalrippe, selten zwischen dieser und dem gezähnten Seitenrande mit 2 schwach angedeuteten Körnchenreihen. Halsschild reichlich doppelt so lang als breit¹⁾. — Nord-China: Bulak, Toksun, Kosa; Mongolia: Kurutsch-Dagh.

Loczyi Friv.

1) Dieser Art sehr ähnlich ist wohl die mir unbekannte *Pt. brevicollis* Mén. von Baccali-tau, aber durch den viel breiteren Thorax unterschieden.

Baris perlucida n. sp.

In meiner Tabelle der Gattung *Baris*, p. 18, hat sich die *B. dalmatina* aus dem Kaukasus und Araxesthal als eine von *dalmatina* vera (aus Velebit, Dalmatien, Polen, Frankreich etc.) verschiedene Art erwiesen. Die Beschreibung a. a. O. ist nach der *perlucida* verfaßt, nachdem mir die echte *dalmatina* erst jetzt bekannt wurde. Die letztere ist der *perlucida* sehr ähnlich, aber weniger schlank, schwach glänzend, fast matt, am Halsschild stärker, weitläufiger punktiert, die Punkte an den Seiten flacher, neben der punktfreien Mittellinie tiefer, die Fld. sind vorne stärker, hinten feiner gestreift, die Punktreihe auf den Zwischenräumen deutlicher, hauptsächlich aber durch eine Querdepression verschieden, welche sich hinter ihrer Basis befindet, die bei der *perlucida* fehlt. Wegen der letzteren Eigenschaft hat die *dalmatina* ihren richtigen Platz hinter *morio*. Edm. Reitter.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [1901](#)

Autor(en)/Author(s): Reitter Edmund

Artikel/Article: [Baris perlucida n. sp. 192](#)