

Zwei neue europäische Coleopteren.

Beschrieben von **E. Wasmann** S. J. (Luxemburg).

Aleochara (Polystoma) helgolandica n. sp.

Nigra, opaca, breviter flavo-pubescentis, abdomine vix subnitido, capite grosse punctato, antennis capite thoraceque brevioribus, apicem versus incrassatis, art. 7—10 transversis, 11^o duobus praecedentibus unitis aequali. Prothorax dense subtiliter punctatus, lateribus basin versus minus rotundatis, angulis posticis obtusis. Elytra dense subtiliter punctata. Abdomen grossius sed parce punctatum, praesertim versus apicem. Antennae piceae, pedes rufopicei. — Long. 5 mill.

Bedeutend größer als *Aleochara algarum* Fvl., mit der sie zunächst verwandt ist. Sie unterscheidet sich von ihr überdies durch die viel kürzere, aber dichtere, gelbe, nicht grauliche Behaarung, durch das seitlich nach hinten weniger gerundete Halsschild, dessen Hinterecken deutlich stumpfwinklig sind, sowie durch die viel dichtere Punktirung des Halssch. und die gröbere Punktirung des Hinterleibes.

Ein Ex. dieser grossen neuen Art wurde von mir und Herrn V. Ferrant zugleich mit *Al. algarum* Fvl. am Strande von Helgoland an der Brandungszone unter Steinen gefunden am 18. Aug. 1901, bei dem Besuche des V. Internationalen Zoologen-Congresses auf jener Insel.

In Bernhauer's Tabelle (Bestimmungstab. Heft XLIII) zwischen *algarum* und *obscurella* einzureihen, denen sie sich durch den völlig glanzlosen Vorderkörper anschliesst.

Bacanius termitophilus n. sp.

Minimus, nigropiceus, nitidus, thorace (excepta basi laevi infra lineam transversalem) elytrisque aequaliter omnino distincte et modice dense punctatis, punctis oblongis; linea transversalis thoracis ante scutellum in medio paullo sinuata, latera versus recta; (scutellum haud visibile; elytrorum stria subhumerali nulla, linea marginali distincta.) — Long. 0,6—0,8 mill.

Mit *Bac. punctulus* Rtrr. aus dem Caucasus zunächst verwandt, nach diesem in Schmidt's Bestimmungstabelle (XIV) einzureihen. Die neue Art unterscheidet sich von *punctulus* durch die gleichmässige, deutliche und ziemlich kräftige Punktirung von Halsschild und Flgd, durch die längliche Form der Punkte, sowie durch die Form der basalen Querlinie des Halssch.; diese ist nämlich nur gegen die Seiten gerade, in der Mitte jedoch deutlich bogenförmig, die convexe Seite des Bogens gegen die Halsschildspitze gekehrt; andererseits springt sie jedoch nicht winklig (wie bei *rhombophorus* Aubé) nach vorn vor, sondern nur in einem flachen Bogen.

Mehrere Ex. dieser winzigen, einer Acarine der Gattung *Oribata* täuschend ähnlichen Histeriden-Art wurden von Hrn. Jaime Pujula S. J. zu Tortosa (Spanien) in einem Neste von *Termes lucifugus* Rossi entdeckt, das sich in einem alten Holzfahl befand.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [1902](#)

Autor(en)/Author(s): Wasmann Erich P.S.J.

Artikel/Article: [Zwei neue europäische Coleopteren. 16](#)