

Verzeichnifs der von Dr. Schultheifs 1884—85 in
N.-O.-Sumatra (Tebing tinggi) gesammelten Cleriden¹⁾.

Gegeben von

Sigmund Schenkling, Hamburg.

1. *Cylidrus Wallacei* Thoms.
2. - *Wallacei* Thoms. var. *sumatranus* Kr.
3. *Tillus notatus* Kl.
4. *Callimerus propinquus* Schklg. (= *bellus* Gorb. v. *sumatranus* Kr.).
5. - *niveus* Gorb.
6. - *pectoralis* Schklg.
7. - *nigromarginatus* Kuw. (*Caloclerus* Kuw.).
8. *Tillicera cleroides* Gorb.
9. *Thanasimus anthicoides* Westw.
10. *Orthrius tarsalis* Gorb.
11. *Stigmatium granulosum* Westw.
12. - *cicindeloides* Gr.
13. - *dilatatum* Kuw.
14. *Dasyceroclerus ambulator* Westw.
15. - spec.
16. *Rhytidoclerus basipennis* Chev.
17. *Phaeocyclotomus tapetum* Gorb.
18. - spec.
19. *Ommadius* spec. nov.
20. - *indicus* Cast.
21. - *seticornis* Westw.
22. - *fasciipes* Westw.
23. *Tenerus signaticollis* Cast. mit var. *marginipennis* Gestr.

Diese Art ist weit verbreitet und in Gröfse und Färbung äufserst variabel. Nach Castelnau und Spinola sind die Fld. gelbbraun und haben eine schwarze Spitze. Gorham erwähnt (Ann. Soc. Ent. Belg. 1895, p. 297) ein Ex. von Hinterindien (Tharrawaddy) mit ganz gelben Fld. und ein anderes von Rangun, das aufser dem schwarzen Spitzenfleck noch einen schwarzen Schulterwisch hat. Vor mir liegen 2 Ex., deren Fld. ganz schwarz sind. Bei der var. *marginipennis* Gestro sind die Naht und der Seitenrand der schwarzen Fld. schmal gelb; bei var. *binotatus* Chev. ist aufserdem ein bindenartiger Rand-

¹⁾ Dieselben wurden mir von Hrn. Dr. Kraatz, der die Sammlung des Hrn. Dr. Schultheifs gekauft hat, freundlichst übersandt.

fleck hinten auf den schwarzen Fld. gelb. Der bis gegen die Mitte reichende Kiel der Fld. ist immer deutlich. Das Schildchen ist auch bei den schwarzen Stücken rothgelb. Die beiden Flecke auf dem Halssch. sind bald grofs und berühren den Vorderrand und manchmal sich selbst, bald klein und stehen dann etwas von dem Vorderrande entfernt.

24. *Tenerus siamensis* Gorh. var. *elytrorum marginibus nigris*.

25. *Tenerus sanguineus* Schklg.

Bei dieser Art nimmt die schwarze Färbung auf der Oberseite manchmal so überhand, dafs sie zur herrschenden wird. Mitunter steht die Pubescenz auf den Fld. in 4 Reihen, ähnlich wie bei *Ten. siamensis* Gorh.; daraus geht die Verwandtschaft der beiden Arten mit *Ten. cingalensis* White und *Ten. Parryanus* Gorh. hervor, welche auf den Fld. 4 Längsrippen haben.

26. *Tenerus chalybaeus* Gorh.

Von dieser Species liegen 4 Stücke vor (eins von Malacca), die in der Sculptur — dicht körnig punktirt, fast gerunzelte Fld., ohne Rippen, glattes, glänzendes Halssch. — völlig übereinstimmen, die Farbe ist jedoch bei einem Ex. blau, bei den 3 andern violett; 2 der letzteren weichen ferner in der Gröfse ab, indem sie nur 5,5 resp. 5 mill. lang sind, während Gorham $3\frac{1}{2}$ lin. angiebt.

27. *Tenerus simillimus* spec. nov.

Flavo-brunneus, vix nitidus, dense pubescens, capite nigro vel brunneo, dense subtiliter punctulato, antennis brunneis, prothorace indistincte parum dense punctato, interdum fere asperulo, flavo, irregulariter rufo vel brunneo umbrato, elytris densissime subtilissime punctulatis, haud costatis, genibus tarsisque infuscatis. — Long. 10—15 mill.

Diese Art ist dem *Ten. brunniceps* Schklg. (Stett. Ent. Zeit. 1902) äufserst ähnlich. Die Oberseite ist aber weniger glänzend, auch fehlen die längeren Haare zwischen der kurzen Pubescenz. Die Fühler sind braun. Das Halssch. ist sehr undeutlich punktirt, bei einem Ex. theilweise etwas rauh, fast runzelig gekörnt, der Vorderrand ist nicht breit braun gesäumt. Die Fld. sind feiner punktirt und haben keinen Kiel. An den Beinen sind die Kniee in sehr geringer Ausdehnung und die Tarsen auf der Oberseite gebräunt.

Im Museum Leyden und in meiner Sammlung finden sich einige Ex. dieser Art aus Tandjong Morawa (Nordost-Sumatra).

28. *Tenerus* spec.

29. *Necrobia rufipes* Degeer.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [1902](#)

Autor(en)/Author(s): Schenkling Sigmund

Artikel/Article: [Verzeichnis der von Dr. Schultheiß 1884-85 in N.-O.-Sumatra \(Tebing tinggi\) gesammelten Cleriden 111-112](#)