Verzeichnifs der von Dr. Schultheifs 1884-85 in N.-O.-Sumatra (Tebing tinggi) gesammelten Cleriden¹).

Gegeben von

Sigmund Schenkling, Hamburg.

- Cylidrus Wallacei Thoms. 1.
- 2. Wallacei Thoms. var. sumatranus Kr.
- Tillus notatus Kl. 3.
- Callimerus propinquus Schklg. (= bellus Gorh. v. sumatranus Kr.).
- niveus Gorh. 5.
- 6. pectoralis Schklg.
- nigromarginatus Kuw. (Caloclerus Kuw.). 7.
- 8. Tillicera cleroides Gorh.
- 9. Thanasimus anthicoides Westw.
- Orthrius tarsalis Gorh. 10.
- 11. Stigmatium granulosum Westw.
- 12. cicindeloides Gr
- 13. dilatum Kuw.
- Dasyceroclerus ambulator Westw. 14.
- 15. spec.
- Rhytidoclerus basipennis Chevr. 16.
- 17. Phaeocyclotomus tapetum Gorh.
- 18. spec.
- 19. Ommadius spec. nov.
- 20. indicus Cast.
- 21. seticornis Westw.
- 22. fasciipes Westw.
- 23. Tenerus signaticollis Cast. mit var. marginipennis Gestr.

Diese Art ist weit verbreitet und in Größe und Färbung äußerst variabel. Nach Castelnau und Spinola sind die Fld. gelbbraun und haben eine schwarze Spitze. Gorham erwähnt (Ann. Soc. Ent. Belg. 1895, p. 297) ein Ex. von Hinterindien (Tharrawaddy) mit ganz gelben Fld. und ein anderes von Rangun, das außer dem schwarzen Spitzenfleck noch einen schwarzen Schulterwisch hat. Vor mir liegen 2 Ex., deren Fld. ganz schwarz sind. Bei der var. marginipennis Gestro sind die Naht und der Seitenrand der schwarzen Fld. schmal gelb; bei var. binotatus Chev. ist außerdem ein bindenartiger Rand-

¹⁾ Dieselben wurden mir von Hrn. Dr. Kraatz, der die Sammlung des Hrn. Dr. Schultheiss gekauft hat, freundlichst übersandt.

112 S. Schenkling: Verzeichnifs in N.O.-Sumatra gesammelter Cleriden.

fleck hinten auf den schwarzen Fld. gelb. Der bis gegen die Mitte reichende Kiel der Fld. ist immer deutlich. Das Schildchen ist auch bei den schwarzen Stücken rothgelb. Die beiden Flecke auf dem Halssch. sind bald groß und berühren den Vorderrand und manchmal sich selbst, bald klein und stehen dann etwas von dem Vorderrande entfernt.

- 24. Tenerus siamensis Gorh. var. elytrorum marginibus nigris.
- 25. Tenerus sanguineus Schklg.

Bei dieser Art nimmt die schwarze Färbung auf der Oberseite manchmal so überhand, dass sie zur herrschenden wird. Mitunter steht die Pubescenz auf den Fld. in 4 Reihen, ähnlich wie bei Ten. siamensis Gorh.; daraus geht die Verwandtschaft der beiden Arten mit Ten. cingalensis White und Ten. Parryanus Gorh. hervor, welche auf den Fld. 4 Längsrippen haben.

26. Tenerus chalybaeus Gorh.

Von dieser Species liegen 4 Stücke vor (eins von Malacca), die in der Sculptur — dicht körnig punktirte, fast gerunzelte Fld., ohne Rippen, glattes, glänzendes Hlssch. — völlig übereinstimmen, die Farbe ist jedoch bei einem Ex. blau, bei den 3 andern violett; 2 der letzteren weichen ferner in der Größe ab, indem sie nur 5,5 resp. 5 mill. lang sind, während Gorham $3\frac{1}{2}$ lin. angiebt.

27. Tenerus simillimus spec. nov.

Flavo-brunneus, vix nitidus, dense pubescens, capite nigro vel brunneo, dense subtiliter punctulato, antennis brunneis, prothorace indistincte parum dense punctato, interdum fere asperulo, flavo, irregulariter rufo vel brunneo umbroso, elytris densissime subtilissime punctulatis, haud costatis, genubus tarsisque infuscatis. — Long. 10—15 mill.

Diese Art ist dem Ten. brunniceps Schklg. (Stett. Ent. Zeit. 1902) äußerst ähnlich. Die Oberseite ist aber weniger glänzend, auch fehlen die längeren Haare zwischen der kurzen Pubescenz. Die Fühler sind braun. Das Halssch. ist sehr undeutlich punktirt, bei einem Ex. theilweise etwas rauh, fast runzelig gekörnt, der Vorderrand ist nicht breit braun gesäumt. Die Fld. sind feiner punktirt und haben keinen Kiel. An den Beinen sind die Kniee in sehr geringer Ausdehnung und die Tarsen auf der Oberseite gebräunt.

Im Museum Leyden und in meiner Sammlung finden sich einige Ex. dieser Art aus Tandjong Morawa (Nordost-Sumatra).

- 28. Tenerus spec.
- 29. Necrobia rufipes Degeer.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: <u>Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung)</u>

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: 1902

Autor(en)/Author(s): Schenkling Sigmund

Artikel/Article: Verzeichnis der von Dr. Schultheiß 1884-85 in N.-O.-

Sumatra (Tebing tinggi) gesammelten Cleriden 111-112