

Ein neuer mexicanischer *Conurus*.

Beschrieben von

K. Schubert (Pankow-Berlin).

Conurus subpubescens.

Rufo-brunneus, subnitidus, subpubescens, antennis pedibusque testaceis; antennis caput thoraceque superantibus; elytris thorace multo longioribus, densius subtiliusque punctatis; abdominis segmentes posterioribus setaceis. — Long. 3 mill.

Mexico (Motzerongo).

Den helleren Stücken von *Conurus pubescens* Gravh. ähnlich, aber viel kleiner, mit geringerer Pubescens.

Der Kopf ist glatt und glänzend, nicht punktirt, nach den Augen und Schläfen zu undicht, gelblich behaart. Die Fühler sind schlank, länger als Kopf und Halsschild zusammen, nach der Spitze zu schwach verdickt, das Endglied kaum länger als das vorletzte.

Das Halsschild ist hochgewölbt, nach vorn verengt, verloschen punktirt, mit ziemlich undichter, nach den Seiten hin zunehmender Behaarung. Die Vorderwinkel sind rechtwinklig, stark herabgebogen, die Hinterwinkel scharf stumpfwinklig.

Das Schildchen ist klein, aber deutlich sichtbar.

Die Flügeldecken sind deutlich länger als das Halsschild, nach hinten wenig verengt, rothbraun, mit dunkler Naht, außen fein gerandet, äußerst fein, ziemlich dicht punktirt, mäfsig fein und dicht behaart.

Das Abdomen trägt auf dem 2. bis 4. Dorsalsegment jederseits ein sehr feines Borstenhöckerchen; die hinteren Segmente sind an den Seiten mit langen, kräftigen Borsten besetzt.

Die Beine sind gelb.

In zwei Exemplaren von Hrn. v. Oertzen im Tausch erhalten.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [1902](#)

Autor(en)/Author(s): Schubert K.

Artikel/Article: [Ein neuer mexicanischer Conurus. 410](#)