

27. *Monocrepidius alternatus*.

Brunneus, dense flavo-cinereo-pilosus; fronte antice leviter impresso, vertice carinulata, creberrime punctata; antennis rufo-brunneis, tenuibus; prothorace latitudine longiore, antice rotundatim angustato, minus dense subinaequaliter punctato, canaliculato, maculis duabus densius pilosis ornato, angulis posticis divaricatis, acutis, sat elongatis, carinatis; elytris prothoracis latitudine, a medio rotundatim angustatis, punctato-striatis, interstitiis dense subtiliter punctulatis, imparibus densius pilosis, apice in singulis truncatis; corpore subtus fusca, pedibus brunneis. — Long. 16—20 mill., lat. $4\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{4}$ mill.

Süd-Australien.

Heller oder dunklen braun, dicht gelblich-grau behaart. Die Stirn ist vorn leicht eingedrückt, an der Basis mit feiner, erhabener Längslinie, dicht und ziemlich stark punktirt. Die Fühler sind rothbraun, ziemlich dünn, wenig gesägt und überragen die Hinterecken des Halssch. um 1 Glied. Das Halssch. ist länger als breit, vorn gerundet verengt, weniger dicht als die Stirn und etwas ungleich punktirt, mit feiner, bis zum Vorderrande reichender Mittelfurche, und mit 2 dichter behaarten Makeln auf der Scheibe, die, wenn abgerieben, durch feinere und dichtere Punktirung zu erkennen, die Hinterecken sind ziemlich lang und spitz, gekielt. Die Fld. sind so breit wie das Halssch., von der Mitte an gerundet verengt, an der Spitze einzeln abgestutzt und sehr schwach etwas ausgerundet, punktirt-gestreift, die abwechselnden Zwischenräume dichter behaart. Die Unterseite ist etwas dunkler als die Oberseite, die Ränder der Mesosternalgrube sind erhaben und parallel, die Abdominalsegmente am Außenrande mit einem dichter behaarten Fleck, die Beine sind braunroth, die Schenkel zuweilen schwärzlich.

Durch die beiden dicht behaarten Discoidalmakeln des Hlssch. und die dichtere Behaarung der abwechselnden Zwischenräume der Fld. besonders ausgezeichnet.

Verbesserungen.

In meinem letzten Artikel über afrikanische Chrysomeliden, im Archiv für Naturgesch. 1903, I, 2, sind folgende Fehler zu verbessern:

- p. 212 ist für *Monolepta discoidea* der Name „*cincta*“ anzuwenden;
 p. 213 Reihe 5 von unten *ferruginea* in „*mombonensis*“ zu ändern.

J. Weise.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [1903](#)

Autor(en)/Author(s): Weise Julius

Artikel/Article: [Verbesserungen. 398](#)