

3 neue Cicindeliden vom tropischen Ost-Afrika.

Beschrieben von
Dr. med. Walther Horn.

Dromica (Myrmecoptera) Hildebrandti nov. sp.

Myrm. nobilitatae Gerst. *similis*, *statura minore robustioreque*; *labri dentibus 3 mediis paullo magis productis*; *oculis vix minus prominentibus*, *rugis frontalibus pronotalibusque irregularibus*; *prothorace valde breviore*, *antice dilatato*, *basi ipsa constricta magisque transversim rugata*, *linea longitudinali mediana minus distincta*, *strictura apicali profundiore*; *scutello grossius transversaliter striato*; *elytris brevioribus ovalioribus* (*minus oviformibus*), *apice singulo magis rotundato* (*sutura magis retracta*), *sculptura fere eadem sed omnino paullo subtiliore densioreque*, *costis 5 indistinctioribus*, *3 lateralibus pone medium fere deficientibus*, *signatura albescente reducta*: *macula transversa* (*intus paullulum clavata*) *pone medium margini approximata* (*a sutura longe distante*), *stria marginali oblongo-ovali ante apicem*. *Corpo supra opaco* (*non hinc inde metallice subsplendente*); *mesothoracis episternis* (*postice sparsim punctato-pilosis*) *glabris*; *pedibus brerioribus gracilioribus*. — Long. 15 mill. (sine labro).

1 ♀; Africa Orientalis Britannica.

Dromica (Myrmecoptera) nobilitata Gerst.
subsp. *reducta* nov. var.

Differt a typo ♀ labri dente laterali minus retracto; *prothorace paullo longiore angustioreque*, *strangulatione basali et praesertim apicali minus profundis*; *costis 3 lateralibus in dimidia parte antica elytrorum deficientibus* (*hac parte foreolis rotundatis cribiformiter occupata*), *septiculis in intervallo costo-suturali fere omnibus in partes duas divisis*; *signatura valde reducta*: *macula oblonga marginali ante apicem*, *altera irregulari* (*margini magis approximata quam in typo*) *fere in media elytrorum longitudine* (*non valde pone medium ut in typo!*). — Long. 16 mill.

1 ♀, Luitpoldkette (Afr. or.: a Dom. Höge accepta).

Die Stellung des vorderen Fld.-Fleckes ist recht bemerkenswerth: erheblich weiter nach vorn und dem Rande mehr genähert als der Endknopf beim Typus. Uebrigens zeigt die zweite Rippe noch etwas mehr nach vorn als der dem Rande genäherte Fleck

(also dicht vor der Mitte der Fld.-Länge) eine kurze, undeutliche (nicht ganz symmetrische) gelbe Makel.

Ophryodera foliicornis m. subsp. *trimaculata* nov. var.

Differet a typo macula apicali a signatura media elytrorum separata, hac valde reducta: macula lata brevi obliqua (extus et posticem versus paullulum descendente) discoidali pone medium restante. — Long. 20 mill. (sine labro).

1 ♂; Uhehe (Iringa: Götze). A Museo Berolinense acceptum.

Der langgestreckte Basalfleck ist wie beim Typus vorhanden, nur fast unpunktirt. Die ganze Scheibenzeichnung ist bis auf einen kurzen, schrägen Fleck hinter der Mitte verschwunden, der sehr spärlich und fein dunkel punktirt ist. Die Spitzenmakula gleicht der von *Ophr. rufomarginata* Boh. (nur etwas stärker dunkel punktirt). Die Fühler (5.—9. Glied) so breit abgeflacht wie bei *Ophr. foliicornis*, die Fld. ebenso wie diese mit grossen, seichten, auf der Scheibe in Längs- und Schräglinien zusammenfließenden Gruben bedeckt.

2 neue abessinische Cicindeliden.

Cicindela Kachowskyi.

Cicindelae Petiti Guér. ♂ parum affinis, statura multo majore robustioreque, labri angulis lateralibus magis rotundato-obtusis, fronte antice abruptius angulata inter oculos multo profundiis impresso-excavata, ut scutello et pronoto evidenter grossius sculptis; hoc latiore, lateribus magis rotundatis posticem versus magis angustatis, margine laterali (modice dense) et apicali (sparsim) et disco (raro) albo-pilosis; elytris in medio dilatatis, superficie minus velutina, ut sculptura — praesertim et basim et marginem et apicem versus — magis appareat, epipleuris viridibus, sutura levigata opaca; signatura albescente: macula brevi obliqua (posticem et suturam versus directa et incrassata) pone humeros a margine sat distante, altera oblongula majore obliqua paullulum curvata discoidali pone medium suturae magis approximata, stria tenui modice longa (ab angulo suturali ut in *C. Petiti* G. distante) perparum curvata (sutura versus excavata) discum versus directa sed margini magis approximata quam suturae; palpis nigris; corpore supra brunneo (elytris modice velutinis) opaco; malis cupro-aeneis, partibus centralibus sternalibus aut viridescentibus aut violascentibus, abdomen minus violaceo magis obscurato; femoribus tibiisque (his hinc inde

Dr. W. Horn: Eine neue Borneo-Cicindelide. 423

cyanescensibus) viridi-cuprascentibus, tarsis nigro-cyaneis brevioribus crassioribusque; 4 primis antennarum articulis obscurioribus. —

1 ♀; Provincia „Harrar“ (A centurione Rossico Kachowsky collecta, qui specimen unicum liberalissime mihi dedit).

Cicindela nudopectoralis.

Cic. dorsatae Brll., *Hauseri* m., *vicinae* Dej., *leucoloma* Chd. *affinis*, *differt* — *praeter cetera — pubescentia totius pectoris fere deficiente.*

Oculis vix minus prominulis quam in C. leucoloma Chd., labro in medio perparum magis producto, dente centrali valde longiore, vertice vix grossius granulato; prothorace et elytris perparum latioribus, his subtilius punctatis, margine albo continuo (i. e. cum lunula apicali late connato), fascia media latissime interrupta (puncto discoidali separato); pectore toto nudo setis quibusquam ante coxas anticas et intermedias exceptis, coxarum posticarum et abdominis margine sparsim piloso, huius disco sparsissime punctulato. Corpore supra sordide aenescente, pectore aeneo-virescente, abdominis apice brunneo-piceo. — Long. 9 mill.

1 ♂; Deserta „Danakil“ (Kachowsky 1896).

Eine neue Borneo-Cicindelide.

Cicindela Plasoni nov. spec.

E tribu Cic. filigerae Bat., *Gestroi* m., *maxillaris* m., *Bouchardi* m., *catoptroidis* m., *longipalpis* m.; *differt elytris* ♀ *obscure aeneo-opacis, parte humerali et plaga discoidali in tertia parte antica aurantiaco-splendidissimis.* — Long. 8 mill.

1 ♀; Kinibalu (Borneo bor.: A. Everett collecta). Specimen unicum complures ante annos a Dr. v. Plason mihi datum!

Fronte juxta oculos subtilius quam in C. catoptroidi m. *striolata, oculis minus prominulis; pronoto vix subtilius sculpto, planiore, paullo latiore, marginibus lateralibus densius hirsutis; elytrorum sutura angustiore, spina suturali breviore; totis prothoracis episternis prosternoque ante coxas sat dense pilosis, metathorace post coxas sparsim hirsuto; 2^o et 3^o palporum maxillarium articulo flavescensibus metallice indutis; trochanteribus brunneis; abdominis apice nigricante. Corpore supra obscure aeneo-opaco, fronte hinc inde pronotique parte intermedia paullo dilutioribus, scutello viridi-aeneo subnigra.* Cetera ut in *C. catoptroidi* m.

Oberlippe kurz und ungezähnt, gelb, mit grünlicher Basis. Mandibeln sehr lang.

Dr. W. Horn.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [1903](#)

Autor(en)/Author(s): Horn Walther Hermann Richard

Artikel/Article: [3 neue Cicindeliden vom tropischen Ost-Afrika.
421-423](#)