

Dr. W. Horn: Eine neue Borneo-Cicindelide. 423

cyanescensibus) viridi-cuprascentibus, tarsis nigro-cyaneis brevioribus crassioribusque; 4 primis antennarum articulis obscurioribus. —

1 ♀; Provincia „Harrar“ (A centurione Rossico Kachowsky collecta, qui specimen unicum liberalissime mihi dedit).

Cicindela nudopectoralis.

Cic. dorsatae Brll., *Hauseri* m., *vicinae* Dej., *leucoloma* Chd. *affinis*, *differt* — *praeter cetera — pubescentia totius pectoris fere deficiente.*

Oculis vix minus prominulis quam in C. leucoloma Chd., labro in medio perparum magis producto, dente centrali valde longiore, vertice vix grossius granulato; prothorace et elytris perparum latioribus, his subtilius punctatis, margine albo continuo (i. e. cum lunula apicali late connato), fascia media latissime interrupta (puncto discoidali separato); pectore toto nudo setis quibusquam ante coxas anticas et intermedias exceptis, coxarum posticarum et abdominis margine sparsim piloso, huius disco sparsissime punctulato. Corpore supra sordide aenescente, pectore aeneo-virescente, abdominis apice brunneo-piceo. — Long. 9 mill.

1 ♂; Deserta „Danakil“ (Kachowsky 1896).

Eine neue Borneo-Cicindelide.

Cicindela Plasoni nov. spec.

E tribu Cic. filigerae Bat., *Gestroi* m., *maxillaris* m., *Bouchardi* m., *catoptroidis* m., *longipalpis* m.; *differt elytris* ♀ *obscure aeneo-opacis, parte humerali et plaga discoidali in tertia parte antica aurantiaco-splendidissimis.* — Long. 8 mill.

1 ♀; Kinibalu (Borneo bor.: A. Everett collecta). Specimen unicum complures ante annos a Dr. v. Plason mihi datum!

Fronte juxta oculos subtilius quam in C. catoptroidi m. *striolata, oculis minus prominulis; pronoto vix subtilius sculpto, planiore, paullo latiore, marginibus lateralibus densius hirsutis; elytrorum sutura angustiore, spina suturali breviore; totis prothoracis episternis prosternoque ante coxas sat dense pilosis, metathorace post coxas sparsim hirsuto; 2^o et 3^o palporum maxillarium articulo flavescensibus metallice indutis; trochanteribus brunneis; abdominis apice nigricante. Corpore supra obscure aeneo-opaco, fronte hinc inde pronotique parte intermedia paullo dilutioribus, scutello viridi-aeneo subnigra.* Cetera ut in *C. catoptroidi* m.

Oberlippe kurz und ungezähnt, gelb, mit grünlicher Basis. Mandibeln sehr lang.

Dr. W. Horn.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [1903](#)

Autor(en)/Author(s): Horn Walther Hermann Richard

Artikel/Article: [Eine neue Borneo-Cicindelide. 423](#)