

## Sammelbericht aus Ostpreußen.

Von G. Vorbringer in Königsberg.

Nachstehend ein Verzeichnis von für Ostpreußen neuen \* resp. durch ihre Seltenheit bemerkenswerten Käfern. Die angeführten Fundorte liegen in der Umgegend von Königsberg, das mehrfach erwähnte Jägerstal am Nordrande der Rominter Haide, südlich von Stallupönen.

*Stenolophus vespertinus* Panz. var. *Ziegleri* Panz. Von Schilsky für Thüringen und Schlesien angeführt, kommt hier bei Königsberg nicht selten unter der Stammform vor.

*Chlaenius quadrisulcatus* Fll. 1 Ex. Jägerstal s. s.

\**Platysoma deplanatum* Gyll. Jägerstal unter Pappelhinde, dürfte für Norddeutschland neu sein.

\**Epuraea thoracica* Tourn. (Bestimmung von Reitt. bestätigt). 1 Ex. Gr. Raum unter abgeschälter Fichtenrinde, bisher aus Tirol, Schlesien und Finland bekannt. Das Auffinden dieses Käfers bei uns bestärkt mich in der Ansicht, daß unser Ostpreußen noch eine Anzahl Käferarten enthält, ich möchte sie Relikte aus der Eiszeit nennen, die sich heute nur noch im Gebirge resp. im hohen Norden finden. Schon Lenz führt in seinem Verzeichnis der Käfer Ost- und Westpr. *Homalota tibialis* Heer an (von Scriba bestimmt) und wundert sich, daß dieser entschiedene Gebirgskäfer bei uns vorkomme. Ich kann außer vorstehender *Epuraea* von meinen Funden beispielsweise *Eudectus Giraudi* Redtb., *Liogluta microptera* Thoms. und *Stenus flavipalpis* Thoms. anführen und möchte noch nebenbei bemerken, daß auch andere Insektenordnungen durch alpine Tiere bei uns vertreten sind. In der von Dr. Speiser herausgegebenen Schmetterlingsfauna von Ost- und Westpr. wird z. B. *Colias phicomene* Esp. angeführt und von *Parnassius apollo* L., der in Curland sicher vorkommt, ist es wahrscheinlich, daß er auch bei uns sich findet.

*Lathridius nodifer* Westw. Ein 3tes Ex. im Festungsglaciis.

*Lathridius constrictus* Gyll. 5 Ex. Gr. Raum unter Fichtenrinde.

\**Cartodere elongata* Curtis. 2 Ex. Gr. Raum.

\**Corticaria saginata* Mannerh. 1 Ex. Jägerstal. Von Schilsky nur für Mittelddeutschland und Böhmen angeführt.

*Atomaria cognata* Er. (von Reitter bestimmt). Schon bei Lentz angeführt, von Seidlitz als ? verzeichnet.

\**Cryptophagus distinguendus* Strm. 2 Ex. Königsberg.

\**Cryptophagus Milleri* Reitt. (von Reitt. bestätigt.) 2 Ex. Arnau, von Schilsky nur für Ost-D. angeführt.

*Antherophagus nigricornis* Fbr. Nur von den älteren Autoren (Sieb.) ohne Fundort angeführt. 1 Ex. Glaciis, 2 Ex. Rauschen, 1 Ex. Jägerstal.

\**Cis comptus* Gyll. 1 Ex. Arnau, 1 Ex. Gr. Raum.

\**Cis castaneus* Mell. 1 Ex. Nasser Garten (Königsberg).

*Spaerites glabratus* Fbr. soll nach Schilsky in N.-D. nicht vorkommen, wird aber schon von Lentz mit mehreren Fundorten angeführt und ist auch später hier bei Königsberg von mir und andern Entomologen gefunden.

*Stenus calcaratus* Scriba. Früher bei Königsberg gefunden, war lange verschollen; ich fand 1903 5 ♂ im Glacis und auf dem Nassen Garten.

\**Stenus Kolbei* Gerhardt (?). 1 Ex. ♀ Jägerstal. Das Stück hat Hrn. Dr. Bernhauer vorgelegen und teilt mir derselbe mit, daß er ein ähnliches Stück aus Bosnien besitze. Da aber mein in Rede stehendes Ex. kräftiger gebaut (4 mill.) ist wie *St. Kolbei*, auch Fühler und Beine weit dunkler gefärbt sind, so wäre es nicht unmöglich, daß hier doch eine neue Art vorläge und wollte ich durch diese Notiz die Herren Entomologen auf den Käfer aufmerksam machen. Der Fund eines ♂ würde wahrscheinlich Klarheit bringen.

\**Stenus paganus* Er. 1 Ex. Jägerstal.

\**Lathrobium foveolum* Steph. 5 Ex. Rauschen, Metgethen, Nass. Garten. Osterode (Czwalina handschriftl.).

*Lathrobium scutellare* Nordm. 1 Ex. Nasser Garten s. s.

\**Quedius maurus* Sahlbg. 3 ♂ Jägerstal, nach Schilsky nur im Süden. K. St. Schles., auch in Schweden und Finnland.

*Quedius cruentus* Ol. var. *virans* Rottbg. 7 Ex. Jägerstal. Schilsky führt nur Böhmen an.

\**Mycetoporus Brucki* Pand. 1 Ex. Neuhäuser. Fehlt bei Schilsky und ist wohl in Deutschland nur noch aus Schlesien bekannt.

\**Myrmedonia Haworthi* Steph. 1 ♂ im Königsb. Festungsglacis von Prorektor Kemsat aufgefunden; wohl für Norddeutschland neu!

\**Homalota corvina* Thms. 4 Ex. Metgethen.

\**Homalota myrmecobia* Kr. 1 Ex. Eichenkrug.

*Oxyptoda testacea* Er. 1 Ex. Jägerstal s. s. Nur von den alten Autoren (Sieb.) ohne Fundort angeführt.

\**Oxyptoda obscura* Kr. 1 Ex. Nasser Garten.

*Oxyptoda Skalitzkyi* Bernh. Jetzt ein 2tes Ex. Jägerstal, Nordrand der Rominter Haide, das erste vom Südrand.

\**Oxyptoda exigua* Er. 2 Ex. Jägerstal.

\**Oxyptoda advena* Mäkl. (von Bernhauer bestimmt). Diese finnländische Art, welche bei Schilsky und Ganglbauer fehlt, war Bernhauer schon aus Norddeutschland bekannt (wo?). 6 Ex. Nasser Garten.

\**Ptinus subpilosus* Strm. 1 Ex. Jägerstal.

\**Donacia Sparganii* Ahrs. 1 Ex. Jägerstal.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [1904](#)

Autor(en)/Author(s): Vorbringer Gustav

Artikel/Article: [Sammelbericht aus Ostpreußen. 453-454](#)