

Decke hat 3 grofse, schwarze, bindenförmige Quermakeln: die erste, hinter der Basis, beginnt aufsen auf der Schulterbeule breit, verengt sich nach innen und erreicht die rotbraune Naht nicht. Die zweite ist gröfser als die anderen, quer-oval, liegt ungefähr in der Mitte und bleibt von der Naht ebenso weit entfernt wie die erste; aufsen reicht sie bis an den abgesetzten Rand und verlängert sich zuweilen über demselben nach vorn strichförmig bis nahe an die Schulterecke. Die dritte Quermakel, vor der Spitze, ist schmal, aufsen etwas abgekürzt, innen etwas verbreitert und mit der Naht verbunden.

Eine typische Art mit dachförmigem Prosterneum, welches vorn etwas ausgezogen ist, aber nur kurze und feine Seitenkiele besitzt, die Augen divergiren stark nach unten, wie in den australischen Arten, die Bauchlinien sind vollständig.

### J. Weise: Ueber die Gattung *Sigrisma* Fairm.

Dieselbe wurde Ann. Fr. 1888, p. 200 nach einem Tiere aus Deutsch Südwest-Afrika (Ovamboland) aufgestellt und richtig mit *Crioceris* verglichen; trotzdem reihte sie Péringuey, Transact. South Afr. 1892, 83, bei den Megalopinen ein. Fairmaire kannte nur eine Art, *Sigrisma tuberifrons* Fairm. l. c. 201, welche mit *Crioceris cylindrica* Klug, Guér., und Lac. Mon. 596 identisch ist. Lacordaire irrte jedoch, wenn er l. c. 597 meint: „Diese Art ist unter den *Crioceris* dasselbe, was *cylindricollis* unter den übrigen *Lema*-Arten ist“; denn letztere weicht nur durch den sehr schlanken Körper von den anderen Gattungsgenossen ab, während *cylindrica* durch die Kopfbildung unbedingt von *Crioceris* getrennt werden mufs, da keine Uebergangsform zu den beiden hohen Schrägleisten der Stirn vorhanden ist. Zu beachten bleibt aufserdem die Einrichtung der Epipleuren der Fld. Diese besitzen bald hinter der Schulter eine Grube, in die sich der nach aufsen verlängerte glatte Querstreifen am Vorderrande der Hinterbrustepisternen einlegen kann.

*Sigrisma* wird aus folgenden Arten gebildet:

<i>cylindrica</i> Klug, Erman. Reis. Atl. 1835, 46	Senegal? Guinea
<i>frontalis</i> Lap. Hist. nat. II, 1840, 509	Angola, Rhodesia
<i>tuberifrons</i> Fairm. Ann. Fr. 1888, 201	Ovambo, Transvaal
<i>Balyi</i> Har. Mitth. Münch. 1877, 100	Nyassa
<i>coronata</i> Baly, Ent. Monthl. Mag. 14, 1878, 177	Nyassa

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: [1905](#)

Autor(en)/Author(s): Weise Julius

Artikel/Article: [J. Weise: Ueber die Gattung Sigrisma Fairm. 54](#)