© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Bestand der Coleopteren-Sammlung von W. Koltze in Hamburg im Juni 1904.

Die Sammlung wurde begründet im Jahre 1860 und umfafst die im Catal. Col. Europae etc. 1891 aufgenommenen Faunengebiete einschliefslich der russischen Besitzungen in Ost-Asien.

	Arten		Arten
Cicindelidae	130	*Nitidulidae*	208
Carabidae	2673	*Trogositidae*	17
Dytiscidae	296	*Colydiidae*	56
Gyrinidae	21	*Rhysodidae*	3
Hydrophilidae	266	*Cucujidae*	77
Georyssidae	6	*Trixargidae*	2
Parnidae	45	*Dermestidae*	108
Heteroceridae	35	*Cistelidae*	71
Staphylinidae	1450	*Thorictidae*	9
Micropeplidae	8	*Histeridae*	167
Pselaphidae	239	*Lucanidae*	25
Clavigeridae	16	*Scarabaeidae*	935
Paussidae	2	*Buprestidae*	273
Scydmaenidae	131	*Eucnemidae*	30
Platypsillidae	1	*Elateridae*	358
Silphidae	262	*Cebrionidae*	12
Anisotomidae	80	*Rhipiceridae*	1
Clambidae	15	*Dascillidae*	27
Sphaeriidae	1	*Cantharidae*	540
Corylophidae	31	*Cupesidae*	1
Hydroscaphidae	1	*Cleridae*	71
Trichopterygidae	63	*Ptinidae*	55
Scaphidiidae	13	*Anobiidae*	93
Phalacridae	37	*Lyctidae*	7
Erotylidae	35	*Bostrychidae*	20
Endomychidae	55	*Cioidae*	46
Cryptophagidae	144	*Tenebrionidae*	911
Derodontidae	1	*Alleculidae*	108
Lathridiidae	122	*Lagriidae*	10
Elacathidae	1	*Melandryidae*	56
Tritomidae	27	*Mordellidae*	87
	6207		10591

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

	Arten		Arten
Rhipiphoridae	8	*Anthribidae*	37
Meloidae	197	*Lariidae* (*Bruchidae*)	83
Pyrochroidae	7	*Brenthidae*	1
Anthicidae	124	*Scolytidae*	145
Oedemeridae	71	*Cerambycidae*	726
Pythidae	26	*Chrysomelidae*	1413
Curculionidae	2600	*Coccinellidae*	181
Nemonychidae	4		Total 16214
	13628		Arten und benannte Varietäten.

Im Jahre 1876 war der Bestand 7650 Arten, auf Grund der Veröffentlichung in Dr. G. Kraatz' Entomol. Monatsblättern Nr. 10 S. 152.

Hamburg, Juli 1904. W. Koltze.

J. Weise: Ueber *Balyana* Pér.

Diese Gattung hat Gestro, Ann. Mus. Civ. 1899, 215—217, mit Recht nur als ein auf den afrikanischen Kontinent beschränktes Subgenus (besser eine Abteilung) von der madagassischen Gattung *Coelaenomenodera* Blanch. hingestellt, denn auch die Skulptur der Fld., auf die seither nicht eingegangen wurde, hat in beiden dieselbe Anordnung. Es sind auf jeder Decke 10 Punktreihen und 3 primäre Rippen vorhanden, der erste und vierte Zwischenstreifen enthält je 3 Punktreihen, die beiden inneren je 2. Bei *B. algoensis* Pér. sind diese Reihen und Rippen zwar durch kräftige Querrunzeln mehr oder weniger gestört, aber doch noch deutlich zu verfolgen. Meiner Meinung nach umfafst *Balyana* nur eine Art, die in der Skulptur etwas, in der Färbung namentlich der Unterseite und Beine sehr variiert, und deshalb bereits viermal beschrieben wurde; zuerst von Fairmaire als *sculptilis* und von Gestro als *reticulata* fast gleichzeitig 1895. Der erstere Name aus dem Januar-Hefte der Ann. Belg. 1895 scheint sicher die Priorität zu haben, und es würde dann folgende Uebersicht entstehen:

Bal. sculptilis Fairm. (*Coelaen.*) Ann. Belg. 1895, 39 Delagoa Bay
reticulata Gestro, Ann. Mus. Civ. Genov. 1895, 465, fig. Boran Galla
clathrata Kolbe Stuhlmann, Ostafrika IV, 1897, 341 Pangani
algoensis Pér. Ann. South Afr. Mus. I, 1898, 115 Mozambique, Rhodesia.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung)

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: 1905

Autor(en)/Author(s): Koltze Wilhelm

Artikel/Article: Bestand der Coleopteren-Sammlung von W. Koltze in Hamburg im Juni 1904. 55-56