

## 56 W. Koltze: Bestand der Coleopteren-Sammlung im Juni 1904.

|                                | Arten |                                       | Arten |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| <i>Rhipiphoridae</i> . . . . . | 8     | <i>Anthribidae</i> . . . . .          | 37    |
| <i>Meloidae</i> . . . . .      | 197   | <i>Lariidae (Bruchidae)</i> . . . . . | 83    |
| <i>Pyrochroidae</i> . . . . .  | 7     | <i>Brenthidae</i> . . . . .           | 1     |
| <i>Anthicidae</i> . . . . .    | 124   | <i>Scolytidae</i> . . . . .           | 145   |
| <i>Oedemeridae</i> . . . . .   | 71    | <i>Cerambycidae</i> . . . . .         | 726   |
| <i>Pythidae</i> . . . . .      | 26    | <i>Chrysomelidae</i> . . . . .        | 1413  |
| <i>Curculionidae</i> . . . . . | 2600  | <i>Coccinellidae</i> . . . . .        | 181   |
| <i>Nemonychidae</i> . . . . .  | 4     |                                       |       |
|                                | 13628 | Total                                 | 16214 |
|                                |       | Arten und benannte Varietäten.        |       |

Im Jahre 1876 war der Bestand 7650 Arten, auf Grund der Veröffentlichung in Dr. G. Kraatz' Entomol. Monatsblättern Nr. 10 S. 152.

Hamburg, Juli 1904.

W. Koltze.

### J. Weise: Ueber *Balyana* Pér.

Diese Gattung hat Gestro, Ann. Mus. Civ. 1899, 215—217, mit Recht nur als ein auf den afrikanischen Kontinent beschränktes Subgenus (besser eine Abteilung) von der madagassischen Gattung *Coelaenomenodera* Blanch. hingestellt, denn auch die Skulptur der Fld., auf die seither nicht eingegangen wurde, hat in beiden dieselbe Anordnung. Es sind auf jeder Decke 10 Punktreihen und 3 primäre Rippen vorhanden, der erste und vierte Zwischenstreifen enthält je 3 Punktreihen, die beiden inneren je 2. Bei *B. algoensis* Pér. sind diese Reihen und Rippen zwar durch kräftige Querrunzeln mehr oder weniger gestört, aber doch noch deutlich zu verfolgen. Meiner Meinung nach umfaßt *Balyana* nur eine Art, die in der Skulptur etwas, in der Färbung namentlich der Unterseite und Beine sehr variiert, und deshalb bereits viermal beschrieben wurde; zuerst von Fairmaire als *sculptilis* und von Gestro als *reticulata* fast gleichzeitig 1895. Der erstere Name aus dem Januar-Hefte der Ann. Belg. 1895 scheint sicher die Priorität zu haben, und es würde dann folgende Uebersicht entstehen:

*Bal. sculptilis* Fairm. (*Coelaen.*) Ann. Belg. 1895, 39 Delagoa Bay  
*reticulata* Gestro, Ann. Mus. Civ. Genov. 1895, 465, fig.

Boran Galla  
*clathrata* Kolbe Stuhlmann, Ostafrika IV, 1897, 341 Pangani  
*algoensis* Pér. Ann. South Afr. Mus. I, 1898, 115

Mozambique, Rhodesia.