

## Zwei neue Ostafrika-Cicindeliden

beschrieben von

Dr. med. **Walther Horn.***Cicindela Hauserana* (nov. spec.).

*Bennigsenio planicorni* m. *affinis*, labro obscurius brunnescente longiore, dentibus 3 mediis non retractis; capite paullo, prothorace evidenter grossius rugosis, hoc latiore, pronoto nudo; elytris multo subtilius sed aequae dense (cribriformiter) punctulatis, angulo suturali non rotundato sed dente crasso modice longo ornato, linea flava juxta-marginali margini ipsi magis approximata (parte humerali et extrema apicali excepta, ubi ut in illa) fere in medio elytrorum hamulum brevissimum (perparum obliquum posticem versus directum) intus emittente et prope angulum apicalem externum paullulum contracta; prosterno medio ante coxas et primo segmento ventrali lateraliter sparsim setosis; femoribus et maxima parte tibiaram brunnescentibus, tarsis intermediis ♂ non dilatatis; corpore subtus laete cuprascente: parte mentali totoque abdomine (2 primis segmentis lateraliter cuprascentibus) nigro-metallicis, parte discoidali et meso- et metasterni et coxarum posticarum paullulum viridescente; corpore supra ♂ smaragdino opaco, pronoti margine laterali laete cuprascente, elytris inter marginem liberum et lineam flavam cupro-aenescentibus, palpis maxillaribus obscurioribus. — Long. 10—12½ mill. (sine labro).

♂♂; Ueheland: Kidugala.

(a Prof. G. Hauser liberalissime mihi data).

Das einzige mir vorliegende ♀ ist auf der Oberseite erzbraun, hat das 7. bis 11. Fühlerglied ebenfalls erweitert, etwas mehr vorgezogene 3 Mittelzähne der Oberlippe und fehlenden Nahtdorn.

Die Art ist dadurch besonders interessant, daß sie beweist, daß der systematische Wert der erweiterten Mitteltarsen der ♂♂ nicht ganz so erheblich ist, als es bisher schien. Die betreffenden Gattungen, welche darauf gegründet sind, sind daher auf andere Charaktere hin noch einmal zu revidieren. Die vorstehend beschriebene Art bahnt auf jeden Fall den Uebergang an von den sogenannten „aberranten afrikanischen“ Cicindeliden (bes. *C. tereticollis* Boh.) zu den als „*Bennigsenium*“ beschriebenen Tieren. Gleichzeitig erweist sich meine Anschauung, *Bostrichophorus* etc.

als „*Cicindela*“ zu interpretieren, als immer mehr bewiesen: Die „afrikanischen aberranten“ Cicindeliden<sup>1)</sup> sind nunmehr sicher als „echte“ Angehörige der Gattung *Cicindela* zu betrachten. Nur *Elliptica flavovestita* Fairm. und *Cicindela Benniseni* n. sp. (die Brust der letzteren scheint doch ganz unbeborstet zu sein!) machen noch Schwierigkeiten.

*Cicindela ocellifera* (nov. spec.).

*Cic. disjunctae* Dej. *affinis*, differt capite prothoraceque cuprascentibus, minoribus, paullo angustioribus; elytris magis elongatis totis punctis (foveolis) magnis ocelliformibus cyaneo-saphyrinis dense inspersis, ad marginem hinc inde 2—3 confluentibus, in disco rarioribus (hoc loco spatiis quibusdam irregularibus dilaceratis sine sculptura brunneo-nigro-velutinis), sutura angustiore; signatura tenui: puncto humerali (posticem versus paullo elongato), secundo discoidali anteriore, tertio discoidali posteriore, quarto ante-apicali (paullo magis a margine remoto quam in *Cic. disjuncta* Dej.), linea dilacerata transversa in medio elytrorum (fere ut in *Cic. Péringueyi* m.). Palpis flavis (articulo ultimo metallico), trochanteribus testaceo-brunnescentibus; malis postice sparsissime pilis longis tenuibus ornatis, cetera ut in illa specie. — Long. 8½ mill.

1 ♂; Mpwapwa (Deutsch Ostafrika: R. v. Bennisen).

Specimen unicum liberalissime ab amico mihi datum.

Oberlippe spärlicher und undeutlicher beborstet. Kopf und Pronotum kaum feiner skulpiert als die Dejean'sche Art. Die Grundfarbe der Flügeldecken ist erz-bräunlich, wegen der grossen dichten ocellenartigen Punktierung ist aber wenig davon zu sehen: nur da, wo auf der Scheibe die Punkte spärlicher stehen, treten dunkel bräunlich-schwarze Wische auf. Am bemerkenswertesten ist die (spärliche) Behaarung der Wange. — Unterseite grünlich-blau; Episternen und Wange kupfrig-braun; Episternen der Hinterbrust mit grünlich-bläulichen Stellen.

<sup>1)</sup> soweit sie auf dem Continent von Afrika vorkommen!

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: [1905](#)

Autor(en)/Author(s): Horn Walther Hermann Richard

Artikel/Article: [Zwei neue Ostafrika-Cicindeliden 143-144](#)