© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

11. *Cicindela nysa* Guér. 1 Ex. kam nachts nahe dem Urwald am unteren Benuë bei Amara am 28. V. 04 an die Lampe geflogen.

12. *Cicindela cincta* Fabr. Schwarze Ex. wurden zur Regenzeit im Urwald am Benuë (Loko: 7. V. 04) an Lianen und Luftwurzeln beobachtet. Die Tiere setzten sich nicht auf den Boden!

13. *Cicindela interrupta* F. Mit der vorhergehenden zusammen, aber am Boden fliegend.

14. *Cicindela senegalensis* Dej. wurde nur einmal in der Yola-Ebene in einem Ex. gefangen.

15/16. Zum Schlufs noch die Bemerkung, dafs *Cic. regalis* Dej. und *dongalensis* Klug (die sich massenhaft an feuchten Uferstellen aufhalten) ähnlich so vielen anderen Arten der ganzen Familie lebend einen ausgesprochen aromatischen Geruch entwickeln.

Eine neue *Derocrania* (*Tricondyla*) aus Vorder-Indien.

Beschrieben von Dr. med. **Walther Horn.**

Tricondyla (*Derocrania*) *brevicollis.*

Differt a Der. Honorei Flt. ♂ *tota parte antica constricta cylindrica prothoracis deficiente, hoc sulcum basalem versus minus angustato; elytrorum gibbositate magis basim versus incipiente, maxima latitudine in medio (elytris longius angustato-acuminatis), parte basali grossius densiusque sculpta (lateraliter in hac parte punctis quibusdam transversaliter confluentibus), ceteris elytris fere aeque grosse atque hac parte basali sculptis (punctis marginem lateralem et apicem versus perparum minoribus, non aut vix irregulariter-longitudinaliter connexis; punctis in parte discoidali et prope mediam suturam oblongulis et in directione longitudinali levissime confluentibus sed non sulculis longitudinalibus plus minusve longis formatis); tibiarum parte maxima rufescente.* — Long. 10½ mill.

1 : Trichinopolis (Castets).

Das nicht flaschenförmige, sondern viel kürzere und einfach konische Halsschild ist sehr auffallend! Die Flügeldecken erscheinen überall mehr oder weniger gleichmäfsig grob und dicht unregelmäfsig-punktiert: auf der Höhe des Buckels fliefsen die einzelnen länglichen Grübchen kettenähnlich zusammen (nicht in Form von echten Längsfurchen: man erkennt überall die einzelnen Grübchen!). — Leider besitze ich augenblicklich kein ♀ von *D. Honorei* Flt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Deutsche Entomologische Zeitschrift (Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung)

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: 1905

Autor(en)/Author(s): Horn Walther Hermann Richard

Artikel/Article: Eine neue Derocrania (Tricondyla) aus Vorder-Indien. 152