

Sammelbericht aus Ostpreußen für das Jahr 1904.

Von G. Vorbringer in Königsberg.

Nachstehend wieder ein Verzeichnis von für Ostpreußen neuen * resp. durch ihre Seltenheit bemerkenswerten Käfern.

* *Epuraea laeviuscula* Gyll. 1 Ex. Angerburg.

Diese sehr seltene Art (Finnl., Schles., Südeurop. Gebirge) steht durch ihre sehr feine Punktierung neben *E. thoracica* Tourn., weicht aber durch die fettglänzenden, sehr fein behaarten und fast parallelen Flügeldecken, sowie das vorn sehr schwach ausgebuchtete Halsschild von ihr ab und dürfte kaum mit einer andern *Ep.* zu verwechseln sein.

Monotoma brevipennis Kunze. 1 Ex. Fischhausen (von Reitter bestimmt).

* *Cryptophagus pallidus* Sturm. 1 Ex. Sackheimer Tor (von Reitter bestimmt), nach Ganglbauer Art!

* *Cis Jacquemartii* Mell. 1 Ex. Glacis.

Scymnus Redtenbacheri Muls. 1 Ex. Landgraben, schon von Lenz als s. s. angegeben, daher bei Seidlitz mit Unrecht?

* *Catops neglectus* Kr. 1 Ex. Dellgienen (von Gerhardt bestimmt).

Bythinus validus Aubé. 1 Ex. Neuhausen (von Reitter bestimmt), fehlt bei Seidlitz' Fauna baltica, aber schon von Lenz angeführt.

* *Euplectus brunneus* Grimm. 1 ♂ 2 ♀ Gr. Raum.

* *Euplectus punctatus* Muls. 1 ♂ Wargen.

* *Euplectus Duponti* Aubé. 1 Ex. Gr. Raum, von Reitter bestimmt.

* *Anthobium minutum* var. *puncticollis* Graells. 1 Ex. Neuhausen.

* *Trogophloeus despectus* Baudi. 1 Ex. Angerburg.

Stenus proditor Er. Angerburg 1 Dutz. Ex. s. s., fehlt bei Lenz. Czwalina fing 2 Ex. bei Königsberg.

Stenus silvester Er. Die Hinterbrust ist lang behaart, wie Gerhardt in der Zeitschr. f. schles. Insektenk. richtig angibt, nach Ganglbauer soll dies nicht sein.

Stenus Kolbei Gerh. 1 ♂ Neuhausen, das 2. Ex. für Ostpreußen. Es erledigen sich dadurch meine Zweifel wegen des Vorkommens dieser Art bei uns, doch wäre der Beschreibung bei Ganglbauer zuzufügen: Länge 3,3—4 mm, kommt auch mit dunkeln Fühlern und Beinen vor.

* *Lithocharis obscurella* Er. 1 Ex. Nasser Garten, Königsb.

* *Lathrobium gracile* Hampe. Angerburg 2 ♂.

Nach von Ganglbauer freundlichst erteilter Auskunft stecken in der Eppelsheimschen Sammlung 2 Ex. aus Croatien, 1 Ex. Tirol, 1 Ex. Mecklenburg; Bernhauer besitzt den Käfer auch aus Norwegen.

Acylophorus glabricollis Lac. 1 Ex. Angerburg s. s.

**Phloeopora angustiformis* Baudi. 1 Ex. Jägersthal, von Bernhauer bestimmt.

**Homalota occulta* Er. 2 Ex. Nasser Garten, Königsberg.

**Homalota macrocera* Thoms. (*nudicornis* Muls.?), 2 Ex. Neuhausen.

Homalota claucula Er. 1 Ex. Sackheimer Thor s. s., das 2. von mir in Ostpreußen gefundene Ex.

Oxypoda obscura Kr. Herr Dr. Bernhauer war so freundlich, meine sämtlichen Ex. der nahestehenden *Ox. longiuscula* Er. zu revidieren und fand darunter als zu *obscura* gehörend 3 Ex. Angerburg, 1 Ex. Fischhausen.

**Ox. amoena* Fairm. 1 Ex. Metgethen.

Ox. advena Mäkl. scheint für Ostpreußen ein richtiger incola zu sein, denn ich fand in diesem Jahr wieder 3 Ex. an dem von mir schon früher konstatierten Fundort, Nasser Garten, Königsberg.

**Ox. recondita* Kr., 1 Ex. Neuhausen (teste Bernhauer).

Salpingus foveolatus Ljungh. 1 Ex. Angerburg s. s.

**Ceuthorrynchus ignitus* Germ. 3 Ex. Schillinnen, 1 Ex. Nasser Garten, Königsberg; auch in der Sammlung von Hrn. Rat Steiner 1 Ex. Ostpreußen.

**Ceuthorrynchus moguntiacus* Schultze. 3 Ex., Glacis, Gr. Raum und Rauschen, von Schultze bestimmt.

*?*Ceuthorrynchus pectoralis* Weise (*chalybaeus* Germ.?). 3 Ex. Jägersthal. Ob der von Lentz resp. Seidlitz als in Ostpreußen vorkommend erwähnte *C. chalybaeus* Germ. hierher gehört, läßt sich wohl kaum mehr feststellen. Man vergleiche wegen der letzten beiden Arten den in der Deutsch. Ent. Zeitschr. 1895 S. 417—420 erschienenen Artikel von Schultze.

Der von mir in den Ent. Nachr. 1898 p. 286 beschriebene *Dromius cordicollis* ist nach einer Arbeit von A. Semenow, Revue Russe d'Entm. 1904, S. 300 u. 314, = *quadraticollis* Moraw. Der Käfer ist 1862 von Morawitz vom Amur und Ussuri beschrieben, kommt durch ganz Sibirien vor (Sahlberg, Mäklin), verbreitet sich im europäischen Rußland bis Petersburg (Masaraki) und Mohilew (Arnold) und findet seine Westgrenze in Ostpreußen (Vorbringer, Bercio). Es ist also:

Dromius cordicollis Vorbg. 1898. =

» *fenestratus* F. var. *obscurus* Arnold 1902.

» *quadraticollis* Moraw. 1862.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: [1905](#)

Autor(en)/Author(s): Vorbringer Gustav

Artikel/Article: [Sammelbericht aus Ostpreußen für das Jahr 1904. 303-304](#)