

18. *Aeroniopus marginicollis*.

Niger, opacus, subtiliter cinereo-pilosus; fronte antice depressa, subtruncata, medio longitudinaliter subtiliter canaliculata, creberrime punctata; antennis fuscis; prothorace latitudine paulo longiore, apice rotundatim angustato, convexo, deusissime punctato, lateribus anguste brunneo, medio canaliculato, angulis posticis brunneis, subdivaricatis, sat fortiter carinatis; elytris prothoracis latitudine, parallelis, apice rotundatis, brunneis, subtiliter punctato-striatis, interstitiis planis, confertissime subtiliter rugulose punctulatis; corpore subtus nigro, subtiliter griseo-pubescentibus, pedibus brunnescentibus. — Long. $6\frac{1}{2}$ mill., lat. $1\frac{1}{2}$ mill.

Australia.

Schwarz, matt, fein und mäfsig dicht gelblich grau behaart. Die Stirn ist vorn flach gedrückt, der Vorderrand fast gerade abgestutzt, nach der Basis zu mit feiner, eingedrückter Mittellinie, sehr dicht und ziemlich fein punktiert. Die kurzen Fühler sind dunkelbraun. Das Hlschd. ist ein wenig länger als breit, an der Spitze gerundet verengt, gewölbt, sehr dicht und mäfsig fein punktiert, an den Seiten schmal dunkel rotbraun, längs der Mitte mit schwach eingedrückter Linie; die Hintercken sind sehr wenig divergierend und wie die Seiten dunkel rotbraun, ziemlich stark gekielt. Die Fld. sind so breit wie das Hlsch. und etwa nur $2\frac{1}{2}$ mal so lang wie dieses, parallel, an der Spitze gerundet, fein punktiert-gestreift; die Zwischenräume sind flach, sehr dicht und fein runzlig punktuliert. Die Unterseite ist schwarz, feiner und mehr grau behaart als die Oberseite, die Beine sind gebräunt.

Vier neue Diceronychidae.

1. *Diceronychus ferrugineus*. (♂) *Ferrugineus, nitidus, minus dense subtiliter flavo-pilosus; fronte media impressa, dense subtiliter punctata, antennis sat elongatis, ab articulo 3^o serratis, articulo 3^o 4^o brevioribus; prothorace subquadrato, minus dense subtiliter punctato, basi breviter sulcato, angulis posticis fortiter divaricatis, acute carinatis; scutello apice acuminato; elytris prothorace latioribus, parallelis, apice rotundatis, punctato-striatis, interstitiis dense rugose punctulatis; corpore subtus pedibusque rufo-testaceis; abdomine segmento ultimo apice tumidulo, dense rugulose punctulato, utrinque subemarginato.* Long. 12 mill., lat. fere 3 mill.

Deutsch Südwest-Afrika.

2. *Dicronychus alternatus*. (♂) *Fusco-niger, sat nitidus, dense flavo-pilosus; fronte media leviter impressa, confertissime sat subtiliter punctata; antennis fuscis, sat elongatis, ab articulo 3^o serratis, articulo tertio 4^o aequali, prothorace latitudine haud longiore, antrorsum sensim paulo angustato, dense subtiliter punctato, angulis posticis divaricatis, indistincte carinatis, apice penicillatis; elytris prothorace latioribus, parallelis, postice rotundatim attenuatis, punctato-striatis, interstitiis fere planis, dense subtiliter asperulato-punctatis, imparibus paulo latioribus; corpore subtus pedibusque fere concoloribus, pedibus crassiusculis; abdomine segmento ultimo integro, apice densius piloso et rugose punctato.* — Long. 19 mill., lat. 5 mill.

Delagoa-Bai.

3. *Dicronychus prosternalis*. *Fusco-castaneus, sat nitidus, dense subtiliter fulvo-pilosus; fronte antice leviter triangulariter impressa, dense subtiliter umbilicato-punctata; antennis haud elongatis, articulo 3^o 4^o brevioribus; prothorace latitudine longitudini subaequali, a basi sensim rectolinariter, apice rotundatim angustato, valde convexo, dense subtiliter, lateribus densissime umbilicato-punctato, postice medio sulcato, angulis posticis retrorsum productis, carinatis; elytris prothoracis latitudine, postice rotundatim attenuatis, striatis, striis fortiter punctatis, interstitiis dense subtiliter asperulato-punctatis; corpore subtus pedibusque fere concoloribus; suturae prosternali antice profunde canaliculatis; abdomine segmento ultimo utrinque apiceque emarginatis.* — Long. 21 mill., lat. fere 6 mill.

Kamerun, Victoria.

4. *Tarsalgus Schneideri*. *Fuscus, parum nitidus, dense subtiliter flavo-pilosus; fronte impressa, confertissime subtiliter punctata; antennis paulo elongatis, brunneis, serratis; prothorace longitudine parum latiore, a basi usque ad apicem sensim angustato, densissime subtiliter punctato, angulis posticis divaricatis, carinatis, apice penicillatis; elytris prothorace paulo latioribus, postice rotundatim attenuatis, punctato-striatis, interstitiis convexiusculis, dense subtiliter punctatis; corpore subtus pedibusque concoloribus; pedibus crassiusculis.* — Long. 19 mill., lat. 5 mill.

Delagoa-Bai.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [1906](#)

Autor(en)/Author(s): Schwarz Otto Carl Ernst

Artikel/Article: [Vier neue Dicronychidae. 369-370](#)