

Eine neue Lokalform des *Megodontus Germari* Sturm.

Von

K. Hammer, k. u. k. Oberlieutenant i. d. Res.

Die Anregungen, welche Prof. Dr. Kraatz durch seine Arbeiten zur kritischen Scheidung der zu dem weit verbreiteten *Carabus violaceus* gezogenen Arten gegeben hat, sind auf fruchtbaren Boden gefallen und haben uns nicht nur das Verbreitungsgebiet desselben, sondern auch eine große Zahl interessanter Lokalformen näher kennen gelehrt. Speziell Herr Born hat in den letzten Jahren eine Anzahl neuer Formen aus Spanien, Italien, der Schweiz und Vorarlberg beschrieben, nur das Gebiet der Oesterreichischen Alpen scheint noch in dieser Beziehung nicht genügend durchforscht zu sein, obwohl auch hier bemerkenswerte Lokalformen aufzufinden sein dürften. Meine Bemühungen, entsprechendes Material von dort zu erhalten, sind nur in zwei Fällen von Erfolg gewesen. Einmal erhielt ich eine Anzahl recht egaler *Germari* von besonders kräftiger Form vom Triglav in Krain, im andern Falle aber eine recht bemerkenswerte Form, deren Beschreibung hier folgt.

Megodontus violaceus, savinicus n. var. Schwarz, glänzend, jedoch nicht lackglänzend wie *Neesii*, einzelne Exemplare fast matt, Flügeldeckenrand lebhaft grün oder schwärzlich metallisch. Halsschild wie beim typischen *violaceus*, Ränder explanater wie bei *Neesii*, Hinterwinkel länger ausgezogen und verhältnismäßig spitzer als bei beiden verglichenen Rassen. Flügeldecken gestreckt, flacher wie bei *Neesii*, nur beim ♀ hinter der Mitte deutlich breiter, jedoch ohne die charakteristische Gestalt des *Neesii* ♀; grob skulptiert, alle Körnchen Reihen bildend, primäre Streifen stets, sekundäre oft vorhanden, primäre Punktgrübchen deutlich. Sämtliche Exemplare stimmen in Skulptur, Gestalt und Färbung derart überein, daß auf eine Lokalrasse geschlossen werden muß. Penis gedreht.

Long. ♂ 23—27 mm, ♀ 24—30 mm.

Kärnten: Savinische Alpen, Ob.-Seeland. Von Hrn. Ingenieur Šula erhalten.

Ich halte diese Lokalrasse für eine Zwischenform des *Neesii* und *azureus*, deren Verbreitungsgebiete sich an der Südgrenze Kärnthens berühren.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche Entomologische Zeitschrift \(Berliner Entomologische Zeitschrift und Deutsche Entomologische Zeitschrift in Vereinigung\)](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [1906](#)

Autor(en)/Author(s): Hammer Karl

Artikel/Article: [Eine neue Lokalform des Megodontus Germari Sturm. 384](#)